BUNDE EPUBLIK DEUT CHLAND

PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D - 1 8 OCT 2000

WIPÓ PCT

EP00/08466

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

199 43 636.3

Anmeldetag:

13. September 1999

Anmelder/Inhaber:

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen/DE

Bezeichnung:

Neuartige Dicarbonsäurederivate mit pharmazeutischen Eigenschaften

IPC:

C 07 C, C 07 D, A 61 K

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 13. Juli 2000 Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

AGUTKS



Neuartige Dicarbonsäurederivate mit pharmazeutischen Eigenschaften

Die vorliegende Erfindung betrifft neue chemische Verbindungen, welche die lösliche Guanylatcyclase auch über einen neuartigen, ohne Beteiligung der Häm-Gruppe des Enzyms verlaufenden Wirkmechanismus stimulieren, ihre Herstellung und ihre Verwendung als Arzneimittel, insbesondere als Arzneimittel zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

10

15

5

Eines der wichtigsten zellulären Übertragungssysteme in Säugerzellen ist das cyclische Guanosinmonophosphat (cGMP). Zusammen mit Stickstoffmonoxid (NO), das aus dem Endothel freigesetzt wird und hormonelle und mechanische Signale überträgt, bildet es das NO/cGMP-System. Die Guanylatcyclasen katalysieren die Biosynthese von cGMP aus Guanosintriposphat (GTP). Die bisher bekannten Vertreter dieser Familie lassen sich sowohl nach strukturellen Merkmalen als auch nach der Art der Liganden in zwei Gruppen aufteilen: Die partikulären, durch natriuretische Peptide stimulierbaren Guanylatcyclasen und die löslichen, durch NO stimulierbaren Guanylatcyclasen. Die löslichen Guanylatcyclasen bestehen aus zwei Untereinheiten und enthalten höchstwahrscheinlich ein Häm pro Heterodimer, das ein Teil des regulatorischen Zentrums ist. Dieses hat eine zentrale Bedeutung für den Aktivierungsmechanismus. NO kann an das Eisenatom des Häms binden und so die Aktivität des Enzyms deutlich erhöhen. Hämfreie Präparationen lassen sich hingegen nicht durch NO stimulieren. Auch CO ist in der Lage, am Eisen-Zentralatom des Häms anzugreifen, wobei die Stimulierung durch CO deutlich geringer ist als die

)

20

durch NO.

Durch die Bildung von cGMP und der daraus resultierenden Regulation von Phosphodiesterasen, Ionenkanälen und Proteinkinasen spielt die Guanylatcyclase eine entscheidende Rolle bei unterschiedlichen physiologischen Prozessen, insbesondere bei der Relaxation und Proliferation glatter Muskelzellen, der Plättchenaggregation und –adhäsion und der neuronalen Signalübertragung sowie bei Erkrankungen, welche

10

15

20

25

30

ـد

auf einer Störung der vorstehend genannten Vorgänge beruhen. Unter pathophysiologischen Bedingungen kann das NO/cGMP-System supprimiert sein, was zum Beispiel zu Bluthochdruck, einer Plättchenaktivierung, einer vermehrten Zellproliferation, endothelialer Dysfunktion, Atherosklerose, Angina pectoris, Herzinsuffizienz, Thrombosen, Schlaganfall und Myokardinfarkt führen kann.

Eine auf die Beeinflussung des cGMP-Signalweges in Organismen abzielende NOunabhängige Behandlungsmöglichkeit für derartige Erkrankungen ist aufgrund der zu erwartenden hohen Effizienz und geringen Nebenwirkungen ein vielversprechender Ansatz.

Zur therapeutischen Stimulation der löslichen Guanylatcyclase wurden bisher ausschließlich Verbindungen wie organische Nitrate verwendet, deren Wirkung auf NO beruht. Dieses wird durch Biokonversion gebildet und aktiviert die lösliche Guanylatcyclase durch Angriffe am Eisenzentralatom des Häms. Neben den Nebenwirkungen gehört die Toleranzentwicklung zu den entscheidenden Nachteilen dieser Behandlungsweise.

In den letzten Jahren wurden einige Substanzen beschrieben, die die lösliche Guanylatcyclase direkt, d.h. ohne vorherige Freisetzung von NO stimulieren, wie beispielsweise 3-(5'-Hydroxymethyl-2'-furyl)-1-benzylindazol (YC-1, Wu et al., Blood 84 (1994), 4226; Mülsch et al., Br.J.Pharmacol. 120 (1997), 681), Fettsäuren (Goldberg et al, J. Biol. Chem. 252 (1977), 1279), Diphenyliodonium-hexafluorophosphat (Pettibone et al., Eur. J. Pharmacol. 116 (1985), 307), Isoliquiritigenin (Yu et al., Brit. J. Pharmacol. 114 (1995), 1587), sowie verschiedene substituierte Pyrazolderivate (WO 98/16223, WO 98/16507 und WO 98/23619).

Die bisher bekannten Stimulatoren der löslichen Guanylatcyclase stimulieren das Enzym entweder direkt über die Häm-Gruppe (Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid oder Diphenyliodoniumhexafluorophosphat) durch Interaktion mit dem Eisenzentrum der Häm-Gruppe und eine sich daraus ergebende, zur Erhöhung der

10

15

20

25

30

Enzymaktivität führende Konformationsänderung (Gerzer et al., FEBS Lett. 132(1981), 71), oder über einen Häm-abhängigen Mechanismus, der unabhängig von NO ist, aber zu einer Potenzierung der stimulierenden Wirkung von NO oder CO führt (z.B. YC-1, Hoenicka et al., J. Mol. Med. (1999) 14; oder die in der WO 98/16223, WO 98/16507 und WO 98/23619 beschriebenen Pyrazolderivate).

Die in der Literatur behauptete stimulierende Wirkung von Isoliquiritigenin und von Fettsäuren, wie z. B. Arachidonsäure, Prostaglandinendoperoxide und Fettsäurehydroperoxide auf die lösliche Guanylatcyclase konnte nicht bestätigt werden (vgl. z.B. Hoenicka et al., J. Mol. Med. 77 (1999), 14).

Entfernt man von der löslichen Guanylatcyclase die Häm-Gruppe, zeigt das Enzym immer noch eine nachweisbare katalytische Basalaktivität, d.h. es wird nach wie vor cGMP gebildet. Die verbleibende katalytische Basalaktivität des Häm-freien Enzyms ist durch keinen der vorstehend genannten bekannten Stimulatoren stimulierbar.

Es wurde eine Stimulation von Häm-freier löslicher Guanylatcyclase durch Protoporphyrin IX beschrieben (Ignarro et al., Adv. Pharmacol. 26 (1994), 35). Allerdings kann Protoporphyrin IX als Mimik für das NO-Häm-Addukt angesehen werden, weshalb die Zugabe von Protoporphyrin IX zur Häm-freien löslichen Guanylatcyclase zur Bildung einer der durch NO stimulierten Häm-haltigen löslichen Guanylatcyclase entsprechenden Struktur des Enzyms führen dürfte. Dies wird auch durch die Tatsache belegt, dass die stimulierende Wirkung von Protoporphyrin IX durch den vorstehend beschriebenen NO-unabhängigen, aber Häm-abhängigen Stimulator YC-1 erhöht wird (Mülsch et al., Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 355, R47).

Bislang wurden somit keine Verbindungen beschrieben, welche die lösliche Guanylatcyclase unabhängig von der im Enzym befindlichen Häm-Gruppe stimulieren können.

15

20

30

٠(

Es war die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Arzneimittel zur Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen oder anderen über eine Beeinflussung des cGMP-Signalweges in Organismen therapierbaren Erkrankungen zu entwickeln.

Die vorstehende Aufgabe wird durch die Verwendung von Verbindungen zur Herstellung von Arzneimitteln gelöst, welche in der Lage sind, die lösliche Guanylateyelase auch unabhängig von NO und von der im Enzym befindlichen Häm-Gruppe zu stimulieren.

Überraschend wurde gefunden, dass es Verbindungen gibt, welche die lösliche Guanylatcyclase auch unabhängig von der im Enzym befindlichen Häm-Gruppe stimulieren können. Die biologische Aktivität dieser Stimulatoren beruht auf einem völlig neuen Mechanismus der Stimulierung der löslichen Guanylatcyclase. Im Gegensatz zu den vorstehend beschriebenen, aus dem Stand der Technik als Stimulatoren der löslichen Guanylatcyclase bekannten Verbindungen sind die erfindungsgemäßen Verbindungen in der Lage, auch die Häm-freie Form der löslichen Guanylatcyclase zu stimulieren. Die Stimulierung des Enzyms verläuft bei diesen neuen Stimulatoren also über einen Häm-unabhängigen Weg, was auch dadurch belegt wird, dass die neuen Stimulatoren am Häm-haltigen Enzym einerseits keine synergistische Wirkung mit NO zeigen und andererseits sich die Wirkung dieser neuartigen Stimulatoren nicht durch den Häm-abhängigen Inhibitor der 1H-1,2,4-Oxadiazol-(4,3a)-chinoxalin-1-on Guanylatcyclase, löslichen blockieren lässt.

Dies stellt einen neuen Therapieansatz zur Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen und anderen über eine Beeinflussung des cGMP-Signalweges in Organismen therapierbaren Erkrankungen dar.

In der EP-A-0 341 551 sind Alkan- und Alkensäurederivate wie beispielsweise (1) beschrieben, die potente Leukotrien-Antagonisten sind und daher beispielsweise als Medikamente zur Behandlung von Asthma oder Durchblutungsstörungen geeignet

45.

sind (S. 18, Z. 56-58). Eine stimulierende Wirkung dieser Verbindungen auf die lösliche Guanylatcyclase und die sich daraus ergebende Verwendung dieser Verbindungen zur Herstellung von Arzneimitteln, welche den cGMP-Signalweg beeinflussen können, ist jedoch nicht beschrieben.

5

10

In der EP-A-0 410 241 sind weitere Alkan- und Alkensäurederivate wie beispielsweise (2) mit LTD₄-, LTC₄- oder LTE₄-antagonistischer Wirkung beschrieben.

$$COOH$$
 $COOH$
 $COOH$
 $COOH$
 $COOH$
 $COOH$
 $COOH$
 $COOH$
 $COOH$

In der EP-A-0 494 621 sind schwefelhaltige Alkensäurederivate wie beispielsweise
(3) beschrieben, welche bei allergischen Erkrankungen, Entzündungen und HerzKreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden können.

بز

$$(CH_2)_4$$

$$COOH$$
(3)


In der EP-A-0 791 576 sind Benzoesäurederivate wie beispielsweise (4) beschrieben, welche zur Behandlung von Atemwegserkrankungen verwendet werden können.

10

15

Es ist jedoch nicht beschrieben, dass irgendeine der vorstehend genannten, aus dem Stand der Technik bekannten Verbindungen eine stimulierende Wirkung auf die lösliche Guanylatcyclase besitzt und somit zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt werden könnte, welche durch Beeinflussung des cGMP-Spiegels therapierbar sind.

Die vorliegende Erfindung betrifft in einer bevorzugten Ausführungsform Verbindungen der allgemeinen Formel (I)



worin

5

B Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet,

10

r 0 oder 1 bedeutet,

S(O)_o bedeutet,

V

worin

15

20

R⁴ unabhängig von einem weiteren gegebenenfalls vorhandenen Rest R⁴ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder Arylalkyl mit 7 bis 18 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Alkyl, Alkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

fehlt, O, NR⁴, NR⁴CONR⁴, NR⁴CO, NR⁴SO₂, COO, CONR⁴ oder

- o 0, 1 oder 2 bedeutet,
- Q fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkindiyl mit

Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CO, OCO, S-CO-, CONR⁵ oder NR⁵SO₂ enthalten können, und ein oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein können, wobei gegebenenfalls zwei beliebige Atome der vorstehenden Kette unter Bildung eines drei- bis achtgliedrigen Rings miteinander verbunden sein können, oder CONR⁵ bedeutet,

worin

Y

R⁵ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, das durch Halogen oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

p 0, 1 oder 2 bedeutet,

Wasserstoff, NR⁶R⁷, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, die auch über N gebunden sein können,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Halogen, Hydroxy, COR⁸, CN, SR⁸, NO₂, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹², NR⁹CONR⁹R¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

10

5

15

20

25

worin

R9

5

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

R⁸ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

15

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

20

R¹⁰, R¹¹, R¹³ und R¹⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O, Arylalkyl mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R¹⁵ bedeuten,

25

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

oder zwei Substituenten aus R¹⁰ und R¹¹ oder R¹³ und R¹⁴ miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Rings verbunden sein können, der O oder N enthalten kann,

worin

 R^{12}

R¹⁵ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

> wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, CN, NO₂, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen

5

10

15

20

25

aus der Reihe S, N und/oder O substituiert sein können, die auch über N gebunden sein können,

5

10

15

20

20

25

30

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, NR⁹, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen oder geradkettigem oder verzweigtes Alkendiyl, geradkettigem oder verzweigtem Alkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Sulfonylalkyl oder geradkettigem oder verzweigtem Thioalkyl mit jeweils bis 8 Kohlenstoffatomen gebunden und einbis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Halogen, SR⁸, CN, NO₂, NR¹⁷R¹⁸, CONR¹⁷R¹⁸oder NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können,

worin

 R^{16}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

worin

5

R²⁰ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu
 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10

Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

und

15

R¹⁹

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

20

25

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffato-

 \mathbb{R}^3

men und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

5

Wasserstoff, Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, OH, CN, NO2 oder NR21R22 bedeutet,

10

worin

15

 R^{21} und R^{22} unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuten,

 \mathbf{W}

geradkettiges oder verzweigtes Alkylen oder geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 6 Kohlenstoffatomen, die eine Gruppe aus O, S(O)_q, NR²³, CO oder CONR²³ enthalten können, oder O oder S bedeutet,

20

worin

25

0, 1 oder 2 bedeutet, q

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis R^{23} zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Koh-

lenstoffatomen bedeutet,

30

geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffato-U men, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

A fehlt, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet,

5

10

welche gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, Halogenalkoxy oder Alkoxycarbonyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, CN, NO₂ oder NR²⁴R²⁵ substituiert sein können,

worin

15

 R^{24} und R^{25}

jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Carbonylalkyl oder Sulfonylalkyl bedeuten,

20

R² CN, Tetrazolyl, COOR²⁶ oder CONR²⁷R²⁸ bedeutet,

worin

25

 R^{26}

Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet;

 R^{27} und R^{28}

jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Koh-

lenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R²⁹ bedeuten,

5

oder R²⁷ und R²⁸ zusammen ein fünf- oder sechsgliedrigen Ring bilden, der N oder O enthalten kann,

worin

10

R²⁹ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

15

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, CN, NO₂, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

20

X geradkettiges oder verzweigtes Alkylen oder geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 12 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine Gruppe aus O, S(O)_r, NR³⁰, CO, oder CONR³¹, oder einen drei- bis achtgliedrigen gesättigten oder ungesättigten Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O)_r, NR³² und/oder O sowie gegebenenfalls einem oder mehreren Substituenten enthalten können,

worin

30

25

0, 1 oder 2 bedeutet,

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 R^{30} Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder geradkettiges oder verzweigtes Arylalkyl mit 7 bis 15 Kohlenstoffatomen bedeu-5 tet, Wasserstoff, Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, R^{31} geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoff-10 atomen, CN, NO2 oder NR33R34 bedeutet, worin unabhängig voneinander Wasserstoff, gerad-R³³ und R³⁴ 15 kettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuten, 20 Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 R^{32} Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet, CN, Tetrazolyl, COOR35 oder CONR36R37 bedeutet, R^1 25 worin Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes R^{35} Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cy-30 cloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet;

R³⁶ und R³⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8
Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R³⁸ bedeuten,
worin

10

R³⁸ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

15

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, CN, NO₂, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

20

mit der Maßgabe, dass Y nicht Phenyl oder ausschließlich mit einem oder zwei Resten aus der Gruppe, bestehend aus geradkettigem oder verzweigtem Alkyl oder geradkettigem oder verzweigtem Alkoxy mit jeweils bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Halogen, CF₃, OCF₃ oder CN, substituiertes Phenyl sein kann, wenn gleichzeitig B Phenyl ist, V fehlt oder O bedeutet, Q geradkettiges Alkylen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet und gegebenenfalls über ein Sauerstoffatom mit Y verknüpft ist, W eine Alkylengruppe oder eine Alkendiylgruppe mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist, U eine Alkylengruppe mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ ist, A Phenyl ist und X geradkettiges Alkylen mit 1 bis 11 Kohlenstoffatomen ist und gegebe-

25

nenfalls direkt über O, S, SO oder SO₂ an das die Gruppen W und U tragende Kohlenstoffatom gebunden ist;

sowie deren Stereoisomere und Salze.

5

10

15

Erfindungsgemäß bevorzugt sind hierbei Verbindungen der Formel (I), worin

B Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

und die anderen Substituenten wie vorstehend definiert sind.

Besonders bevorzugt sind hierbei Verbindungen der Formel (I), bei denen

- B Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,
- r 0 oder 1 bedeutet,
 - V fehlt, O, NR⁴, NR⁴CONR⁴, NR⁴CO, NR⁴SO₂, COO, CONR⁴ oder S(O)₀ bedeutet,

20

worin

 R^4

25

unabhängig von einem weiteren gegebenenfalls vorhandenen Rest R⁴ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder Arylalkyl mit 7 bis 18 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Alkyl, Alkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

Q

o 0, 1 oder 2 bedeutet,

fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkindiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine oder mehrere Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CO, OCO, S-CO-, CONR⁵ oder NR⁵SO₂ oder eine oder mehrere Alken- oder Alkingruppen enthalten können, und ein oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann, wobei gegebenenfalls zwei beliebige Atome der vorstehenden Kette unter Bildung eines drei- bis achtgliedrigen Rings miteinander verbunden sein können, oder CONR⁵ bedeutet,

worin

Y

R⁵ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, das durch Halogen oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

p 0, 1 oder 2 bedeutet,

Wasserstoff, NR⁶R⁷, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, die auch über N gebunden sein können,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweig-

5

10

15

20

25

>

ges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Halogen, Hydroxy, COR⁸, CN, SR⁸, NO₂, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹², NR⁹CONR⁹R¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

worin

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

R⁸ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

R⁹ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

R¹⁰, R¹¹, R¹³ und R¹⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O, Arylalkyl mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R¹⁵ bedeuten,

10

5

15

20

25

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

oder zwei Substituenten aus R¹⁰ und R¹¹ oder R¹³ und R¹⁴ miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Rings verbunden sein können, der O oder N enthalten kann,

worin

 R^{12}

R¹⁵ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, CN, NO₂, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

5

10

15

20

25

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O substituiert sein können, die auch über N gebunden sein können,

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, NR⁹, CONR⁹,

SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem

oder verzweigtem Alkendiyl, geradkettigem oder verzweigtem Alky-

loxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem

oder verzweigtem Sulfonylalkyl, geradkettigem oder verzweigtem

Thioalkyl mit jeweils bis 8 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis

dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges

oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenal-

kyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy, Carbonylalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Halogen, SR⁸, CN, NO₂, NR¹⁷R¹⁸, CONR¹⁷R¹⁸oder

10

15

20

worin

NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können,

25

 R^{16} Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten, wobei der Arylrest seinerseits

ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

5

worin

10

R²⁰ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

15

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

und

20

R¹⁹

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

25

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

5

R³ Wasserstoff, OH, Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

W geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine Gruppe aus O oder NR²³ enthalten können,

15

worin

20

R²³ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

U geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

25

A fehlt, Phenyl oder einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet,

30

welche gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein können,

R² COOR²⁶ oder CN bedeutet,

5

worin

 R^{26}

Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen bedeutet;

10

X geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine Gruppe aus O, S(O)_r, NR³⁰, eine oder mehrere Alkengruppen oder einen drei- bis sechsgliedrigen gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls einen oder mehrere geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen aufweisenden Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O)_r, NR³² und/oder O enthalten können,

15

worin



r 0, 1 oder 2 bedeutet,

25

R³⁰ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder Arylalkyl mit 7 bis 12 Kohlenstoffatomen bedeutet,

30

R³² Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

R¹ CN oder COOR³⁵ bedeutet,

worin

5

R³⁵ Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl

mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeutet;

10

15

mit der Maßgabe, dass Y nicht Phenyl oder ausschließlich mit einem oder zwei Resten aus der Gruppe, bestehend aus geradkettigem oder verzweigtem Alkyl oder geradkettigem oder verzweigtem Alkoxy mit jeweils bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Halogen, CF₃, OCF₃ oder CN, substituiertes Phenyl sein kann, wenn gleichzeitig B Phenyl ist, V fehlt oder O bedeutet, Q geradkettiges Alkylen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet und gegebenenfalls über ein Sauerstoffatom mit Y verknüpft ist, W eine Alkylengruppe oder Alkendiylgruppe mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist, U eine Alkylengruppe mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ ist, A Phenyl ist und X geradkettiges Alkylen mit 1 bis 11 Kohlenstoffatomen ist und gegebenenfalls direkt über O, S, SO oder SO₂ an das die Gruppen W und U tragende Kohlenstoffatom gebunden ist;

20

Insbesondere bevorzugt sind hierbei Verbindungen der Formel (I), bei denen

- B Phenyl oder Naphthyl bedeutet
- 25 r 0 oder 1 bedeutet,
 - V fehlt oder O, NR⁴ oder S(O)_n bedeutet

worin

30

R⁴ Wasserstoff bedeutet,

Q

n 0 bedeutet,

5

fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine oder mehrere Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CONR⁵, S-CO-, OCO enthalten können, und ein- oder zweifach durch Halogen oder Hydroxy substituiert sein können, oder CONR⁵ bedeutet,

10

worin

R⁵

Wasserstoff bedeutet,


p

0 oder 1 bedeutet,

15

Y Wasserstoff, NR⁶R⁷, Phenyl, Napthyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe





bedeutet,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, NO₂, COR⁸, SR⁸, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

worin



10

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, R⁸ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, R9 Wasserstoff, oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, R¹⁰, R¹¹, R¹³ und R¹⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeuten, wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n- Propyl, i-Propyl, n- Butyl, s- Butyl, i- Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann, oder zwei Substituenten aus R¹⁰ und R¹¹ oder R¹³ und R¹⁴ miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Ring verbunden sein können, der durch O oder N unterbrochen sein kann, R^{12} Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeutet, wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hy-

droxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl,

5

10


15

20

25

i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann;

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Phenyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe



substituiert sein können,

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem oder verzweigtem Alkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Sulfonylalkyl, geradkettigem oder verzweigtem Thioalkyl mit jeweils bis 4 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 4

5



Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, NR¹⁷R¹⁸ oder NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können,

worin

5

 R^{16}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Phenyl, wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl ,i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO2, CF3, OCF3 oder CN substituiert sein kann, oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten,

15

20

worin

 R^{20}

geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

25

und

R19

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und

bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein können;

5

10

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

15

R³ Wasserstoff, OH, F, Cl, Br, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

20

W CH₂CH₂, CH=CH, CH₂O, OCH₂, CH₂OCH₂, CH₂NH, NHCH₂ oder CH₃NHCH₂ bedeutet,

U geradkettiges Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

25

A fehlt oder Phenyl, Pyridyl, Thienyl oder Thiazolyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, CF₃, Methoxy, Ethoxy, F, Cl, Br substituiert sein kann,

R² COOR²⁶ oder CN bedeutet,

worin

5

R²⁶ Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet;

10

X geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, das eine Gruppe aus O, S(O)_r, NR³⁰, oder einen drei- bis sechsgliedrigen gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls einen oder mehrere geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen aufweisenden Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O)_r, NR³² und/oder O enthalten kann,

15

worin

r

20

R³⁰ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder Benzyl bedeutet,

R³² Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

25

R¹ CN oder COOR³⁵ bedeutet,

0, 1 oder 2 bedeutet,

worin

 R^{35}

Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeutet;

5

10

10

15

mit der Maßgabe, dass Y nicht Phenyl oder ausschließlich mit einem oder zwei Resten aus der Gruppe, bestehend aus geradkettigem oder verzweigtem Alkyl oder geradkettigem oder verzweigtem Alkoxy mit jeweils bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Halogen, CF₃, OCF₃ oder CN, substituiertes Phenyl sein kann, wenn gleichzeitig V fehlt oder O bedeutet, Q geradkettiges Alkylen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet und gegebenenfalls über ein Sauerstoffatom mit Y verknüpft ist, W eine Alkylengruppe oder eine Alkendiylgruppe mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist, U eine Alkylengruppe mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ ist, A Phenyl ist und X geradkettiges Alkylen mit 1 bis 11 Kohlenstoffatomen ist und gegebenenfalls direkt über O, S, SO oder SO₂ an das die Gruppen W und U tragende Kohlenstoffatom gebunden ist;

Erfindungsgemäß ebenfalls bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), worin

20

B einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet, und die anderen Substituenten wie vorstehend definiert sind.

Besonders bevorzugt sind hierbei Verbindungen der Formel (I), bei denen

25

- B einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet,
- r 0 oder 1 bedeutet,

30

V fehlt, O, NR⁴, NR⁴CONR⁴, NR⁴CO, NR⁴SO₂, COO, CONR⁴ oder S(O)₀ bedeutet,

worin

5

R⁴

unabhängig von einem weiteren gegebenenfalls vorhandenen Rest R4 Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder Arylalkyl mit 7 bis 18 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Alkyl, Alkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

10

0, 1 oder 2 bedeutet, 0

15

Q

fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkindiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine oder mehrere

Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CO, OCO, S-CO-, CONR⁵ oder NR⁵SO₂ enthalten können, und ein oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy

oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein können, wobei gegebenenfalls zwei beliebige Atome der vorstehenden Kette

unter Bildung eines drei- bis achtgliedrigen Rings miteinander ver-

bunden sein können, oder CONR⁵ bedeutet,

25

20

worin

R⁵

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, das durch Halogen oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

Y

p 0, 1 oder 2 bedeutet,

Wasserstoff, NR⁶R⁷, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, die auch über N gebunden sein können,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Halogen, Hydroxy, COR⁸, CN, SR⁸, NO₂, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹², NR⁹CONR⁹R¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

worin

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

R⁸ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

5

15

20



R⁹ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

5

R¹⁰, R¹¹, R¹³ und R¹⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O, Arylalkyl mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R¹⁵ bedeuten,

10

15

20

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

oder zwei Substituenten aus R¹⁰ und R¹¹ oder R¹³ und R¹⁴ miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Rings verbunden sein können, der O oder N enthalten kann,

worin

25

R¹⁵ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

30

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, CN, NO₂, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

5

 R^{12}

N gebunden sein können,

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO2, NH2, NHCOR9, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

10

15

20



25

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, NR⁹, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem oder verzweigtem Alkendiyl, geradkettigem oder verzweigtem Alkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Sulfonylalkyl, geradkettigem oder verzweigtem Thioalkyl mit jeweils bis 8 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy, Carbonylalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 6

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Aryl mit

6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen

aus der Reihe S, N und/oder O substituiert sein können, die auch über

Kohlenstoffatomen, Halogen, SR8, CN, NO2, NR17R18, CONR17R18oder NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können.

worin

5

 R^{16}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

15

20

worin

 R^{20} geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

25

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO2, NH2, NHCOR9, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

und

 R^{19}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

15

10

5

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

20

4

R³ Wasserstoff, Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

25

W geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine Gruppe aus O oder NR²³ enthalten können,

30

worin

R²³ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

U geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

A fehlt, Phenyl oder einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet,

welche gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein können,

R² COOR²⁶ oder CN bedeutet,

worin

X

R²⁶ Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen bedeutet;

geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine Gruppe aus O, S(O)_r, NR³⁰, oder einen drei- bis sechsgliedrigen gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls einen oder mehrere geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen aufweisenden Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O)_r, NR³² und/oder O enthalten können,

10

15

5

__ 20

25

5

0, 1 oder 2 bedeutet, r

 R^{30} Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder Arylalkyl mit 7 bis 12 Koh-

lenstoffatomen bedeutet,

10

 R^{32} Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

CN oder COOR³⁵ bedeutet, R^1

15


worin

 R^{35} Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeutet.

20

Insbesondere bevorzugt sind hierbei Verbindungen der Formel (I), bei denen

В einen Heterocyclus aus der Reihe



bedeutet

5

10

r 0 oder 1 bedeutet,

V fehlt oder O, NR^4 oder $S(O)_n$ bedeutet

worin

R⁴ Wasserstoff bedeutet,

n 0 bedeutet,

Q fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, das eine oder mehrere Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CONR⁵, S-CO-oder OCO enthalten können, und ein- oder zweifach durch Halogen oder Hydroxy substituiert sein kann, oder CONR⁵ bedeutet,

worin


R⁵ Wasserstoff bedeutet,

p 0 oder 1 bedeutet,

Y Wasserstoff, NR⁶R⁷, Phenyl, Napthyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe

5





bedeutet,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, NO₂, COR⁸, SR⁸, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹²

oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

worin

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, R^8 Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, R9 Wasserstoff, oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, R^{10} , R^{11} , R^{13} und R^{14} unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeuten, wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n- Propyl, i-Propyl, n- Butyl, s- Butyl, i- Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann, oder zwei Substituenten aus R10 und R11 oder R13 und R14 miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Ring verbunden sein können, der durch O oder N unterbrochen sein kann, R^{12} Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeutet,

20

25

5

10

15


30

wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hy-

droxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl,

i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann;

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Phenyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe



substituiert sein können,

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem oder verzweigtem Alkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Thioalkyl mit jeweils bis 4 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 4



5



Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, NR¹⁷R¹⁸ oder NR¹⁶COR¹⁹
substituiert sein können,

worin

5

 R^{16}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Phenyl, wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl, Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann, oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten,

15

20

worin

R²⁰ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

25

und

R¹⁹

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und

bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein können;

5

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

15

R³ Wasserstoff, F, Cl, Br, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

20

W CH₂CH₂, CH=CH, CH₂O, OCH₂, CH₂OCH₂, CH₂NH, NHCH₂ oder CH₂NHCH₂ bedeutet,

U geradkettiges Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

25

A fehlt oder Phenyl, Pyridyl, Thienyl oder Thiazolyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, CF₃, Methoxy, Ethoxy, F, Cl, Br substituiert sein kann,

R² COOR²⁶ oder CN bedeutet,

worin

5

R²⁶ Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet;

10

X geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, das eine Gruppe aus O, S(O)_r, NR³⁰, oder einen drei- bis sechsgliedrigen gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls einen oder mehrere geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen aufweisenden Carbocyclus mit gegebenenfalls enem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O)_r, NR³² und/oder O enthalten kann,

15

worin

20

r 0, 1 oder 2 bedeutet,

- R³⁰ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6
 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder Benzyl bedeutet,
- R³² Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

25

R¹ CN oder COOR³⁵ bedeutet,

worin

 R^{35}

Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeutet.

Erfindungsgemäß ganz besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), bei denen R¹ und R² jeweils für COOH stehen.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) können auch in Form ihrer Salze vorliegen. Im allgemeinen seien hier Salze mit organischen oder anorganischen Basen oder Säuren genannt.

10

15

5

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden physiologisch unbedenkliche Salze bevorzugt. Physiologisch unbedenkliche Salze der erfindungsgemäßen Verbindungen können Salze der erfindungsgemäßen Stoffe mit Mineralsäuren, Carbonsäuren oder Sulfonsäuren sein. Besonders bevorzugt sind z.B. Salze mit Chlorwasserstoffsäure, Bromwasserstoffsäure, Phosphorsäure, Methansulfonsäure, Ethansulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, Benzolsulfonsäure, Naphthalindisulfonsäure, Essigsäure, Propionsäure, Milchsäure, Weinsäure, Zitronensäure, Fumarsäure, Maleinsäure oder Benzoesäure.

20

Physiologisch unbedenkliche Salze können ebenso Metall- oder Ammoniumsalze der erfindungsgemäßen Verbindungen sein, welche eine freie Carboxylgruppe besitzen. Besonders bevorzugt sind z.B. Natrium-, Kalium-, Magnesium- oder Calciumsalze, sowie Ammoniumsalze, die abgeleitet sind von Ammoniak, oder organischen Aminen wie beispielsweise Ethylamin, Di- bzw. Triethylamin, Di- bzw. Triethanolamin, Dicyclohexylamin, Dimethylaminoethanol, Arginin, Lysin oder Ethylendiamin.

30

25

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können in stereoisomeren Formen, die sich entweder wie Bild und Spiegelbild (Enantiomere), oder die sich nicht wie Bild und Spiegelbild (Diastereomere) verhalten, existieren. Die Erfindung betrifft sowohl die Enantiomeren oder Diastereomeren als auch deren jeweilige Mischungen. Die Racemformen lassen sich ebenso wie die Diastereomeren in bekannter Weise, beispielsweise

durch Racematspaltung oder durch chromatographische Trennung, in die stereoisomer einheitlichen Bestandteile trennen. In den erfindungsgemäßen Verbindungen vorhandene Doppelbindungen können in der cis- oder trans- Konfiguration (Z- oder E-Form) vorliegen.

5

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung haben die Substituenten soweit nicht anders angegeben im allgemeinen die folgende Bedeutung:

10

<u>Alkyl</u> steht im allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl, Isohexyl, Heptyl, Isoheptyl, Octyl und Isooctyl, Nonyl, Decyl, Dodeyl, Eicosyl genannt.

15

Alkylen steht im allgemeinen für eine geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffbrücke mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien Methylen, Ethylen, Propylen, α -Methylethylen, β -Methylethylen, α -Ethylethylen, β -Ethylethylen, Butylen, α -Methylpropylen, β -Methylpropylen, γ -Methylpropylen, α -Ethylpropylen, β -Ethylpropylen, γ -Ethylpropylen, Pentylen, Hexylen, Heptylen, Octylen, Nonylen, Decylen, Dodeylen und Eicosylen genannt.

20

4

<u>Alkenyl</u> steht im allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen und einer oder mehreren, bevorzugt mit einer oder zwei Doppelbindungen. Beispielsweise seien Allyl, Propenyl, Isopropenyl, Butenyl, Isobutenyl, Pentenyl, Isopentenyl, Hexenyl, Isohexenyl, Heptenyl, Isoheptenyl, Octenyl, Isooctenyl genannt.

25

Alkinyl steht im allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen und einer oder mehreren, bevorzugt mit einer oder zwei Dreifachbindungen. Beispielsweise seien Ethinyl, 2-Butinyl, 2-Pentinyl und 2-Hexinyl benannt.

Alkendiyl steht im allgemeinen für eine geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffbrücke mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen und einer oder mehreren, bevorzugt mit einer oder zwei Doppelbindungen. Beispielsweise seien Ethen-1,2-diyl, Propen-1,3-diyl, Propen-1,2-diyl, 1-Buten-1,4-diyl, 1-Buten-1,3-diyl, 1-Buten-1,2-diyl, 2-Buten-1,4-diyl, 2-Buten-1,3-diyl, 2-Buten-1,3-diyl, 2-Buten-2,3-diyl genannt.

Alkindiyl steht im allgemeinen für eine geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffbrücke mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen und einer oder mehreren, bevorzugt mit einer oder zwei Dreifachbindungen. Beispielsweise seien Ethin-1,2-diyl, Propin-1,3-diyl, 1-Butin-1,4-diyl, 1-Butin-1,3-diyl, 2-Buten-1,4-diyl genannt.

Acyl steht im allgemeinen für geradkettiges oder verzweigtes Niedrigalkyl mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen, das über eine Carbonylgruppe gebunden ist. Beispielsweise seien genannt: Acetyl, Ethylcarbonyl, Propylcarbonyl, Isopropylcarbonyl, Butylcarbonyl und Isobutylcarbonyl.

Alkoxy steht im allgemeinen für einen über einen Sauerstoffatom gebundenen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 14 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, Pentoxy Isopentoxy, Hexoxy, Isohexoxy, Heptoxy, Isoheptoxy, Octoxy oder Isooctoxy genannt. Die Begriffe "Alkoxy" und "Alkyloxy" werden synonym verwendet.

Alkoxyalkyl steht im allgemeinen für einen Alkylrest mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, der durch einen Alkoxyrest mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen substituiert ist.

Alkoxycarbonyl kann beispielsweise durch die Formel

dargestellt werden.

10

5

15



25

Alkyl steht hierbei im allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 13 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien die folgenden Alkoxycarbonylreste genannt: Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, Butoxycarbonyl oder Isobutoxycarbonyl.

5

Cycloalkyl steht im allgemeinen für einen cyclischen Kohlenwasserstoffrest mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt sind Cyclopropyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl. Beispielsweise seien Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl und Cyclooctyl genannt.

10

Cycloalkoxy steht im Rahmen der Erfindung für einen Alkoxyrest, dessen Kohlenwasserstoffrest ein Cycloalkylrest ist. Der Cycloalkylrest hat im allgemeinen bis zu 8 Kohlenstoffatome. Als Beispiele seien genannt: Cyclopropyloxy und Cyclohexyloxy. Die Begriffe "Cycloalkoxy" und "Cycloalkyloxy" werden synonym verwendet.

15

<u>Aryl</u> steht im allgemeinen für einen aromatischen Rest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen. Bevorzugte Arylreste sind Phenyl und Naphthyl.

Halogen steht im Rahmen der Erfindung für Fluor, Chlor, Brom und Iod.


20

25

Heterocyclus steht im Rahmen der Erfindung im allgemeinen für einen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen 3- bis 10-gliedrigen, beispielsweise 5- oder 6-gliedrigen Heterocyclus, der bis zu 3 Heteroatome aus der Reihe S, N und/oder O enthalten kann und der im Fall eines Stickstoffatoms auch über dieses gebunden sein kann. Beispielsweise seien genannt: Oxadiazolyl, Thiadiazolyl, Pyrazolyl, Pyridyl, Pyrimidinyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Thienyl, Furyl, Pyrrolyl, Pyrrolidinyl, Piperazinyl, Tetrahydropyranyl, Tetrahydrofuranyl, 1,2,3 Triazolyl, Thiazolyl, Imidazolyl, Morpholinyl oder Piperidyl. Bevorzugt sind Thiazolyl, Furyl, Oxazolyl, Pyrazolyl, Triazolyl, Pyridyl, Pyrimidinyl, Pyridazinyl und Tetrahydropyranyl. Der Begriff "Heteroaryl" (bzw. "Hetaryl") steht für einen aromatischen heterocyclischen Rest. Bei den in der vorliegenden Anmeldung gezeigten Heterocyclenstrukturen ist jeweils nur eine Bindung zur benachbarten Gruppe angedeutet, z.B. bei den

Heterocyclenstrukturen, die für Y in Frage kommen, die Bindung zur Einheit Q. Unabhängig davon können diese Heterocyclenstrukturen jedoch wie angegeben weitere Substituenten tragen.

Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I)



10 umfassend

15

20


[A] die Umsetzung von Aldehyden der allgemeinen Formel (II)

worin

 R^1 , R^2 , A, U and X

die vorstehend angegebene Bedeutung haben, mit der Maßgabe, dass R¹ und R² nicht für freie Carbonsäuregruppen stehen dürfen,

mit Phosphorverbindungen der allgemeinen Formel (III)



5 R^3 , B, V, Q, Y und r

10

15

20

25

die vorstehend angegebenen Bedeutungen

haben,

m eine ganze Zahl von 1 bis 5 bedeutet, und

L für einen Rest der Formel

$$Z^{-}$$
 $+$
 $-P(R^{39})_3$
 R^{39}
 $-P^{-}R^{40}$
 R^{40}
 R^{40}
 R^{40}
 R^{40}
 R^{40}
 R^{40}

steht, worin

R³⁹ und R⁴⁰ unabhängig voneinander geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeuten, und

Z ein Halogenidanion oder Tosylatanion bedeutet,

in inerten Lösungsmitteln in Gegenwart einer Base,

und gegebenenfalls die anschließende teilweise oder vollständige Hydrolyse der Reste R¹ und R² zu freien Carbonsäuregruppen;

oder

[B] Verbindungen der Formel (IV),

5

$$R^3$$
 Va
 Va
 $A-R^2$
 (IV)

worin

10

Va

für O oder S steht

 R^{1} , R^{2} , R^{3} , U, W,A, X

die vorstehend angegebene Bedeutung

haben

15

mit Verbindungen der Formel (V)



umsetzt,

20

worin

Q, Y die gleichen Bedeutungen wie vorstehend definiert haben,

E entweder eine Abgangsgruppe bedeutet, die in Gegenwart einer Base substituiert wird, oder eine gegebenenfalls aktivierte Hydroxyfunktion ist;


5 oder

10

15

20

[C] Verbindungen der Formel (VI),



worin


R³, V, Q, Y, W, U, A, B die gleichen Bedeutungen wie vorstehend definiert haben,

R_b und R_b jeweils unabhängig für CN oder COOAlk stehen, wobei
Alk für einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest
mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen steht,

mit wässrigen Lösungen starker Säuren oder starker Basen in die entsprechenden freien Carbonsäuren überführt.

oder

25 [D] Verbindungen der Formel (VII)





R¹, R², R³, V, Q, X, W, U, A, B die gleichen Bedeutungen wie vorstehend definiert haben,

L' für Br, I oder die Gruppe CF₃SO₂-O steht,

10 mit Verbindungen der Formel (VIII)

M-Z'

(VIII)

worin



M für einen Aryl oder Heteroarylrest, einen geradkettigen oder verzweigten Alkyl-, Alkenyl- oder Alkinylrest oder Cycloalkylrest oder für einen Arylalkyl-, einen Arylalkenyl- oder einen Arylalkinylrest steht,


20

Z' für die Gruppierungen -B(OH)₂, -CH≡CH, -CH=CH₂ oder -Sn(nBu)₃ steht

in Gegenwart einer Palladiumverbindung, gegebenenfalls zusätzlich in Gegenwart eines Reduktionsmittels und weiterer Zusatzstoffe und in Gegenwart einer Base umsetzt;

5 oder

[E] Verbindungen der Formel (VII)



10

worin

R¹, R², R³, V, Q, X, W, U, A, B die gleichen Bedeutungen wie vorstehend definiert haben,

15

L' für Br, I oder die Gruppe CF₃SO₂-O steht,

mit Verbindungen der Formel (IX)

20

25

NHR^aR^b

(IX)

worin

R^a und R^b unabhängig voneinander für Wasserstoff oder einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest mit bis zu 8 Koh-

lenstoffatomen stehen oder zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bilden können,


5

in Gegenwart einer Palladiumverbindung, gegebenenfalls zusätzlich in Gegenwart eines Reduktionsmittels und weiterer Zusatzstoffe und in Gegenwart einer Base umsetzt;

10

oder

[F] Verbindungen der Formel (IV),



15

worin



Va

für O oder S steht

(X)

20

R¹, R², R³, U, W,A, X die vorstehend angegebene Bedeutung haben

mit Verbindungen der Formel (X)

25

umsetzt,

5

10

15

20


25

worin

Q' die gleichen Bedeutung wie Q hat,

E und E' jeweils unabhängig voneinander entweder eine Abgangsgruppe bedeutet, die in Gegenwart einer Base substituiert wird, oder eine gegebenenfalls aktivierte Hydroxyfunktion ist;

und die so erhaltenen Verbindungen der Formel (XI)



worin

R¹, R², R³, A, Q, U, V, W, X und E' die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

mit Aminen der Formel (XII)

NHR^aR^b (XII)

umsetzt;

worin

Ra und Rb unabhängig voneinander für Wasserstoff oder einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest mit bis zu 8 Koh-

lenstoffatomen stehen oder zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bilden können,

5

oder

[G]

Verbindungen der Formel (XIII)

10

$$HO \longrightarrow X \longrightarrow R^1$$
 (XIII)

worin

15

 R^{1} , R^{2} , A, U, X

die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

mit Verbindungen der Formel (XIV)

20

worin

R³, V, Q, Y, r und B

die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

m

eine ganze Zahl von 1 bis 5 bedeutet, und

E" entweder eine Abgangsgruppe bedeutet, die in Gegenwart einer Base substituiert wird, oder eine gegebenenfalls aktivierte Hydroxyfunktion ist;

umsetzt;

oder

10

5

[H] Verbindungen der Formel (XV)

$$E''' \longrightarrow X \longrightarrow R^1$$

$$V \longrightarrow A \longrightarrow R^2$$
(XV)

15


worin

20

R¹, R², A, U, X die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

E" entweder eine Abgangsgruppe bedeutet, die in Gegenwart einer Base substituiert wird, oder eine gegebenenfalls aktivierte Hydroxyfunktion ist;

mit Verbindungen der Formel (XVI)



5 R^3 , V, Q, Y, r und B

die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

m eine ganze Zahl von 1 bis 5 bedeutet,

umsetzt;

oder

10

15

20

[I] Verbindungen der Formel (XVII)

$$A \rightarrow \mathbb{R}^2$$
 (XVII)

worin

R¹, R², A, U, X die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

mit Verbindungen der Formel (XVIII)

m

5 R³, V, Q, Y, r und Bdie vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

eine ganze Zahl von 0 bis 5 bedeutet,

zunächst zu einer Schiffschen Base umsetzt und diese dann mit gängigen Reduktionsmitteln reduziert oder direkt unter den Bedingungen einer reduktiven Alkylierung in Gegenwart eines Reduktionsmittels umsetzt;

oder

10

15


[J] Verbindungen der Formel (XIX)

$$H_2N$$
 V
 $A-R^2$
 (XIX)

worin

R¹, R², A, U, X die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

mit Verbindungen der Formel (XX)



m

5 R³, V, Q, Y, r und Bdie vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

eine ganze Zahl von 0 bis 5 bedeutet,


zunächst zu einer Schiffschen Base umsetzt und diese dann mit gängigen Reduktionsmitteln reduziert oder direkt unter den Bedingungen einer reduktiven Alkylierung in Gegenwart eines Reduktionsmittels umsetzt,

oder

10

20

15 [K] Aldehyde der Formel (XXI)



worin


R³, V, Q, Y, r und B die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

mit Phosphorverbindungen der Formel (XXII)

$$(EtO)_2$$
 $X - R^1$ $(XXII)$

X und R¹ die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

zu Verbindungen der Formel (XXIII)




10 worin

 R^3 , V, Q, Y, r, B, X and R^1

die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

umgesetzt und anschließend durch aufeinanderfolgende Reduktion der Alkengruppe und der Carbonylgruppe und anschließende Substitution der durch Reduktion der Carbonylgruppe erzeugten Hydroxygruppe mit Alkoholen oder Thiolen sowie gegebenenfalls anschließende Oxidation zu den entsprechenden Sulfoxid- oder Sulfonverbindungen in Verbindungen der Formel (XXIV) überführt,



15

20

U

R³, V, Q, Y, r, B, X, A, R² und R¹ die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

5

für O oder S steht.

Gemäß der vorliegenden Erfindung bedeutet beim Verfahren [A] Z bevorzugt ein Halogenidanion, insbesondere bevorzugt Chlorid, Bromid oder Iodid.

10

Gemäß der vorliegenden Erfindung erfolgt die beim Verfahren [A] gegebenenfalls durchzuführende teilweise oder vollständige Hydrolyse zu den entsprechenden freien Carbonsäuregruppen vorzugsweise mit starken Säuren wie z.B. HCl oder mit starken Basen wie z.B. NaOH oder LiOH, die in wässriger Lösung oder Lösungsmittelgemischen aus Wasser mit Alkoholen wie z.B. Methanol oder Ethern vorliegen.

15

20

Für das erfindungsgemäße Verfahren [A] bevorzugte inerte Lösungsmittel sind herkömmliche organische Lösungsmittel, welche sich unter den Reaktionsbedingungen nicht verändern. Vorzugsweise können für das erfindungsgemäße Verfahren [A] Ether wie Diethylether, Butylmethylester, Dioxan, Tetrahydrofuran, Glykoldimethylether oder Diethylenglykoldimethylether, oder Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol, Xylol oder Petrolether, oder Amide wie Dimethylformamid oder Hexamethylphosphortriamid, oder 1,3-Dimethyl-imidazolidin-2-on, 1,3-Dimethyl-tetrahydropyrimidin-2-on oder Dimethylsulfoxid verwendet werden. Es ist selbstverständlich auch möglich, Gemische der vorstehend genannten Lösungsmittel zu verwenden.

25

Für das erfindungsgemäße Verfahren [A] bevorzugte Basen umfassen herkömmlicherweise für basische Reaktionen eingesetzte basische Verbindungen. Vorzugsweise können Alkalimetallhydride wie beispielsweise Natriumhydrid oder Kaliumhydrid, oder Alkalimetallalkoholate wie Natriummethanolat, Natriumethanolat, Kaliummethanolat, Kalium-thanolat oder Kalium-t.-butylat, oder Amide wie Natriumamid

mid oder Lithiumdiisopropylamid oder Natriumhexamethyldisilazan, oder Organolithium-Verbindungen wie Phenyllithium, Butyllithium oder Methyllithium verwendet werden. Gegebenenfalls kann beim erfindungsgemäßen Verfahren [A] zur Optimierung der Reaktion ein herkömmlicher Kronenether wie 18-Krone-6 zugegeben werden.

10

5

Die Wahl des Lösungsmittels oder Base hängt von der Stabilität, Empfindlichkeit gegenüber Hydrolyse oder der CH-Aktivität der entsprechenden Phosphorverbindung ab. Ether wie Diethylether, Tetrahydrofuran, Dimethoxyethan oder Dioxan, zusammen mit einem Co-Lösungsmittel wie Dimethylformamid oder 1,3-Dimethyltetrahydropyridin-2-on oder 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on, werden als Lösungsmittel besonders bevorzugt verwendet. Alkalimetallalkoholate wie Kalium-t.-butylat oder Organolithiumverbindungen wie Phenyllithum oder Butyllithium oder Natriumhydrid werden als Basen besonders bevorzugt verwendet.

15

Die Reaktion kann im allgemeinen in einem Temperaturbereich von -80°C bis +70°C, vorzugsweise von -80°C bis +20°C ausgeführt werden.

20

Die Reaktion kann bei Normaldruck, erhöhtem oder verringertem Druck ausgeführt werden (beispielsweise in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar). Im allgemeinen wird die Reaktion bei Normaldruck ausgeführt.

25

Bei der Durchführung der Reaktion werden die Phosphorverbindungen im allgemeinen in einer Menge von 1-2 mol, bezogen auf 1 mol Aldehyd eingesetzt. Die Basen werden im allgemeinen in einer Menge von 1-5 mol, vorzugsweise von 1-2 mol, bezogen auf 1 mol Phosphorverbindung eingesetzt.

30

Das erfindungsgemäße Verfahren [A] kann beispielsweise durchgeführt werden, indem die Base und anschließend das Aldehyd, gegebenenfalls in einem Lösungsmittel, zu der in einem Lösungsmittel gelösten oder suspendierten Phosphorverbindung zugegeben werden, und anschließend gegebenenfalls das Gemisch erhitzt wird. Die

Die Aufarbeitung erfolgt auf herkömmliche Weise, durch Extraktion, Chromatographie und/oder Kristallisation.

Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens [A] ist es ebenfalls möglich, anstelle der vorstehend genannten Phosphoniumsalze die entsprechenden Phosphorane (U ist gleich –P(R¹²)₃=CHR) zu verwenden, die vorher in einer getrennten Reaktion aus den entsprechenden Phosphoniumsalzen im basischen Milieu dargestellt wurden. Es hat sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, die Reaktion mit den Phosphorverbindungen in Gegenwart von Basen als Eintopf-Verfahren durchzuführen.

5

Die Phosphorverbindungen der allgemeinen Formel (III) können auf folgenden verschiedenen Wegen hergestellt werden.

Verfahren I - 1. Variante

$$R^{1}$$
 T
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{2}
 CH_{3}
 CH_{3}

$$R^{1}$$
 T - $(CH_{2})_{n-2}$ - C $\equiv C$
 C

VI

$$R^{1}$$
 T - $(CH_{2})_{n-2}$ -CEC $CH_{2}OH$
 $CH_{2}OH$
 $CH_{2}OH$
 $CH_{2}OH$

$$R^{1}$$
 T - $(CH_{2})_{n}$
 R^{2}
 $CH_{2}OH$
 $CH_{2}OH$
 $CH_{2}OH$

$$R^{1}$$
 T - $(CH_{2})_{n}$
 R^{2}
 IX

$$R^{1} \xrightarrow{+} CH_{2}P(C_{6}H_{5})_{3}$$

$$T-(CH_{2})_{n} \xrightarrow{+} Hal = CI, Br$$

$$X$$

wobei das Verfahren nicht auf die hier beispielhaft dargestellten Verbindungen eingeschränkt ist, bei denen Y und B für Phenyl, Q für eine Alkylenkette steht und V fehlt, sondern grundsätzlich mit Verbindungen mit beliebigen Resten V, Q, Y und B durchgeführt werden kann.

Beim ersten Reaktionsschritt A dieser Variante werden die Acetylenverbindungen (IVa) mit den Brombenzaldehyden (Va) in Lösungsmitteln wie Triethylamin, Acetonitril, Pyridin oder Gemischen davon, vorzugsweise in Triethylamin, in Gegenwart von Kupfer-(I)-Salzen und Palladium-(0)-Verbindungen, vorzugsweise in Gegenwart von Kupfer-(I)-Halogeniden wie beispielsweise Kupferiodid, und bis-(Triphenylphosphan)-Palladium-(II)-chlorid in einem Temperaturbereich von –40°C bis +80°C, vorzugsweise von 0°C bis +40°C umgesetzt.

Im zweiten Reaktionsschritt B wird die Formylverbindung (VIa) in Lösungsmitteln wie Alkoholen, beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol, oder Ethern wie Diethylether, Tetrahydrofuran oder Dioxan, oder in basischen Lösungsmitteln wie Triethylamin, Pyridin oder Dimethylformamid, oder in Wasser oder in Gemischen aus den vorstehend genannten Lösungsmitteln unter Verwendung komplexierter Hydride wie beispielsweise Borhydriden oder Aluminiumhydriden, vorzugsweise Natriumborhydrid oder Lithiumaluminiumhydrid, als Reduktionsmittel in einem Temperaturbereich von –40°C bis +60°C, vorzugsweise von 0°C bis +40°C, zu den Hydroxylverbindungen (VIIa) reduziert.

Im dritten Reaktionsschritt C werden die Verbindungen (VIIa) in inerten Lösungsmitteln wie Alkoholen, beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol, oder Kohlenwasserstoffen wie Benzol, Toluol oder Xylol oder in Ethern wie Diethylether oder Tetrahydrofuran, oder in Ethylacetat, insbesondere bevorzugt in Methanol, in Gegenwart von Edelmetall-Katalysatoren wie Palladium oder Platin in einem Temperaturbereich von –30°C bis +80°C, vorzugsweise von 0°C bis +40°C, unter einem Druck von 1 bar bis 50 bar, vorzugsweise von 1 bar bis 20 bar hydriert.

10

5

20

15

30

Die Schritte B und C können auch in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden.

Im vierten Schritt D werden die hydrierten Verbindungen VIIIa durch Umsetzung mit Bromierungsmitteln wie beispielsweise Phosphortribromid, Sulfonylbromid, Bromwasserstoff oder Tetrabrommethan/Triphenylphosphan in inerten Lösungsmitteln wie Ether, beispielsweise Diethylether oder Tetrahydrofuran, oder Kohlenwasserstoffen wie Benzol oder Toluol oder besonders bevorzugt chlorierten Kohlenwasserstoffen wie Methylenchlorid oder Chloroform, in einem Temperaturbereich von –20°C bis +60°C, vorzugsweise von 0°C bis +40°C bromiert. Es können aber auch die entsprechenden Chlorverbindungen verwendet werden, die beispielsweise durch Umsetzung der Verbindungen VIIIa mit SOCl₂ erhältlich sind.

Im fünften Reaktionsschritt E werden die bromierten oder chlorierten Verbindungen (IXa) mit Triphenylphosphan in inerten Lösungsmitteln wie Acetonitril oder Kohlenwasserstoffen wie Benzol, Toluol oder Xylol, oder Benzonitril oder Dimethylformamid oder Dimethylsulfoxid oder in einem Alkohol wie Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol oder Isopropanol oder ohne Lösungsmittel in einem Temperaturbereich von 0°C bis +200°C, vorzugsweise von +20°C bis +180°C unter Darstellung der Phosphoniumsalze Xa umgesetzt.

Über dieses Verfahren sind die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) zugänglich, bei denen V fehlt. Bei den Verbindungen der Formeln (IVa) bis (Xa) hat der Rest R³ die gleiche Bedeutung wie vorstehend definiert.

Die Acetylenverbindungen der Formel (IVa) sind beispielsweise durch Umsetzung entsprechender Amine oder cyclischer Substrate mit einer nukleophilen Gruppe, beispielsweise Phenolderivate, Anilinderivate oder carbanionische Derivate wie Grignard-Reagenzien, mit ω-Halogenalkinen in Gegenwart von Basen auf bekannte Weise erhältlich. Besonders bevorzugt sind hierbei ω-Chloralkine wie beispielsweise 5-Chlor-1-pentin. Als Basen können beispielsweise Metallhydride wie Natriumhy-

5

10

15

20

25

drid verwendet werden. Die Umsetzung zu den Acetylenverbindungen der Formel (IVa) kann in organischen Lösungsmitteln wie beispielsweise Ethern, insbesondere Tetrahydrofuran, bei Temperaturen von $+20^{\circ}$ C bis $+80^{\circ}$ C unter Inertgasatmosphäre, beispielsweise Argon durchgeführt werden. In einigen Fällen kann es vorteilhaft sein, Komplexierungsmittel wie Hexaphosphorsäuretriamid zuzugeben. Alternativ können die Acetylenverbindungen (IVa) durch Umsetzung entsprechender Substrate mit einer nukleophil substituierbaren Gruppe, beispielsweise ω -Halogenalkylphenylverbindungen, vorzugsweise ω -Chloralkylphenylverbindungen, mit Acetyliden wie beispielsweise Natriumacetylid oder Lithiumacetylid unter dem Fachmann bekannten Bedingungen erhalten werden (vgl. z.B. J. March, Advanced Organic Chemistry, 3.Auflage, Wiley, S. 429).



Verfahren I – 2. Variante

$$(CH_2)_{\overline{n-2}} CH_2OH \longrightarrow (CH_2)_{\overline{n-2}} CH_2Br$$

$$(CH_2)_{n-2}CH = CH_{n-2}CH = CH_{n-2}CH_{n-2}CH$$

$$(CH_2)_{n-2}CH = CH$$
 $(CH_2)_{pOH}$
 $(CH_2)_{pOH}$

$$(CH_2)_n$$
 $(CH_2)_m$
 CH_2OH
 F

$$(CH_2)_n$$
 $(CH_2)_m$
 CH_2
 CH_2

wobei das Verfahren nicht auf die hier beispielhaft dargestellten Verbindungen eingeschränkt ist, bei denen Y und B für Phenyl, Q für eine Alkylenkette steht und V fehlt, sondern grundsätzlich mit Verbindungen mit beliebigen Resten V, Q, Y und B durchgeführt werden kann.

5

Im ersten Reaktionsschritt werden die als Ausgangsverbindungen verwendeten Alkohole bromiert, wobei als Bromierungsmittel beispielsweise die Verbindungen eingesetzt werden können, die im Schritt D der 1. Variante des Verfahrens I aufgeführt sind.

10

Die so erhaltenen Bromide werden wie im Schritt E der 1. Variante von Verfahren I mit Triphenylphosphan umgesetzt.

15

Im nächsten Reaktionsschritt wird wie vorstehend erläutert das reaktive Ylid erzeugt und dieses mit einem Brombenzaldehyd mit gewünschtem Substitutionsmuster umgesetzt.

20

25

Aus der so erhaltenen Verbindung können durch Umsetzung mit einer Base, vorzugsweise t-Butyllithium in einem inerten Lösungsmittel (Tetrahydrofuran), bei tiefen Temperaturen und anschließender Zugabe eines entsprechenden Elektrophils wie Paraformaldehyd oder Ethylenoxid die entsprechenden primären Alkohole (W' ist eine Direktbindung) erhalten werden. Wahlweise können die so erhaltenen Verbindungen mit einem gegebenenfalls geschützten Hydroxyalkin wie dem Tetrahydropyranylether von Propargylalkohol unter den gleichen Bedingungen wie im Verfahrensschritt I der 1. Variante von Verfahren I umgesetzt (W' bedeutet C≡C) und anschließend durch eine Hydrierung, die analog zu Schritt C der 1. Variante von Verfahren I durchgeführt werden kann, zu den primären Alkoholen umgewandelt werden. Die so erhaltenen primären Alkohole werden analog zur 1. Variante des Verfahrens I in die entsprechenden Phosphoniumsalze überführt.

Über dieses Verfahren sind die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) zugänglich, bei denen V fehlt.

Die als Ausgangsverbindungen bei diesem Verfahren verwendeten Alkohole, beispielsweise Hydroxyalkyloxyphenylverbindungen beziehungsweise Hydroxyalkylphenylverbindungen, sind entweder käuflich erhältlich oder durch dem Fachmann bekannte herkömmliche Reaktionen darstellbar.

Bei den im vorstehenden Diagramm aufgeführten Verbindungen hat der Rest R³ die gleiche Bedeutung wie vorstehend definiert.



Verfahren II - 1. Variante

XIa XIIa

$$(CH_2)_n$$
-OH

 R^3

XIIIa

$$(CH_2)_n$$
-OSO $_2$
 CH_3
 CH_3

XIVa

- wobei das Verfahren nicht auf die hier beispielhaft dargestellten Verbindungen eingeschränkt ist, bei denen Y und B für Phenyl, Q für eine Alkylenkette steht und V für O steht, sondern grundsätzlich mit Verbindungen mit beliebigen Resten V, Q, Y und B durchgeführt werden kann.
- Im ersten Reaktionsschritt dieser Variante werden die Bromverbindungen (XIa) mit den Phenolen (XIIa) in bevorzugten Lösungsmitteln wie Wasser oder Alkoholen wie

beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol, oder Ethern wie Diethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan oder Dimethyloxymethan, oder Dimethylformamid oder Dimethylsulfoxid, oder Acetonitril oder Ketonen wie beispielsweise Aceton, besonders bevorzugt in Isopropanol, in Gegenwart von Basen wie Alkalimetallhydroxiden, Carbonaten oder Alkoholaten wie beispielsweise Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Cäsiumcarbonat, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumethanolat oder Kalium-t.-butylat in einem Temperaturbereich von 0°C bis 200°C, vorzugsweise von +20°C bis +180°C umgesetzt.

10

5

Im zweiten Schritt B werden die Phenylether (XIIIa) mit Tosylchlorid in inerten Lösungsmitteln wie Ether, beispielsweise Diethylether, Tetrahydrofuran oder Dioxan, oder Kohlenwasserstoffen wie Benzol oder Toluol, oder chlorierten Kohlenwasserstoffen wie Chloroform oder Methylenchlorid, oder in Ethylacetat, Aceton oder Acetonitril, vorzugsweise in Methylenchlorid, in Gegenwart von Basen wie Triethylamin, Pyridin oder Dimethylaminopyridin, vorzugsweise in Gegenwart von Pyridin, in einem Temperaturbereich von –30°C bis +50°C, vorzugsweise von –10°C bis +30°C umgesetzt.

20

15

Im dritten Reaktionsschritt C werden die Tosylverbindungen (XIVa) mit Triphenylphosphan in bevorzugten Lösungsmitteln wie Kohlenwasserstoffen, beispielsweise
Benzol oder Toluol, Benzonitril, Acetonitril, Dimethylformamid oder Dimethylsulfoxid, oder ohne Lösungsmittel, besonders bevorzugt in Acetonitril, in einem
Temperaturbereich von 0°C bis +200°C, vorzugsweise von +20°C bis +180°C unter
Erhalt der Phosphoniumsalze (XVa) umgesetzt.

25

Bei den Schritten B und C kann die Hydroxyverbindung XIIIa auch analog zu den Schritten D und E der ersten Variante des Verfahrens A zunächst in das Bromid und anschließend in das Phosphoniumsalz überführt werden.

30

Über dieses Verfahren sind die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) zugänglich, bei denen V für O steht.

Für den Fall, dass B für einen Heterocyclus steht, kann das Verfahren auch dermaßen durchgeführt werden, dass anstelle des Bromids (XIa) der entsprechende Alkohol mit einer Verbindung (XIIa) umgesetzt wird, welche anstatt der direkt am Heterocyclus befindlichen Hydroxygruppe eine geeignete Abgangsgruppe wie beispielsweise einen Halogenrest, eine Tosyl-, Mesyl- oder Triflatgruppe besitzt und zudem anstatt dem Rest (CH₂)_mOH eine Estergruppe aufweist. Durch anschließende Reduktion der Estergruppe mit gängigen Reduktionsmitteln wie beispielsweise LiAlH₄ kann die Verbindung der Formel (XIIIa) erhalten werden.



5

Verfahren II - 2. Variante

15

wobei das Verfahren nicht auf die hier beispielhaft dargestellten Verbindungen eingeschränkt ist, bei denen Y und B für Phenyl stehen, sondern grundsätzlich mit Verbindungen mit beliebigen Resten Y und B durchgeführt werden kann.

20 kylphenylverbindungen, mit Triphenylphosphoniumhydrobromid in einem organischen Lösungsmittel wie beispielsweise Acetonitril bei einer Temperatur von +30°C bis +100°C, vorzugsweise von +50C bis +90°C umgesetzt. Die Ausgangsverbindungen können auf herkömmliche Weise erhalten werden. Beispielsweise können für den Fall, dass V gleich O ist, durch Umsetzung einer entsprechenden Halogenverbindung, beispielsweise einer Halogenalkylphenylverbindung, vorzugsweise einer Chlor- oder Bromalkylphenylverbindung wie beispielsweise Benzylbromid, mit ei-

nem entsprechenden Alkohol, beispielsweise einer Phenolverbindung wie beispielsweise 2-Hydroxybenzylalkohol, in einem organischen Lösungsmittel wie einem Alkohol, vorzugsweise Isopropanol, in Gegenwart einer Base wie beispielsweise Kaliumcarbonat bei einer Temperatur von +30 bis 100°C, vorzugsweise +50 bis 90°C umgesetzt.

Bei den in den vorstehenden Diagrammen des Verfahrens II aufgeführten Verbindungen hat der Rest R³ die gleiche Bedeutung wie vorstehend definiert. Der Rest V kann für O stehen oder fehlen.

10

20

5

Verfahren II - 3. Variante

wobei das Verfahren nicht auf die hier beispielhaft dargestellten Verbindungen eingeschränkt ist, bei denen Y und B für Phenyl stehen, sondern grundsätzlich mit Verbindungen mit beliebigen Resten Y und B durchgeführt werden kann.

Bei dieser Variante wird der Alkohol zunächst gemäß dem Schritt D des Verfahrens I, Variante 1,in ein Halogenid überführt, welches anschließend analog zum Schritt E


des Verfahrens I, Variante 1, zum gewünschten Phosphoniumsalz umgesetzt werden kann.

Bei dieser Variante haben Q und R³ die vorstehend angegebenen Bedeutungen.

5

Die Aldehyde der allgemeinen Formel (II) können in Abhängigkeit der Bedeutungen der verschiedenen Reste beispielsweise über folgende Verfahren hergestellt werden.

Verfahren III



$$HOH_2C$$
 $(CH_2)_0COOR^{35}$ OHC $(CH_2)_0COOR^{35}$ $COOR^{35}$ $COOR^{35}$

10

Im ersten Reaktionsschritt A dieser Variante wird das Keton XVIa (wobei o 3, 4 oder 5 bedeutet) mit 4-Halogenmethylbenzoesäureestern oder 4-Halogensulfenylbenzoesäureestern, wobei der Halogenrest vorzugsweise Chlor oder Brom ist, beziehungs-

weise den entsprechenden Nitrilen in inerten Lösungsmitteln wie einem Ether, beispielsweise Diethylether, Tetrahydrofuran oder Dioxan, oder Dimethylformamid, oder Dimethylsulfoxid, oder in Gemischen davon, besonders bevorzugt in Dimethylformamid, in Gegenwart von Basen wie Alkalimetallhydriden, Amiden oder Alkolaten wie Natriumhydrid, Kaliumhydrid, Lithiumdiisopropylamid, Kaliumethylat, Natriumethylat, Kaliummethylat oder Kalium-t.-butylat, besonders bevorzugt in Gegenwart von Natriumhydrid, in einem Temperaturbereich von –40°C bis +60°C, besonders bevorzugt von –20°C bis +30°C umgesetzt.

10

5

Im zweiten Reaktionsschritt B werden die Ketone XVIIa in Lösungsmitteln wie Dimethylformamid oder Alkoholen, beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol, oder in Wasser oder in Gemischen davon, besonders bevorzugt in Dimethylformamid oder Ethanol, in Gegenwart von Basen wie Alkalimetallhydroxiden, Alkalimetallcarbonaten oder Alkalimetallalkoholaten wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumcarbonat, Natriummethanolat, Natriumethanolat, Kaliumethanolat oder Kalium-t.-butanolat, besonders bevorzugt in Gegenwart von Kalium-t.-butanolat, in einem Temperaturbereich von 0°C bis +150°C, besonders bevorzugt von +20°C bis +100°C, unter Erhalt der Verbindungen XVIIIa umgesetzt.

20

25

30

15

Im dritten Reaktionsschritt C werden die Verbindungen XVIIIa in Lösungsmitteln wie Alkoholen, beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol, oder in Ethern, beispielsweise Methylether, Tetrahydrofuran oder Dioxan, oder in chlorierten Kohlenwasserstoffen wie Methylenchlorid oder Chloroform, oder Carbonsäuren wie Essigsäure oder Trifluoressigsäure, oder in Gemischen davon, besonders bevorzugt in Trifluoressigsäure, in Gegenwart von Säuren wie Mineralsäuren, beispielsweise Salzsäure, Bromwasserstoffsäure oder Schwefelsäure oder Carbonsäuren, beispielsweise Essigsäure oder Trifluoressigsäure, besonders bevorzugt in Gegenwart von Essigsäure, insbesondere bevorzugt in Gegenwart von Trifluoressigsäure, sowohl als Lösungsmittel als auch als Säure, in einem Temperaturbereich von –20°C bis +60°C, besonders bevorzugt von 0°C bis +30°C unter Erhalt der Carbonsäuren XIXa verseift.

Im vierten Schritt D werden die Carbonsäuren XIXa in Lösungsmitteln wie Ether, beispielsweise Diethylether, Tetrahydrofuran oder Dioxan, oder in chlorierten Kohlenwasserstoffen wie Methylenchlorid oder Chloroform, oder in Gemischen davon, besonders bevorzugt in Tetrahydrofuran, unter Verwendung von Borverbindungen als Reduktionsmittel, beispielsweise Boran oder der Boran-Dimethylsulfid-Komplex, in einem Temperaturbereich von –40 °C bis +60°C, besonders bevorzugt von –20°C bis +30°C, unter Erhalt der Hydroxylverbindungen XXa reduziert.

Im fünften Reaktionsschritt E werden die Hydroxyverbindungen XXa in Lösungs-

10

5

mitteln wie Ether, beispielsweise Diethylether, Dioxan oder Tetrahydrofuran, oder in chlorierten Wasserstoffen wie Methylenchlorid oder Chloroform, oder in Dimethylsulfoxid oder in Gemischen davon, besonders bevorzugt in Dichlormethan, unter Verwendung von Oxidationsmitteln wie Pyridiniumchlorchromat, Chrom-(VI)-Salzen, Dimethylsulfoxid/ Pyridin/SO₃, katalytischen Mengen von Tetraalkylammoniumperruthenat in Gegenwart von N-Methylmorpholinoxid und Molekularsieb, Dimethylsulfoxid/Oxalylchlorid/ Triethylamin, besonders bevorzugt unter Verwendung von Pyridiniumchlorchromat, katalytischen Mengen von Tetraalkylammoniumperruthenat in Gegenwart von N-Methylmorpholin und Molekularsieb oder Dimethylsulfoxid/Oxalylchlorid/ Triethylamin, gegebenenfalls in Anwesenheit von Basen wie Triethylamin, Diisopropylamin, Pyridin oder Dimethylaminopyridin, besonders bevorzugt in Gegenwart von Triethylamin, in einem Temperaturbereich von

20

15

25

de XXIa oxidiert.

Die cyclischen Ketone XVIa sind entweder käuflich oder auf dem Fachmann bekannten herkömmlichen Wegen, beispielsweise durch Dieckmann-Kondensation der entsprechenden Carbonsäuredieester darstellbar.

-20°C bis +60°C, besonders bevorzugt von 0°C bis +30°C, unter Erhalt der Aldehy-

Die mit den Ketonen XVIa umzusetzenden 4-Chlormethylbenzoesäureester oder 4-Chlorsulfenylbenzoesäureester bzw. die entsprechenden Nitrile sind entweder käuflich oder auf dem Fachmann bekannten herkömmlichen Wegen darstellbar.

Bei den in dem vorstehenden Diagramm des Verfahrens III aufgeführten Verbindungen haben die Reste R², R³⁵ und U die gleichen Bedeutungen wie vorstehend definiert und steht o für eine ganze Zahl von 1 bis 12.

Mit dem Verfahren III können Aldehyde (II) hergestellt werden, bei denen X für eine Alkylenkette, U für -CH₂-, R¹ für COOR³⁵ und R² für CN oder COOR²⁶ steht.

Verfahren IV

5

10

15

Bei diesem Verfahren wird ein Malonsäurediester (wobei als alkholische Komponente R' ein Allylrest oder niedere Alkylreste wie Methyl, Ethyl, t-Bu oder ein Benzylrest eingesetzt werden können) durch zwei aufeinanderfolgende Umsetzungen mit entsprechenden Elektrophilen in einen 2,2-disubstituierten Malonsäurediester überführt. Beispielsweise kann der als Ausgangsverbindung verwendete Malonsäure-

diester zunächst in Gegenwart einer Base wie beispielsweise Natriumhydrid, Triethylamin, Kaliumcarbonat, Natriumhydroxid, DABCO, Kaliumhydroxid, Lithiumdiisopropylamid oder Natriumamid, bevorzugt Natriumhydrid, mit einem entsprechenden Elektrophil wie einem entsprechenden Halogenid, Tosylat, Mesylat oder Triflat, zum Beispiel einem Halogenid wie ω-Chlor- oder ω-Bromcarbonsäureester, beispielsweise Bromessigsäuremethylester, in einem Lösungsmittel wie Dioxan bei Temperaturen von 0 bis 50°C umgesetzt werden. In einem zweiten Schritt kann das so erhaltene monsubstituierte Malonsäurediesterderivat durch Umsetzung mit einem entsprechenden Elektrophil wie einem entsprechenden Halogenid, Tosylat, Mesylat oder Triflat, zum Beispiel einem 2-Halogenbenzylderivat wie 2-(Bromomethyl)benzoesäuremethylester, in Gegenwart einer Base wie beispielsweise Natriumhydrid, Triethylamin, Kaliumcarbonat, Natriumhydroxid, DABCO, Kaliumhydroxid, Lithiumdiisopropylamid oder Natriumamid, bevorzugt Natriumhydrid, in einem Lösungsmittel wie Dimethylformamid bei Temperaturen von 0 bis 50°C umgesetzt werden. Die Umsetzungen mit den beiden Elektrophilen können jedoch auch in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werde.

Das so erhaltene 2,2-disubstituierte Malonsäurediesterderivat kann durch Reaktion mit einer Säure wie beispielsweise Salzsäure, Schwefelsäure oder Trifluoressigsäure, oder durch Reaktion mit einer Base wie Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid oder Lithiumhydroxid, oder durch eine Palladium-katalysierte Reaktion wie beispielsweise mit Ameisensäure in Gegenwart eines Pd-Katalysators, vorzugsweise eines Pd(II)-Katalysators wie Palladium-(II)-acetat, und eines Phosphans wie Triphenylphosphan und einer Base wie einem Amin, vorzugsweise Triethylamin, in einem Lösungsmittel wie Dioxan bei Temperaturen von 20 bis 120°C durch Esterspaltung und anschließende Decarboxylierung bei erhöhten Temperaturen in die entsprechenden Carbonsäurederivate überführt werden.

Diese Carbonsäurederivate können ihrerseits durch eine Reduktion mit herkömmlichen Reduktionsmitteln wie beispielsweise Diisobutylaluminiumhydrid (DIBAL),

10

15

5

20



Lithiumaluminiumhydrid oder Borhydriden wie Boran in Tetrahydrofuran zu den entsprechenden Alkoholen umgesetzt werden.

Diese Alkohole können schließlich mit herkömmlichen milden Oxidationsmitteln wie Cr-(VI)-Verbindungen wie PDC oder PCC, Kaliumpermanganat, Dimethylsulfoxid/Oxalylchlorid/Triethalmin (Swern-Oxidation) oder Tetrapropylammoniumperruthenat (TPAP) in Gegenwart einer Base wie N-Methylmorpholinoxid und Molsieb oder durch die Dess-Martin-Oxidation zu den entsprechenden Aldehyden oxidiert werden.

10

5

Bei den in dem vorstehenden Diagramm des Verfahrens IV aufgeführten Verbindungen haben die Reste R¹, R², U, X die gleichen Bedeutungen wie vorstehend definiert, wobei jedoch X nicht O und R¹ und R² keine freien Carboxylfunktionen sein dürfen.

Verfahren V

5

10

15

Bei dieser Variante wird zunächst ein Benzaldehydderivat mit einem Tetrahydofuranonphosphoran in einem organischen Lösungsmittel wie Dimethylsulfoxid unter Erhitzen umgesetzt. Das so erhaltene Alken wird anschließend mit herkömmlichen Reduktionsmitteln wie Pd/H₂/C zum entsprechenden 3-Benzoylmethyltetrahydrofuranonderivat umgesetzt. Dieses wird anschließend durch Ringöffnung unter Zugabe einer Säure wie HBr unter Erhitzen in Buttersäurederivat überführt. Die anschließend Reduktion mit hierfür herkömmlich verwendeten Reduktionsmitteln wie Boran in einem organischen Lösungsmittel wie Tetrahydrofuran ergibt zunächst den entsprechenden Alkohol, der anschließend mit einem üblichen Reduktionsmittel, wie Pyridiniumdichromat (PDC) zum Aldehyd oxidiert werden kann. Durch Umsetzung mit einer Verbindung R¹-Xa-Nu in Gegenwart einer herkömmlichen Base wie beispielsweise NaHCO₃ kann die Seitenkette entsprechend verändert werden. Diese Seiten-

kettenvariation kann aber auch erst nach der Umsetzung des Aldehyds mit einem Phosphoniumsalz gemäß Verfahren A durchgeführt werden.

Bei den im vorstehenden Schema angegebenen Verbindungen haben R¹ und R² die vorstehend angegebenen Bedeutungen. Xa hat die vorstehend angegebene Bedeutung von X, trägt aber zusätzlich eine nukleophile Gruppe Nu wie beispielsweise eine Aminogruppe und ist um die bereits im Molekül in der Seitenkette vorhandenen Kohlenstoffatome vermindert.

Verfahren VI

5

10

15

20

25

R-CH=CH-CH-X-CH₂CH₂CO₂R³⁵

R-CH₂CH₂-CH-X-CH₂CH₂CO₂R³⁵

R-CH₂CH₂-CH-X-CH₂CH₂CO₂R³⁵

COOR²⁶

Bei diesem Verfahren wird ein Alkenderivat in Lösungsmitteln wie Alkoholen, Wasser, Benzol, Toluol, Ethern wie Dimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Estern wie Ethylacetat, oder in Kohlenwasserstoffen wie Hexan, oder in Aminen wie Triethylamin oder in Ammoniak mit einem Reduktionsmittel wie Wasserstoff in Gegenwart eines Metallkatalysators wie den Oxiden oder löslichen Komplexen von Palladium, Platin, Ruthenium oder Nickel, oder mit einem Metall wie Lithium oder Natrium, oder mit Hydrazin oder Arylaralkoxy-substituierten Hydrazinen umgesetzt. Das Produkt dieser Reaktion ist ein Alkanderivat, worin W der allgemeinen Formel (I) – CH₂CH₂- oder –CH₂CH₂- bedeutet. Der normale Temperaturbereich für dieses Verfahrens beträgt –20°C bis +30°C.

Bei den in dem vorstehenden Diagramm des Verfahrens VI aufgeführten Verbindungen haben die Reste R²⁶, R³⁵, U und X die gleichen Bedeutungen wie in Anspruch 1 definiert. R' steht für einen der Substituneten, die gemäß Anspruch 1 an U vorhanden

sein kann. R steht für den Rest der Verbindungen der allgemeinen Formel (I), wobei R einen Arylrest, aber keine Doppelbindung enthalten darf.

Das erfindungsgemäße Verfahren B kann vorzugsweise in Acetonitril durch Reaktion der Verbindungen (IV) und (V) in Gegenwart einer Base wie Natriumcarbonat, Et₃N, DABCO, K₂CO₃, KOH, NaOH oder NaH durchgeführt werden. Die Reaktion kann im allgemeinen in einem Temperaturbereich von –20°C bis +90°C, vorzugsweise von 0°C bis +90°C ausgeführt werden. Die Reaktion kann bei Normaldruck, erhöhtem oder verringertem Druck ausgeführt werden (beispielsweise in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar). Im allgemeinen wird die Reaktion bei Normaldruck ausgeführt.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren B wird eine Verbindung der Formel (I) durch nukleophile Substitution einer Abgangsgruppe E in der Verbindung der Formel (V) durch die Hydroxy- oder Thiolfunktion der Verbindung der Formel (IV) dargestellt. Als Abgangsgruppen E kommen hierbei beispielsweise in Frage: Halogen, beispielsweise Cl, Br, I, Tosylat, Mesylat, oder eine durch Reagenzien wie Diisopropylazodicarboxylat/PPh₃ aktivierte Hydroxyfunktion (Mitsonobu-Reaktion).

Die als Ausgangsverbindung verwendete Verbindung der Formel (IV) kann durch Umsetzung einer entsprechenden Phosphoniumverbindung wie beispielsweise 2-Hydroxybenzyltriphenylphosphoniumbromid mit einem entsprechenden Aldehyd (II) analog zum Verfahren A hergestellt werden. Die Verbindungen der Formel (V) sind käuflich erhältlich oder auf dem Fachmann bekannte herkömmliche Weise zugänglich.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren C wird eine Verbindung der Formel (I), bei der R¹ und R² jeweils für eine freie Carboxylfunktion stehen, durch Überführung von Ester- und/oder Nitrilfunktionen der Verbindung (VI) in die entsprechenden freien Carboxylfunktionen erhalten. Diese Reaktion kann beispielsweise durch Zugabe wässriger Lösungen starker Säuren wie z.B. HCl oder H₂SO₄, oder starker Basen wie z.B. NaOH, KOH oder LiOH erfolgen. Die Reaktion kann vorzugsweise in einem

10

5

20

15

25

herkömmlichen organischen Lösungsmittel, welches sich unter den Reaktionsbedingungen nicht verändert, oder in Wasser durchgeführt werden. Vorzugsweise können für das erfindungsgemäße Verfahren C Ether wie Diethylether, Butylmethylester, Dioxan, Tetrahydrofuran, Glykoldimethylether oder Diethylenglykoldimethylether, oder Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol, Xylol oder Petrolether, oder Amide wie Dimethylformamid oder Hexamethylphosphortriamid, oder 1,3-Dimethyl-imidazolidin-2-on, 1,3-Dimethyl-tetrahydropyrimidin-2-on, Acetonitril, Essigsäureethylester oder Dimethylsulfoxid verwendet werden. Es ist selbstverständlich auch möglich, Gemische der vorstehend genannten Lösungsmittel zu verwenden.

10

5

Erfindungsgemäß bevorzugt ist beispielsweise die Durchführung der Reaktion in einem Gemisch aus Wasser und Methanol. Die Reaktion kann im allgemeinen in einem Temperaturbereich von –20°C bis +90°C, vorzugsweise von 0°C bis +90°C ausgeführt werden. Die Reaktion kann bei Normaldruck, erhöhtem oder verringertem Druck ausgeführt werden (beispielsweise in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar). Im allgemeinen wird die Reaktion bei Normaldruck ausgeführt.

20

15

Die als Ausgangsverbindungen verwendeten Verbindungen der Formel (VI) können auf einen der in der vorliegenden Anmeldung beschriebenen Wege zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I) dargestellt werden, beispielsweise gemäß Verfahren A.

25

Beim erfindungsgemäßen Verfahren D wird eine Verbindung der Formel (I) durch Umsetzung einer Verbindung der Formel (VII), welche eine substituierbare Gruppe L' enthält, mit einer Verbindung der Gruppe (VIII) in Gegenwart einer Palladiumverbindung sowie gegebenenfalls eines Reduktionsmittels und weiterer Zusatzstoffe im basischen Medium dargestellt. Die Reaktion stellt formal eine reduktive Kupplung der Verbindungen der Formeln (VII) und (VIII) dar, wie sie z.B. in L.S. Hegedus, Organometallics in Synthesis, M. Schlosser, Ed., Wiley & Sons, 1994, beschrieben ist.

Als substituierbare Gruppe L' bei den Verbindungen der Formel (VII) kann beispielsweise ein Halogenrest wie Br oder I oder eine herkömmliche Abgangsgruppe wie beispielsweise ein Triflatrest verwendet werden.

Die Verbindungen der Formel (VIII) enthalten eine reaktive Gruppe Z', welche aus der Gruppe, bestehend aus −B(OH)₂, -CH≡CH, -CH=CH₂ oder −Sn(nBu)₃, ausgewählt werden kann.

10

5

Als Palladiumverbindung kann eine Palladium(II)-Verbindung wie z.B. Cl₂Pd(PPh₃)₂ oder Pd(OAc)₂ oder eine Palladium(0)-Verbindung wie z.B. Pd(PPh₃)₄ oder Pd₂(dba)₃ verwendet werden. Falls erforderlich, können dem Reaktionsgemisch noch zusätzlich ein Reduktionsmittel wie beispielsweise Triphenylphosphin, BINAP oder andere Zusatzstoffe wie beispielsweise Cu(I)Br, NBu₄NCl, LiCl oder Ag₃PO₄ zugesetzt werden (vgl. hierzu T Jeffery, Tetrahedron lett. 1985, 26, 2667-2670; T. Jeffery, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1984, 1287-1289; S. Bräse, A. deMejiere in "Metal-catalyzied cross-coupling reactions", Ed. F. Diederich, P. J. Stang, Wiley-VCH, Weinheim 1998, 99-166).

20

15

Die Reaktion wird in Gegenwart einer herkömmlichen Base wie z.B. Na₂CO₃, NaOH oder Triethylamin durchgeführt. Als Lösungsmittel kommen die vorstehend beim Verfahren C genannten organischen Lösungsmittel in Frage, wobei Ether wie beispielsweise Dimethoxyethan besonders bevorzugt sind. Die Reaktion kann im allgemeinen in einem Temperaturbereich von –20°C bis +90°C, vorzugsweise von 0°C bis +90°C ausgeführt werden. Die Reaktion kann bei Normaldruck, erhöhtem oder verringertem Druck ausgeführt werden (beispielsweise in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar). Im allgemeinen wird die Reaktion bei Normaldruck ausgeführt.

25

30

Die als Ausgangsverbindungen verwendeten Verbindungen der Formel (VII) können auf einen der in der vorliegenden Anmeldung beschriebenen Wege zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I) dargestellt werden, beispielsweise gemäß Verfahren

A. Die Verbindungen der Formel (VIII) sind käuflich erhältlich oder auf dem Fachmann bekannte herkömmliche Weise darstellbar.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren E wird eine Verbindung der Formel (I) durch Umsetzung einer Verbindung der Formel (VII), welche eine substituierbare Gruppe L' enthält, mit einer Verbindung der Gruppe (IX) in Gegenwart einer Palladiumverbindung sowie gegebenenfalls eines Reduktionsmittels und weiterer Zusatzstoffe im basischen Medium dargestellt. Die Reaktion stellt formal eine reduktive Kupplung der Verbindungen der Formeln (VII) und (IX) dar, wie sie z.B. von J. F. Hartwig, Angew. Chem. 1998, 10, 2154, beschrieben ist.

Als substituierbare Gruppe L' bei den Verbindungen der Formel (VII) kann beispielsweise ein Halogenrest wie Br oder I oder eine herkömmliche Abgangsgruppe

wie beispielsweise ein Triflatrest verwendet werden.

Als Palladiumverbindung kann eine Palladium(II)-Verbindung wie z.B. Cl₂Pd(PPh₃)₂ oder Pd(OAc)₂ oder eine Palladium(0)-Verbindung wie z.B. Pd(PPh₃)₄ verwendet werden. Falls erforderlich, können dem Reaktionsgemisch noch zusätzlich ein Reduktionsmittel wie beispielsweise Triphenylphosphin oder andere Zusatzstoffe wie beispielsweise Cu(I)I zugesetzt werden.

Die Reaktion wird in Gegenwart einer herkömmlichen Base wie z.B. Na₂CO₃, NaOH, NaOt-Bu oder Triethylamin durchgeführt. Als Lösungsmittel kommen die vorstehend beim Verfahren C genannten organischen Lösungsmittel in Frage, wobei

Ether wie beispielsweise Dimethoxyethan besonders bevorzugt sind. Die Reaktion kann im allgemeinen in einem Temperaturbereich von –20°C bis +90°C, vorzugsweise von 0°C bis +90°C ausgeführt werden. Die Reaktion kann bei Normaldruck, erhöhtem oder verringertem Druck ausgeführt werden (beispielsweise in einem Be-

reich von 0,5 bis 5 bar). Im allgemeinen wird die Reaktion bei Normaldruck ausge-

führt.

10

5

15

20



30

Die als Ausgangsverbindungen verwendeten Verbindungen der Formel (VII) können auf einen der in der vorliegenden Anmeldung beschriebenen Wege zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I) dargestellt werden, beispielsweise gemäß Verfahren A. Die Verbindungen der Formel (IX) sind käuflich erhältlich oder auf dem Fachmann bekannte herkömmliche Weise darstellbar.

10

15

5

Beim erfindungsgemäßen Verfahren F wird zunächst eine Verbindung der Formel (IV) analog zum Verfahren B mit einer Verbindung der Formel (X) umgesetzt. Die Verbindung der Formel (X) besitzt zwei Abgangsgruppe E und E', welche voneinander unabhängig beispielsweise Halogen, beispielsweise Cl, Br, I, Tosylat, Mesylat, oder eine durch Reagenzien wie Diisopropylazodicarboxylat/PPh₃ aktivierte Hydroxyfunktion (Mitsonobu-Reaktion) darstellen können. Die Abgangsgruppen E und E' müssen jedoch so gewählt werden, dass sie selektiv und unabhängig voneinander reagieren können. Man kann aber auch die Verbindung der Formel (X) bei der Umsetzung mit der Verbindung der Formel (IV) im Überschuss einsetzen. In diesem Fall können die Abgangsgruppen E und E' auch gleich sein.

20

Anschließend wird die so erhaltene Verbindung der Formel (XI) mit einem Amin der Formel (XII) in Gegenwart einer Base umgesetzt. Die Reaktion wird in Gegenwart einer herkömmlichen Base wie z.B. Na₂CO₃, K₂CO₃, NaOH, NaOt-Bu oder Triethylamin durchgeführt. Als Lösungsmittel kommen die vorstehend beim Verfahren C genannten organischen Lösungsmittel in Frage, wobei Acetonitril besonders bevorzugt ist. Die Reaktion kann im allgemeinen in einem Temperaturbereich von –20°C bis +90°C, vorzugsweise von 0°C bis +90°C ausgeführt werden. Die Reaktion kann bei Normaldruck, erhöhtem oder verringertem Druck ausgeführt werden (beispielsweise in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar). Im allgemeinen wird die Reaktion bei Normaldruck ausgeführt. Gegebenenfalls kann der Reaktionslösung eine katalytische Menge an Kaliumiodid zugegeben werden.

30

25

Die Verbindungen der Formel (X) und (XII) sind käuflich erhältlich oder auf dem Fachmann bekannte herkömmliche Weise darstellbar.

Bei den erfindungsgemäßen Verfahren G und H wird jeweils ein Alkohol (XIII) oder (XVI) mit einer Verbindung mit einer herkömmlichen Abgangsgruppe (XIV) oder (XV) gemäß einer nukleophilen Substitutionsreaktion umgesetzt.

5

Als Abgangsgruppen E" und E" in den Verbindungen der Formeln (XIV) und (XV) kommen in Frage: Halogen, beispielsweise Cl, Br, I, Tosylat, Mesylat, oder eine durch Reagenzien wie Diisopropylazodicarboxylat/PPh₃ aktivierte Hydroxyfunktion (Mitsonobu-Reaktion).

10

15

Als Basen kommen beispielsweise Natriumcarbonat, Et₃N, DABCO, K₂CO₃, KOH, NaOH, NaH oder Silberoxid/Molekularsieb in Frage. Die Reaktion kann im allgemeinen in einem Temperaturbereich von –20°C bis +90°C, vorzugsweise von 0°C bis +90°C ausgeführt werden. Die Reaktion kann bei Normaldruck, erhöhtem oder verringertem Druck ausgeführt werden (beispielsweise in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar). Im allgemeinen wird die Reaktion bei Normaldruck ausgeführt. Als Lösungsmittel kommen die vorstehend beim Verfahren C genannten organischen Lösungsmittel in Frage, wobei Benzol besonders bevorzugt sind.

20

Die als Ausgangsverbindungen verwendeten Verbindungen der Formeln (XIII) bis (XVI) können über eines der Verfahren I bis IV hergestellt werden, wo sie als Zwischenverbindungen beschrieben sind. Weiterhin kann die Verbindung XV beispielsweise über Bromierung mit PBr₃ oder CBr₄/PPh₃ aus einer Verbindung der Formel XIII hergestellt werden.

25

30

Bei den erfindungsgemäßen Verfahren I und J wird ein Amin der Formel (XVIII) oder (XIX) mit einer Carbonylverbindung der Formel (XVII) oder (XX) umgesetzt. Dies kann entweder unter Bildung einer Schiffschen Base und anschließender Reduktion derselben oder auf direkte Weise unter Bedingungen einer reduktiven Alkylierung erfolgen.

Bei der ersten Variante werden die Reaktanden unter herkömmlichen Bedingungen (vgl. J. March, Advanced organic Chemistry, Wiley, 3rd ed., S. 796 f.) miteinander umgesetzt. Die so erhaltene Schiffsche Base wird anschließend mit einem Reduktionsmittel zur gewünschten Aminoverbindung reduziert. Als Reduktionsmittel können die hierfür herkömmlich verwendeten Reduktionsmittel wie beispielsweise NaBH₄, H₂/Pd/C, NaBH(OAc)₃ oder NaCNBH₃ verwendet werden.

Bei der zweiten Variante werden die Reaktanden unter herkömmlichen Bedingungen (vgl. J. March, Advanced organic Chemistry, Wiley, 3rd ed., S. 798 f.) in Gegenwart eines Reduktionsmittels miteinander umgesetzt. Als Reduktionsmittel können die hierfür herkömmlich verwendeten Reduktionsmittel wie beispielsweise H₂/Pd/C, NaCNBH₃ oder NaBH(OAc)₃ verwendet werden.

Die als Ausgangsverbindungen verwendeten Verbindungen der Formel (XVII) können gemäß einem der Verfahren III oder IV hergestellt werden. Die als Ausgangsverbindungen verwendeten Verbindungen der Formel (XVIII) oder (XX) können beispielsweise aus einer der bei den Verfahren I oder II erhaltenen Zwischenverbindungen durch herkömmliche Verfahren dargestellt werden. So sind die Amine (XVIII) beispielsweise durch Reaktion der entsprechenden Halogenide oder Tosylate mit Phthalimid (Gabriel-Synthese) beziehungsweise die Aldehyde (XX) durch Oxidation der entsprechenden Alkohole auf bekannte Weise zugänglich. Die als Ausgangsverbindungen verwendeten Verbindungen der Formel (XIX) können aus einer der bei den Verfahren III oder IV erhaltenen Zwischenverbindungen dargestellt werden, beispielsweise durch Umsetzung eines aus einem entsprechenden Alkohol erhaltenen Tosylats mit Benzylamin und anschließende hydrogenolytische Abspaltung der Benzylgruppe oder über die Reaktion der Verbindung der Formel (XVII) mit Benzylamin gemäß Verfahren [I] und anschließende hydrogenolytische Abspaltung der Benzylgruppe.

10

5

20

15

Die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I), bei denen U für O, S, SO oder SO₂ steht, können über das erfindungsgemäße Verfahren [K] hergestellt werden. Hierbei werden Aldehyde der Formel (XXI)

$$R^3$$
 B
 $(V-Q-Y)_r$
 (XXI)

5

worin

R³, V, Q, Y, r und B die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

10

mit Phosphorverbindungen der Formel (XXII)

$$(EtO)_2$$
 $X-R^1$ $(XXII)$


worin

15

X und R^1

die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

zu Verbindungen der Formel (XXIII)



worin

R³, V, Q, Y, r, B, X und R¹

die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

5

umgesetzt und anschließend durch aufeinanderfolgende Reduktion der Alkengruppe und der Carbonylgruppe und anschließende Substitution der durch Reduktion der Carbonylgruppe erzeugten Hydroxygruppe mit Alkoholen oder Thiolen sowie gegebenenfalls anschließende Oxidation zu den entsprechenden Sulfoxid- oder Sulfonverbindungen in Verbindungen der Formel (XXIV) überführt,

10

$$R^3$$
 $U-A-R^2$
 $(XXIV)$

worin

15

R³, V, Q, Y, r, B, X, U, A, R² und R¹ die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben.

20

Die Aldehyde der Formel (XXI) sind beispielsweise aus den bei den Verfahren I und II als Zwischenprodukte eingesetzten Alkoholen durch dem Fachmann bekannte herkömmliche Oxidationsreaktionen zugänglich (vgl. z.B. J. March, Advanced organic Chemistry, 3rd ed., S. 1057 ff., Wiley).

25

Die Phosphorverbindungen der Formel (XXII) können beispielsweise durch Umsetzung von Alkandicarbonsäurederivaten, beispielsweise den entsprechenden Monoestern, mit Phosphonoessigsäurederivaten, beispielsweise den entsprechenden Die-

stern, hergestellt werden. Möglich ist aber auch die Synthese aus Phosphiten wie beispielsweise Triethylphosphit mit entsprechenden α -Halogenketonderivaten (Arbuzov-Rkt, vgl. z.B. J. March, Advanced organic Chemistry, 3rd ed., S. 848 ff., Wiley).

Die Umsetzung der Verbindungen der Formel (XXI) mit Verbindungen der Formel (XXII) erfolgt in Gegenwart von Basen wie Alkalimetallhydriden, beispielsweise Natriumhydrid, Alkalimetallalkoholaten, beispielsweise Kalium-t-butylat, oder in Gegenwart von Salzen wie beispielsweise MgCl₂ und Basen wie Aminen, beispielsweise Triethylamin, oder der Hünig-Base. Die Reaktion wird vorzugsweise in organischen Lösungsmitteln, besonders bevorzugt in Tetrahydrofuran, bei Raumtemperatur oder unter leichtem Erhitzen durchgeführt.

Die so erhaltenen Carbonylverbindungen der Formel (XXIII) werden nach herkömmlichen, dem Fachmann bekannten Verfahren zu den entsprechenden Alkoholen reduziert (vgl. z.B. J. March, Advanced organic Chemistry, 3rd ed., S. 809 ff., Wiley). Besonders bevorzugt ist die Verwendung von komplexen Metallhydriden wie Diisobutylaluminiumhydrid (DIBAL), NaBH₄ oder NaBH₄/CeCl 7 H₂O. Die Reaktion wird vorzugsweise in organischen Lösungsmitteln wie beispielsweise Alkoholen wie Methanol unter Kühlung durchgeführt.

Die olefinische Doppelbindung der so erhaltenen Hydroxyverbindungen kann nach herkömmlichen, dem Fachmann bekannten Verfahren hydriert werden (vgl. z.B. J. March, Advanced organic Chemistry, 3rd ed., S. 691 ff., Wiley). Bevorzugt ist die Hydrierung mit Wasserstoff in Gegenwart eines Metallkatalysators wie Pd/C oder Raney-Nickel in einem organischen Lösungsmittel wie beispielsweise Ethylacetat.

Die Einführung des Restes U-A-R² kann auf mehreren Wegen erfolgen. Beispielsweise kann die Hydroxyverbindung unter Mitsunobu-Bedingungen (vgl. O. Mitsunobu, Synthesis, 1981, 1-28) mit entsprechenden Alkoholen, Phenolen oder Thiolen

10

15

5

20

umgesetzt werden. Die Hydroxygruppe kann aber auch erst in eine Abgangsgruppe überführt werden, welche anschließend durch entsprechende Alkohole, Phenole oder Thiole in Gegenwart einer Base wie beispielsweise DABCO, Triethylamin, NaH, NaOH, KOH, LDA, Natriumamid oder besonders bevorzugt Kaliumcarbonat substituiert werden kann. Als Abgangsgruppen sind erfindungsgemäß bevorzugt Halogenreste wie Cl, Br oder I, welche durch Umsetzung der Hydroxyverbindung mit beispielsweise SOCl₂, SOBr₂, POCl₃, PCl₅, PBr₃ usw. einführbar sind, der Tosylatrest, welcher beispielsweise durch Umsetzung mit Tosylchlorid einführbar ist, der Mesylatrest, welcher beispielsweise durch Umsetzung mit MsCl einführbar ist, oder der Triflatrest, welcher durch Umsetzung mit beispielsweise Tf₂O oder TfCl einführbar ist.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen, insbesondere die Verbindungen der allgemeinen Formel (I), zeigen ein nicht vorhersehbares, wertvolles pharmakologisches Wirkspektrum.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen, insbesondere die Verbindungen der allgemeinen Formel (I), führen zu einer Gefäßrelaxation, Thrombozytenaggregationshemmung und zu einer Blutdrucksenkung sowie zu einer Steigerung des koronaren Blutflusses. Diese Wirkungen sind über eine direkte Stimulation der löslichen Guanylatcyclase und einem intrazellulären cGMP-Anstieg vermittelt.

Sie können daher in Arzneimitteln zur Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen wie beispielsweise zur Behandlung des Bluthochdrucks und der Herzinsuffizienz, stabiler und instabiler Angina pectoris, peripheren und kardialen Gefäßerkrankungen, von Arrhythmien, zur Behandlung von thromboembolischen Erkrankungen und Ischämien wie Myokardinfarkt, Hirnschlag, transistorisch und ischämische Attacken, periphere Durchblutungsstörungen, Verhinderung von Restenosen wie nach Thrombolysetherapien, percutan transluminalen Angioplastien (PTA), percutan transluminalen Koronarangioplastien (PTCA), Bypass sowie zur Behandlung von Arteriosklerose, fibrotischen Erkrankungen wie Leberfibrose oder Lungenfibrose,

10

15

5

20

25

10

15

20

nahme.

asthmatischen Erkrankungen und Krankheiten des Urogenitalsystems wie beispielsweise Prostatahypertrophie, erektile Dysfunktion, weibliche sexuelle Dysfunktion und Inkontinenz eingesetzt werden.

Die in der vorliegenden Erfindung beschriebenen Verbindungen, insbesondere die Verbindungen der allgemeinen Formel (I), stellen auch Wirkstoffe zur Bekämpfung von Krankheiten im Zentralnervensystem dar, die durch Störungen des NO/cGMP-Systems gekennzeichnet sind. Insbesondere sind sie geeignet zur Beseitigung kognitiver Defizite, zur Verbesserung von Lern- und Gedächtnisleistungen und zur Behandlung der Alzheimer'schen Krankheit. Sie eignen sich auch zur Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems wie Angst-, Spannungs- und Depressionszuständen, zentralnervös bedingten Sexualdysfunktionen und Schlafstörungen, sowie zur Regulierung krankhafter Störungen der Nahrungs-, Genuss- und Suchtmittelauf-

Weiterhin eignen sich die Wirkstoffe auch zur Regulation der cerebralen Durchblutung und stellen somit wirkungsvolle Mittel zur Bekämpfung von Migräne dar.

Auch eignen sie sich zur Prophylaxe und Bekämpfung der Folgen cerebraler Infarktgeschehen (Apoplexia cerebri) wie Schlaganfall, cerebraler Ischämien und des SchädelHirn-Traumas. Ebenso können die erfindungsgemäßen Verbindungen, insbesondere die
Verbindungen der allgemeinen Formel (I), zur Bekämpfung von Schmerzzuständen
eingesetzt werden.

Zudem besitzen die erfindungsgemäßen Verbindungen antiinflammatorische Wirkung und können daher als entzündungshemmende Mittel eingesetzt werden.

Gefäßrelaxierende Wirkung in vitro

Kaninchen werden durch intravenöse Injektion von Thiopental-Natrium narkotisiert bzw. getötet (ca. 50 mg/kg,) und entblutet. Die Arteria Saphena wird entnommen und

in 3 mm breite Ringe geteilt. Die Ringe werden einzeln auf je einem triangelförmigen, am Ende offenen Häkchenpaar aus 0,3 mm starkem Spezialdraht (Remanium®) montiert. Jeder Ring wird unter Vorspannung in 5 ml - Organbäder mit 37°C warmer, carbogenbegaster Krebs-Henseleit-Lösung folgender Zusammensetzung (mM) gebracht: NaCl: 119; KCl: 4,8; CaCl₂ x 2 H₂O: 1; MgSO₄ x 7 H₂O: 1,4; KH₂PO₄: 1,2; NaHCO₃: 25; Glucose: 10; Rinderserumalbumin: 0,001%. Die Kontraktionskraft wird mit Statham UC2-Zellen erfasst, verstärkt und über A/D-Wandler (DAS-1802 HC, Keithley Instruments München) digitalisiert, sowie parallel auf Linienschreibern registriert. Kontraktionen werden durch Zugabe von Phenylephrin induziert.

10

15

5

Nach mehreren (allgemein 4) Kontrollzyklen wird die zu untersuchende Substanz in jedem weiteren Durchgang in steigender Dosierung zugesetzt und die Höhe der unter dem Einfluss der Testsubstanz erzielten Kontraktion mit der Höhe der im letzten Vordurchgang erreichten Kontraktion verglichen. Daraus wird die Konzentration errechnet, die erforderlich ist, um die in der Vorkontrolle erreichte Kontraktion auf 50% zu reduzieren (IC₅₀). Das Standardapplikationsvolumen beträgt 5 μl. Der DMSO-Anteil in der Badlösung entspricht 0,1%.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 gezeigt:



10

15

Tabelle 1: Gefäßrelaxierende Wirkung in vitro

Beispiel	IC ₅₀ (nM)				
26	1,9				
29	2,5				
30	3500				
34	170				
72	0,2				
76	5,2				
78	5,8				
81	3,9				
93	0,2				
116	190				
132	220				
150	30				
164	. 580				

Stimulation der rekombinanten löslichen Guanylatcyclase (sGC) in vitro

Die Untersuchungen zur Stimulation der rekombinanten löslichen Guanylatcyclase (sGC) und die erfindungsgemäßen Verbindungen mit und ohne Natriumnitroprussid sowie mit und ohne den Häm-abhängigen sGC-Inhibitor 1*H*-1,2,4-Oxadiazol-(4,3a)-chinoxalin-1-on (ODQ) wurden nach der in folgender Literaturstelle im Detail beschriebenen Methode durchgeführt: M. Hoenicka, E.M. Becker, H. Apeler, T. Sirichoke, H. Schroeder, R. Gerzer und J.-P. Stasch: Purified soluble guanylyl cyclase expressed in a baculovirus/Sf9 system: stimulation by YC-1, nitric oxide, and carbon oxide. J. Mol. Med. 77 (1999) 14.

Die Häm-freie Guanylatcyclase wurde durch Zugabe von Tween 20 zum Probenpuffer (0,5% in der Endkonzentration) erhalten.

15

Die Aktivierung der sGC durch eine Prüfsubstanz wird als n-fache Stimulation der Basalaktivität angegeben.

5 Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 gezeigt:

Tabelle 2: Stimulation der rekombinanten löslichen Guanylatcyclase (sGC) in vitro

Stimulation (n-fach)						
Bsp. 93	Häm-hal	Häm-haltige sGC			Häm-freie sGC	
Konzentration	Basal	+ SNP	+ ODQ	Basal	+ ODQ	
(μΜ)		(0.1 μΜ)	(10 μΜ)		(10 μM)	
0	1	15	1	1	1	
0.1	17	45	84	436	392	
1.0	23	44	151	476	435	
10	33	54	178	541	500	

Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass eine Stimulation sowohl des Häm-haltigen als auch des Häm-freien Enzyms erreicht wird. Weiterhin zeigt eine Kombination aus sGC-Stimulator und Natriumnitroprussid (SNP), einem NO-Donor, keine synergistischen Effekt, d.h. die Wirkung von SNP wird nicht potenziert, wie dies bei über einem Häm-abhängigen Mechanismus wirkenden sGC-Stimulatoren zu erwarten wäre. Darüber hinaus wird die Wirkung des erfindungsgemäßen sGC-Stimulators durch den Häm-abhängigen Inhibitor der löslichen Guanylatcyclase ODQ nicht blockiert. Die Ergebnisse aus Tabelle 2 belegen somit den neuen Wirkmechanismus der erfindungsgemäßen Stimulatoren der löslichen Guanylatcyclase.

Zur vorliegenden Erfindung gehören pharmazeutische Zubereitungen, die neben nichttoxischen, inerten pharmazeutisch geeigneten Trägerstoffen die erfindungsgemäßen

10

15

20

25

Verbindungen, insbesondere die Verbindungen der allgemeinen Formel (I), enthält sowie Verfahren zur Herstellung dieser Zubereitungen.

Die Wirkstoff können gegebenenfalls in einem oder mehreren der oben angegebenen Trägerstoffe auch in mikroverkapselter Form vorliegen.

Die therapeutisch wirksamen Verbindungen, insbesondere die Verbindungen der allgemeinen Formel (I), sollen in den oben aufgeführten pharmazeutischen Zubereitungen in einer Konzentration von etwa 0,1 bis 99,5, vorzugsweise von etwa 0,5 bis 95 Gew.-%, der Gesamtmischung vorhanden sein.

Die oben aufgeführten pharmazeutischen Zubereitungen können ausser den erfindungsgemäßen Verbindungen, insbesondere den Verbindungen der allgemeinen Formel (I), auch weitere pharmazeutische Wirkstoffe enthalten.

Im allgemeinen hat es sich sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin als vorteilhaft erwiesen, den oder die erfindungsgemäßen Wirkstoffe in Gesamtmengen von etwa 0,5 bis etwa 500, vorzugsweise 5 bis 100 mg/kg Körpergewicht je 24 Stunden, gegebenenfalls in Form mehrerer Einzelgaben, zur Erzielung der gewünschten Ergebnisse zu verabreichen. Eine Einzelgabe enthält den oder die erfindungsgemäßen Wirkstoffe vorzugsweise in Mengen von etwa 1 bis etwa 80, insbesondere 3 bis 30mg/kg Körpergewicht.

Die vorliegende Erfindung wird nachstehend anhand von nicht einschränkenden bevorzugten Beispielen näher dargestellt. Soweit nicht anderweitig angegeben, beziehen sich alle Mengenangaben auf Gewichtsprozente.

Beispiele

Abkürzungen:

5 RT:

Raumtemperatur

EE:

Essigsäureethylester

BABA:

n-Butylacetat/n-Butanol/Eisessig/Phosphatpuffer pH 6

(50:9:25.15; org. Phase)

10 Laufmittel für die Dünnschichtchromatographie:

T1E1:

Toluol - Essigsäureethylester (1:1)

T1EtOH1:

Toluol - Methanol (1:1)

C1E1:

Cyclohexan – Essigsäureethylester (1:1)

15 C1E2:


Cyclohexan – Essigsäureethylester (1:2)

Ausgangsverbindungen

Darstellung der Phosphoniumverbindungen

20

Ia: 2-(5-Phenylpentyloxy)nicotinsäure



Zu einer Suspension von 635 mg (15,9 mmol) 60%-igem Natriumhydrid in 25 ml DMF bei 0°C wird langsam 1,00 g (6,35 mmol) 2-Chlornicotinsäure zugegeben und anschließend 30 min bei 0°C gerührt. 1,15 g (6,98 mmol) 5-Phenyl-1-pentanol werden in 5ml DMF gelöst und langsam zur vorstehenden Reaktionslösung getropft. Die Lösung wird 3,5 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Es wird dann auf 75°C erhitzt und über Nacht weiter gerührt. Die Substanz wird in Wasser aufgenommen, dann Essigester zugegeben, und die wässrige Phase mit 1M HCl angesäuert. Dann wird mit Essigester extrahiert, mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingedampft.

10

5

Das Produkt wird roh weiter umgesetzt.

Ib: 2-(5-Benzyloxy)nicotinsäure

15

20

Die Darstellung erfolgte analog Beispiel Ia mit 4,00 g (25,4 mmol) Benzylalkohol als alkolischer Komponente.

Ausbeute: 5,02 g (86,4 % d.Th.)

¹H-NMR (200 MHz, CDCl₃): 8,50 (m, 2H), 7,40 (m, 5H), 7,10 (m, 1H), 5,60 (s, 2H).

IIa) 2-(5-Phenylpentoxy)-3-pyridinylmethanol

500 mg (1,75 mmol) der Säure aus Bsp. Ia wurden in 20 ml Tetrahydrofuran (THF) bei 0°C unter Argon gelöst. Dann wurden langsam 3,5 ml (3,5 mmol) einer LiAlH₄-Lösung (1M in THF) zugegeben. Es wurde für 3 Stunden unter Rückfluss gekocht. Die Lösung wurde auf 0°C abgekühlt, langsam 1 ml Wasser, 1 ml 1N Natronlauge und 3 ml Wasser zugegeben. Bei Raumtemperatur wurden noch ca. 50ml Wasser hinzugegeben. Dann wurde mit Essigester extrahiert und mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingedampft.

Ausbeute: 410 mg (86,4 % d.Th.)

¹H-NMR (200 MHz, CDCl₃): 8,00 (m, 1H), 7,50 (m, 1H), 7,20 (m, 5H), 6,80 (m, 1H), 4,60 (s, 2H), 4,40 (t, 2H), 3,60 (t, 1H), 2,60 (m, 2H), 1,90-1,20 (m, 6H).

10

Analog wurde hergestellt:

Bsp.	Formel	Ausbeute (%)	Spektroskopische Daten
			¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): 8,00
Пр	ОН		(m, 1H), 7,60 (m, 1H), 7,20 (m,
(aus	NO	94,2	5H), 6,90 (m, 1H), 5,50 (s, 2H),
Bsp. Ib)			4,70 (bs, 2H), 2,20 (bs, 1H)



IIc: 3-(5-Phenylpentoxy)-2-pyridinylmethanol

10

1,9 g (6,01 mmol) Phenylpentylbromid, 1,00 g (8,00 mmol) 2-Hydroxymethyl-3-pyridinol und 1,2 g (8,8 mmol) Kaliumcarbonat werden über Nacht unter Rückfluss erhitzt. Es wird in Essigester aufgenommen, mit Wasser, 2N Natronlauge und Wasser gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft.

Ausbeute: 853 mg (52,3 % d. Th.)

¹H-NMR (200 MHz, CDCl₃): 8,10 (m, 1H), 7,40-7,10 (m, 7H), 4,80 (d, 2H), 4,40 (t, 1H), 4,00 (t, 2H), 2,60 (m, 2H), 1,90-1,20 (m, 6H)

IId) 2-Butyloxybenzylalkohol

12,4 g (90,5 mmol) Butylbromid, 11,2 g (90,5 mmol) 2-Hydroxybenzylalkohol und 12,5 g (90,5 mmol) Kaliumcarbonat werden in 270 ml 2-Propanol unter Rückfluss über Nacht erhitzt. Die Suspension wird abgekühlt, in Essigester aufgenommen und mit 1N Natronlauge und Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingedampft.

Ausbeute: 12,8 g (78,3% d. Th).

10 R_f (SiO₂, C4E1): 0,14

5

Analog wurden dargestellt:

Beispiel	Formel	Ausbeute	R _f -Wert
		(%)	
IIe (aus Heptyliodid)	ОН	96,3	0,57 (C1E1)
IIf (aus 4-Phenylbenzyl- bromid)	ОН	90,8	0,53 (C1E1)

Beispiel	Formel	Ausbeute	R _f -Wert
		(%)	
IIg (aus CH₃(CH₂)₁₅Br)	ОН	88,9	0,56 (C1E1)
IIh (aus Octylbromid)	ОН		0,63 (C1E1)
IIi (aus Hexylbromid)	ОН		0,69 (C1E1)

IIIa: 3-(Bromomethyl)-2-(5-phenylpentoxy)pyridin

410 mg (1,51 mmol) des Alkoholes aus Bsp. IIa werden in Toluol/Dichlormethan 2:1 gelöst. Dann werden 820 mg (3,03 mmol) Phosphortribromid zugegeben und bei Raumtemperatur 1 Stunde gerührt. Die Substanz wird in gesättigter NaHCO₃-Lösung aufgenommen, mit Essigester extrahiert, mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, eingeengt und durch Säulenchromatographie gereinigt.

Ausbeute: 321 mg (63,8 % d.Th.)

10

¹H-NMR (200 MHz, CDCl₃): 8,10 (m, 1H), 7,60 (m, 1H), 7,20 (m, 5H), 6,80 (m, 1H), 4,50 (s, 2H), 4,40 (t, 2H), 2,60 (m, 2H), 1,90-1,20 (m, 6H).

IIIb: 2-Benzyloxy-3-chloromethylpyridin

1,48 g (6,88 mmol) des Alkoholes aus Bsp. IIb werden in Dichlormethan gelöst und mit 5 ml (68,8 mmol) Thionylchlorid versetzt. Die Lösung wird 2 h bei Raumtemperatur gerührt, und das Lösungsmittel anschließend in Vakuum eingedampft. Dabei

10

fällt das Produkt als Hydrochlorid aus. Es wird in Wasser und Essigester aufgenommen, mit Natronlauge gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft.


Ausbeute: 769 mg (47,9 % d.Th.)

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): 8,00 (m, 1H), 7,60 (m, 1H), 7,20 (m, 5H), 6,80 (m, 1H), 5,40 (s, 2H), 4,60 (s, 2H).

Analog wurden dargestellt:

Bsp.	Formel	Ausbeute	Spektroskopische Daten
	·	(%)	
IIIc (aus IIc)	O CI	88,1	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): 8,20 (m, 1H), 7,70-7,20 (m, 7H), 4,70 (s, 2H), 4,10 (t, 2H), 2,60 (t, 2H), 1,90-1,50 (m, 6H)

IVa: (2-(5-Phenylpentoxy)-3-pyridinyl) methyltriphenylphosphoniumbromid



321 mg (0,96 mmol) des Bromids aus Bsp. IIIa und 264 mg (1,00 mmol) Triphenylphosphin werden in 20 ml Toluol 4 Stunden unter Rückfluss erhitzt. Das Lösungsmittel wird in Vakuum eingedampft, der Rückstand wird mit Ethylether zerkleinert, filtriert, getrocknet.

Ausbeute: 322 mg (56,3 % d.Th.)

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): 7,80-7,10 (m, 21H), 6,80 (m, 2H), 5,45 (d, J=15Hz, 2H), 3,70 (t, 2H), 2,60 (m, 2H), 1,60-1,30 (m, 6H).

10 Analog wurden dargestellt:

Bsp.	Formel	Ausbeu-	Spektroskopische Daten
		te (%)	
IVb (aus IIIb)	CI	86.6	¹ H-NMR (400 MHz, d ⁶ -DMSO): 8,10 (m, 1H), 7,90-7,20 (m, 21H), 6,90 (m, 1H), 5,00 (d, J=15Hz, 2H), 4,90 (s, 2H)
IVc (aus IIIc)		48,9	¹ H-NMR (400 MHz, d ⁶ -DMSO): 7,80-7,10 (m, 23H), 5,30 (d, J=15Hz, 2H), 3,80 (m, 2H), 2,60 (m, 2H), 1,60-1,30 (m, 6H)

IVd: 2-(Butyloxy) benzyltriphenylphosphoniumbromid

8,2 g (45,5 mmol) des Benzylalkohols IId und 15,6 g (45,5 mmol) Triphenylphosphoniumhydrobromid werden in 100 ml Acetonitril unter Rückfluss 5 Stunden erhitzt. Das Lösungsmittel wird im Vakuum eingedampft, und anschließend wird Diethylether zugegeben. Das Feststoff wird filtriert und im Vakuum getrocknet. Das Produkt wird roh weiter umgesetzt.

¹H-NMR (400 MHz, d⁶-DMSO): 7,80-6,70 (m, 19H), 4,90 (d, J=15Hz, 2H), 3,40 (t, 2H), 1,30 (m, 4H), 0,90 (t, 3H).

Analog wurden hergestellt:

Bsp.	Formel	Ausbeu-	Spektroskopische Daten
		te (%)	
IVe (aus IIe)	Br ⁻	91,2	¹ H-NMR (200 MHz, d ⁶ -DMSO): 7,80-6,70 (m, 19H), 4,90 (d, J=15Hz, 2H), 3,40 (m, 2H), 1,30 (m, 10H), 0,90 (t, 3H)
IVf (aus IIf)	Br Br	88,3	'H-NMR (200 MHz, d ⁶ -DMSO): 7,80-6,70 (m, 28H), 5,00 (d, J=15Hz, 2H), 4,70 (s, 2H)





Bsp.	Formel	Ausber	u-Spektroskopische Daten
		te (%)	<u>.</u>
IVg (aus IIg)	Br CH ₃	69,1	¹ H-NMR (200 MHz, d ⁶ DMSO): 7,80-6,70 (m, 19H) 4,90 (d, J=15Hz, 2H), 3,40 (m 2H), 1,30 (bs, 28H), 0,90 (t 3H)
IVh (aus IIh)	H ₃ C	95,2	¹ H-NMR (200 MHz, d ⁶ DMSO): 7,90-6,70 (m, 19H) 4,90 (d, J=15Hz, 2H), 3,40 (m 2H), 1,30 (m, 12H), 0,90 (t, 3H)
IVi (aus IIi)	H ₃ C	97,6	TH-NMR (200 MHz, d ⁶ -DMSO): 7,90-6,70 (m, 19H), 4,90 (d, J=15Hz, 2H), 3,40 (m, 2H), 1,30 (m, 8H), 0,90 (t, 3H)
IVj (aus 2- Methoxy- benzyl- alkohol)		87,2	¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): 7,80-7,20 (m, 17H), 6,80 (d, 1H), 6,60 (s, 1H), 5,20 (d, J=15Hz, 2H), 3,20 (s, 3H)
IVk (aus 2- Allyloxy- benzyl- alkohol)			¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): 7,80-7,20 (m, 17H), 6,80 (t, 1H), 6,60 (d, 1H), 5,60 (m, 1H), 5,20 (d, J=15Hz, 2H), 5,10 (m, 2H), 3,90 (m, 2H)






Bsp.	Formel	Auchei	ı-Spektroskopische Daten
Dop.			1-Spekitoskopische Daten
		te (%)	
IVI	CH ₃	77,6	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃)
(aus 2,5-			7,80-7,50 (m, 15H), 7,00 (m
Dimeth-	H ₃ C		1H), 6,80 (m, 1H), 6,50 (d, 1H)
оху-	P [→] Br [−]		5,20 (d, J=15Hz, 2H), 3,60 (s,
benzyl-			3H), 3,10 (s, 3H)
alkohol)			
IVm	Br ⁻	roh	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 2,3-			7,90-7,50 (m, 15H), 7,00 (m,
Dimeth-	P CH ₃		1H), 6,85 (t, 1H), 6,40 (m, 1H),
oxy-	О_CH3		5,00 (d, J=15Hz, 2H), 3,70 (s,
benzyl-			3H), 3,40 (s, 3H)
alkohol)			
IVn	Br ⁻	99,8	¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 2-			7,80-7,00 (m, 20H), 6,90 (t,
Phenoxy-			1H), 6,50 (t, 3H), 5,00 (d,
benzyl-			J=15Hz, 2H)
alkohol)			5-13112, 211)
aikolioi)			·
IVo		98,7	¹ H-NMR (200 MHz, d ⁶ -
(aus 2-(5-			DMSO): 7,80-6,70 (m, 24H),
Phenyl-			5,60 (d, J=15Hz, 2H), 2,60 (m,
	s Br		
pentylsul-			4H), 1,60-1,30 (m, 6H)
fanylben-			
zylalko-			
hol)			
LL			

Bsp.	Formel	Ausbeu	-Spektroskopische Daten
•		te (%)	Spondoskopisene Buten
IVp (aus 2-Benzyl-sulfanyl-benzyl-alkohol)	Br -	90,9	¹ H-NMR (200 MHz, d ⁶ -DMSO): 8,00-7,00 (m, 24H), 5,00 (d, J=15Hz, 2H), 3,90 (s, 2H)
IVq (aus 2- Benzyl- amino- benzyl- alkohol)			¹ H-NMR (200 MHz, d ⁶ -DMSO): 7,80-6,30 (m, 24H), 6,05 (m, 1H), 5,00 (d, J=15Hz, 2H), 3,90 (d, 2H)

V: Methyl 4-{[2-oxodihydro-3(2H)-furanyliden]methyl}benzoat



10

Ein Gemisch aus 40,00 g (0,12 mol) 3-(Triphenylphosphoranyliden)dihydro-2(3H)-furanon und 20,85 g (0,13 mol) Methyl-4-formylbenzoat wird in 240 ml Dimethylsulfoxid 18 Stunden bei 80 °C gerührt. Nach dem Abkühlen wird mit 400 ml Chloroform versetzt und fünfmal mit 200 ml Wasser extrahiert. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet und das Solvens unter vermindertem Druck abdestilliert. Der Rückstand wird mit Diethylether verrührt und im Vakuum bei 40°C getrocknet.

Ausbeute: 17,82 g (66,4% der Theorie)

¹H-NMR (300 MHz, d⁶-DMSO): δ = 3,30 (m, 2H), 3,990 (s, 3H),4,45 (t, 2H), 7,25 (d, 2H), 8,03 (d, 2H).

5 VI: Methyl 4-[(2-oxotetrahydro-3-furanyl)methyl]benzoat

10

15

20


25

20,00 g (0,09 mol) Methyl 4-{[2-oxodihydro-3(2H)-furanyliden]methyl}benzoat aus Bsp. V werden in 240 ml Eisessig suspendiert mit 2,00 g 10% Palladium-Kohle versetzt und 4 Stunden lang bei Normaldruck hydriert. Das Reaktionsgemisch wird über Kieselgur filtriert und das Lösungsmittel unter vermindertem Druck abdestilliert.

Ausbeute: 19,00 g (92,4 % der Theorie)

¹H-NMR (300 MHz, d⁶-DMSO): δ = 1,9 (m, 1H) 2,15 (m, 1H), 2,8 (m, 1H), 3,0 (m, 1H), 3,1 (m, 1H), 3,85 (s, 3H), 4,1 (m, 1 H), 4,2 (m, 1H), 7,25 (d, 2H), 8,03 (d, 2H).

VII: 4-Bromo-2-[4-(methoxycarbonyl)benzyl]butansäure



9,00 g (38,42 mmol) Methyl 4-[(2-oxotetrahydro-3-furanyl)methyl]benzoat aus Bsp. VI werden in 54 ml einer 33-prozentigen HBr-Lösung in Eisessig suspendiert und 40 min bei 80 °C gerührt. Die Reaktionslösung wird auf Eiswasser gegossen, der entstandene Niederschlag abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Vakuum bei 40 °C getrocknet.

Ausbeute: 11,01 g (90,9 % der Theorie).

¹H-NMR (300 MHz, d⁶-DMSO): δ = 1,90 (m, 1H), 2,10 (m, 1H), 2,70 (m, 1H), 2,90 (m, 2H), 3,53 (m, 2H), 3,83 (s, 3H), 7,35 (d, 2H), 7,92 (d, 2H).

VIII: Methyl 4-(4-bromo-2-formylbutyl)benzoat

10,7 g (33,95 mmol) 4-Bromo-2-[4-(methoxycarbonyl)benzyl]butansäure aus Bsp. VII in 200 ml THF werden bei 0°C mit 40,74 ml (40,74 mmol) einer 1M Lösung von Boran in THF versetzt und unter Erwärmen auf Raumtemperatur 2 Stunden gerührt. Überschüssiges Boran wird durch Zugabe von Wasser zerstört. Nach Extraktion mit Ether wird die organische Phase über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel unter vermindertem Druck abdestilliert. Es verbleiben 10,23 g (33,92 mmol) des sehr instabilen Methyl 4-[4-bromo-2-(hydroxymethyl)butyl]benzoat, die unmittelbar in 100 ml Methylenchlorid gelöst und zu einer Suspension von 10,98 g (50,92 mmol) Pyridiniumchlorochromat in 200 ml Methylenchlorid getropft werden. Nach 3,5 Stunden wird die Lösung über Kieselgel filtriert, gut mit Ether nachgewaschen und das Lösungsmittel abdestilliert. Das Rohprodukt wird durch Blitzchro-

Ausbeute: 7,08 g (69,7 % der Theorie)

Laufmittel gereinigt.

¹H-NMR (300 MHz, d⁶-DMSO): δ = 1,85 (m, 1H), 2,15 (m, 1H), 2,85 (m, 2H), 3,10 (m, 1H), 3,53 (m, 2H), 3,85 (s, 3H)7,38 (d, 2H), 7,90 (d, 2H), 9,70 (s, 1H).

matographie an Kieselgel (0,04-0,063 nm) mit Methylenchlorid/Methanol 3/1 als

25

20

5

10

IX: Methyl-4-((E/Z)-2-(2-bromoethyl)-4-{2-[(5-phenylpentyl)oxy]phenyl}-3-butenyl)benzoat

5

10

5,97 g (10,03 mmol) Triphenyl{2-[(5-phenylpentyl)oxy]benzyl}phosphoniumbromid (herstellbar analog Bsp. IId bis IVd mit 5-Phenylpentylbromid statt Butylbromid) werden in 80 ml THF suspendiert und bei 0°C mit 7,52 ml einer 1,6M n-Butyllithiumlösung in n-Hexan versetzt. Man rührt 30 Minuten und kühlt dann auf -20°C, woraufhin 3,00 g (10,03 mmol) Methyl 4-(4-bromo-2-formylbutyl)benzoat aus Bsp. VIII, gelöst in 20 ml THF, zugesetzt werden. Nach weiteren 30 min bei -20°C versetzt man mit Wasser und extrahiert mit Ethylacetat. Die organische Phase wird mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und das Solvens unter vermindertem Druck abdestilliert. Das Rohprodukt wird durch Blitzchromatographie an Kieselgel (0,04-0,063 nm) mit Cyclohexan/ Methylenchlorid 1/1 als Laufmittel gereinigt.

15

Ausbeute: 2,53 g (46,5% der Theorie) des E/Z Isomerengemisches im Verhältnis 15:85

20


¹H-NMR (300 MHz, d⁶-DMSO): δ = 1,40 (m, 1H), 1,65 (m, 4H9, 1,95 (m, 2H), 2,55 (t, 2H), 2,85 (m, 2H), 3,45 (m, 2H), 3,80 (s, 3H), 3,90 (t, 2H), 6,00 (m, 1H), 6,45 (m, 1H), 6,90 (m, 2H), 7,1-7,4 (m, 10H), 7,85 (d, 2H).

X: $Methyl-4-((E/Z)-2-(2-iodoethyl)-4-\{2-[(5-phenylpentyl)oxy]phenyl\}-3-bute-nyl)benzoat$

500.0 mg (0.930 mmol) Methyl4-((E/Z)-2-(2-bromoethyl)-4-{2-[(5-phenylpentyl)-oxy]phenyl}-3-butenyl)benzoat aus Bsp. IX und 153.95 mg (1.03 mmol) Natriumiodid werden in 2 ml Aceton 18 Stunden unter Rückfluss erhitzt. Man filtriert vom Feststoff ab, versetzt das Filtrat mit Wasser und extrahiert mit Methylenchlorid. Die Organische Phase wird mit gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmitel im Vakuum abdestilliert.

Ausbeute: 550,3 mg (97% der Theorie)

XI: $Methyl-4-\{4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)(methyl)amino]-2-formylbutyl\}benzoat$



0,500 g (1,67 mmol) Methyl-4-(4-bromo-2-formylbutyl)benzoat aus Bsp. VIII, 0,257 g (1,67 mmol) Sarcosinethylesterhydrochlorid und 0,309 g (3,68 mmol) Natriumhydrogencarbonat werden in 10 ml Acetonitril 1 Stunde unter Rückfluss erhitzt. Die Reaktionsmischung wird abgekühlt, mit 50 ml Wasser versetzt und mit Ethylacetat



20

5

10

mehrfach extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert. Das Rohprodukt wird durch Chromatographie an Kieselgel (0,04-0,063 nm) mit Methylenchlorid/Methanol 100:3 als Laufmittel gereinigt.

Ausbeute: 0,479 g (85,4 % der Theorie)

XII: 8-(2-Hydroxyphenyl)-6-(4-Methoxycarbonylphenoxy)-octansäuremethylester

XIIa: 2-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}benzaldehyd

Zu einer Lösung von 10.00 g (81.89 mmol) Salicylaldehyd und 6.13 g (90.07 mmol) Imidazol in 82 ml DMF wurden 13.58 g (90.07 mmol) t-Butyldimethylsilylchlorid (TBDMSCl) zugegeben. Man rührte bei Raumtemperatur und kontrollierte die Reaktion per Dünnschichtchromatographie (Cyclohexan/EE 10:1). Die Mischung wurde mit 1 N NaOH versetzt und mit Petrolether extrahiert. Die vereinten organischen Phasen wurden über Na₂SO₄ getrocknet, das Lösungsmittel entfernt und das Produkt chromatografisch gereinigt (Kieselgel, Cyclohexan/EE 10:1). Man erhielt 16.94 g (87.5 %) einer klaren Flüssigkeit.

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): $\delta = 0.18$ (s, 6H), 0.92 (s, 9H), 6.78 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 6.93 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.36 (dt, J = 8.1 Hz, J = 1.9 Hz, 1H), 7.71 (dd, J = 9.3 Hz, J = 1.5 Hz, 1H), 10.37 (s, 1H).

20

10

15

20

XIIb: 7-(Diethoxyphosphoryl)-6-oxoheptansäuremethylester

Zu einer Lösung von 15.00 g (74.95 mmol) Phosphonoessigsäurediethylester in 400 ml Toluol wurden bei 0 °C 30.34 g (299.79 mmol) Triethylamin sowie 12.21 g (112.42 mmol) Trimethylchlorsilan zugetropft. Man rührte 1 h bei Raumtemperatur und fügte 7.14 g (74.95 mmol) Magnesiumchlorid zu. Man rührte eine Stunde und tropfte 16.56 g (89.94 mmol) Adipinsäuremonomethylesterchlorid zu. Die Mischung wurde 24 h bei Raumtemperatur gerührt. Es wurde mit Wasser versetzt. Man extrahierte mit Diethylether, trocknete die organischen Phasen über Na₂SO₄ und entfernte das Lösungsmittel. Das Produkt wurde chromatografisch gereinigt (Kieselgel, Ethylacetat). Man erhielt 7.83 g (35.5 %) einer klaren Flüssigkeit.

¹H NMR (300 MHz, CDCl₃): $\delta = 1.34$ (t, J = 6.9 Hz, 6H), 1.59 - 1.66 (m, 4H), 2.25 - 2.40 (m, 2H), 2.59 - 2.70 (m, 2H), 3.07 (d, J = 22.9 Hz, 2H), 3.66 (s, 3H), 4.14 (quint, J = 7.2 Hz, 4H).

 $XIIc: (E)-8-(2-\{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy\} phenyl)-6-oxo-7-octens\"{a}ure methylester$

Zu einer Lösung von 3.20 g (10.87 mmol) 7-(Diethoxyphosphoryl)-6-oxoheptansäuremethylester aus Bsp. XIIb in 53 ml THF wurden unter Argon 0.26 g (10.87 mmol) Natriumhydrid zugegeben. Man rührte 30 min bei Raumtemperatur und tropfte eine

10

15

20

Lösung von 9.06 mmol 2-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}benzaldehyd aus Bsp. XIIa in 20 ml THF zu und rührte 18 h bei Raumtemperatur. Man versetzte mit Wasser, extrahierte mit Ethylacetat, trocknete die vereinten organischen Phasen über Na₂SO₄ und entfernte das Lösungsmittel. Das Produkt wurde chromatografisch gereinigt (Kieselgel, Cyclohexan/EE 10:1). Man erhielt 2.51 g (67.8 %) einer farblosen Flüssigkeit.

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): δ = 0.24 (s, 6H), 1.05 (s, 9H), 1.62 – 1.77 (m, 4H), 2.29 – 2.41 (m, 2H), 2.62 – 2.73 (m, 2H), 3.66 (s, 3H), 6.67 (d, J = 16.6 Hz, 1H), 6.84 (m_c = 1H), 6.96 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 7.20 – 7.30 (m, 1H), 7.56 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 7.96 (d, J = 16.6 Hz, 1H).

XIId: (E)-8-(2-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}phenyl)-6-hydroxy-7-octen-säuremethylester

Zu einer Lösung von 1.436 g (3.86 mmol) CeCl₃·7H₂O und 3.67 mmol (E)-8-(2-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}phenyl)-6-oxo-7-octensäuremethylester aus Bsp. XI-Ic in 30 ml Methanol wurden bei 0 °C 0.146 g (3.86 mmol) Natriumborhydrid zugegeben. Man rührte die Mischung bei 0 °C und kontrollierte den Reaktionsverlauf per Dünnschichtchromatografie. Man versetzte mit gesättigter NH₄Cl-Lösung, extrahierte mit Ethylacetat und trocknete die vereinten organischen Phasen über Na₂SO₄. Das Produkt wurde chromatografisch gereinigt (Kieselgel, Cyclohexan/EE 10:2). Man erhielt 1.38 g (91.5 %) einer farblosen Flüssigkeit.

¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): $\delta = 0.01$ (s, 6H), 0.80 (s, 9H), 1.13 – 1.54 (m, 7H), 2.11 (t J = 7.3 Hz, 2H), 3.44 (s, 3H), 3.99 – 4.11 (m, 1H), 5.93 (dd, J = 15.9 Hz, J = 6.9

Hz, 1H), 6.57 (dd, J = 8.0 Hz, J = 1.0 Hz, 1H), 6.63 – 6.73 (m, 2H), 6.90 (dt, J = 8.0 Hz, J = 1.7 Hz, 1H), 7.23 (dd, J = 7.8 Hz, J = 1.7 Hz, 1H).

XIIe: 8-(2-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}phenyl)-6-hydroxyoctansäuremethylester

5

10

Zu einer Lösung von 4.38 mmol der Verbindung aus Bsp. XIId in 22.5 ml Ethylacetat wurden 30 mg Palladium auf Kohle (10 %) zugegeben. Man rührte unter einer Wasserstoffatmosphäre bis keine weitere Absorption zu beobachten war, filtrierte über Celite und entfernte das Lösungsmittel.

Ausbeute: 82,2%


¹H NMR (300 MHz, CDCl₃): δ = 0.25 (s, 3H), 0.26 (s, 3H), 1.03 (s, 9H), 1.20 – 1.84 (m, 9H), 2.26 – 2.38 (m, 2H), 2.66 – 2.78 (m, 2H), 3.49 – 3.62 (m, 1H), 3.67 (s, 3H), 6.75 – 6.84 (m, 1H), 6.85 – 6.94 (m, 1H), 7.02 – 7.19 (m, 2H).

15

20



XIIf: 8-(2-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}phenyl)-6-(4-Methoxycarbonylphenoxy)-octansäuremethylester



Zu einer Lösung von 55.32 mg (0.36 mmol) 4-Hydroxybenzeosäuremethylester und 95.36 mg (0.36 mmol) Triphenylphosphin in 2.5 ml THF tropfte man innerhalb von 2 h eine Lösung von 0.24 mmol der Verbindung aus Bsp. XIIe und 63.32 mg (0.36 mmol) DEAD in 2.5 ml THF zu. Man rührte 18 h bei Raumtemperatur, versetzte mit 40 ml Diethylether, filtrierte und entfernte das Lösungsmittel. Das Produkt wurde chromatografisch gereinigt (Kieselgel, Cyclohexan/EE 10:1).

Ausbeute: 64,3%

¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): $\delta = 0.20$ (s, 3H), 0.21 (s, 3H), 0.98 (s, 9H), 1.31 – 1.77 (m, 6H), 1.84 – 2.07 (m, 2H), 2.28 (t, J = 7.3 Hz, 2H), 2.54 – 2.68 (m, 1H), 2.70 – 2.81 (m, 1H), 3.64 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 4.25 – 4.38 (m, 1H), 6.74 – 6.88 (m, 4H), 7.01 – 7.10 (m, 2H), 7.93 (d, J = 8.8 Hz, 2H).

XII: 8-(2-Hydroxyphenyl)-6-(4-Methoxycarbonylphenoxy)-octansäuremethylester

15

20

5

10

ml (2.78 mmol) Tetrabutylammoniumfluorid (TBAF) (1 M In THF) versetzt. Man rührte bei Raumtemperatur und verfolgte den Reaktionsverlauf per DC (Kieselgel, Cyclohexan/EE 10:1, KMnO₄). Nach beendeter Reaktion versetzte man mit Wasser, extrahierte mit Diethylether, trocknete die vereinten organischen Phasen über Na₂SO₄ und entfernte das Lösungsmittel. Das Produkt wurde chromatografisch gereinigt und man erhielt 0.85 g (84.24 %) einer klaren Flüssigkeit.

Eine Lösung von 1.30 g (2.53 mmol) der Verbindung aus Bsp. XIIf wurde mit 2.78

¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): δ = 1.32 – 1.78 (m, 6H), 1.90 – 2.04 (m, 2H), 2.30 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 2.60 – 2.72 (m, 1H), 2.72 – 2.83 (m, 1H), 3.65 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 4.33 (quint, J = 5.9 Hz, 1H), 5.31 (bs, 1H), 6.71 – 6.88 (m, 4H), 7.01 - 7.14 (m, 2H), 7.93 (d, J = 9.0 Hz, 2H).

Synthesebeispiele

Bsp. 1: 6-(4-Methoxycarbonylbenzyl)-8-(2-Methoxyphenyl)-7-octensäuremethylester

werden bei 0°C unter Argon in 20 ml THF suspendiert und mit 0,115 ml Buthyllithium (0,18 mmol, 1,6 M Lösung in Hexan) versetzt. Die tieforange Lösung wird 30 min. bei 0°C gerührt. Eine Lösung von 51,2 mg (0,17 mmol) 6-Formyl-7-(4-methoxycarbonylphenyl)heptansäuremethylester (Synthese analog zu EP-A-0 341 551, S. 32, Bsp. 44) in 15 ml THF wird bei dieser Temperatur tropfenweise hinzugegeben. Die Mischung wird 30 min. bei 0°C gerührt. Es wird bei 0°C mit Wasser versetzt, auf Raumtemperatur erwärmt und mit Essigsäureethylester extrahiert. Die organische Phase wird mit Natriumchloridlösung gewaschen, mit Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingedampft. Die Substanz wird zur Reinigung an Kie-

77,4 mg (0,17 mmol) 2-Methoxybenzyltriphenylphosphoniumbromid aus Bsp. IVj

20 Ausbeute: 17,7 mg (25,8% d.Th.)

Eluenten chromatographiert.

10

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): 7,95 (m, 2H), 7,40-6,70 (m, 6H), 6,50 (d, J=16 Hz, 1H), 6,00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 3,90 (s, 3H), 3,80 (s, 3H), 3,60 (s, 3H), 2,80-2,50 (m, 3H), 2,30 (m, 2H), 1,80-1,20 (m, 6H)

selgel 60 (Korngröße 0,040-0,063 mm) mit Cyclohexan/Essigester 9:1 bis 1:1 als

Analog wurden dargestellt:

Bsp.	Formel	TA	G 14 1 1 1 D 4
Dsp.	rottnei		Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
2		10,6	70% (E), 30% (Z)
(aus 3-	F ₃ C OMe		H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
Trifluor-			7,95 (m, 2H), 7,55-7,00 (m,
benzylal-	OMe		6H), 6,45 (d, 0,3H, J=9 Hz),
kohol)	ļ		6,20 (d, 0,7H, J=16 Hz), 6,05
			(dd, 0,7H, J=16 Hz, J=8Hz),
			5,50 (t, 0,3H, J=9Hz), 3,90
			(s, 3H), 3,60 (s, 3H), 2,75
İ			(m, 2H), 2,50 (m, 1H), 2,30
			(m, 2H), 1,70-1,10 (m, 6H)
3	9	21,7	70% (E), 30% (Z)
(aus	OMe	1	H-NMR (300 MHz, CDCl ₃):
2-Phenyl-		ł	7,95 (m, 2H), 7,55-7,00 (m,
benzylal-	OMe	-	11H), 6,25 (d, 0,3H, J=9
kohol)	H	þ	Hz), 6,10 (d, 0,7H, J=16 Hz),
		4	5,80 (dd, 0,7H, J=16 Hz,
	·	þ	(=8Hz), 5,30 (t, 0,3H,
		þ	=9Hz), 3,90 (s, 3H), 3,60 (s,
		3	3H), 2,90-2,60 (m, 2H), 2,40
		(m, 1H), 2,30 (m, 2H), 1,70-
		1	,20 (m, 6H)

Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
1		beute	1 -
4		(%)	660/ (E) 240/ (Z)
			66% (E), 34% (Z)
(aus 2-	OMe		H-NMR (300 MHz, CDCl ₃):
Trifluor-	ĊF ₃	19,2	7,95 (m, 2H), 7,55-7,10 (m,
benzylal-	OMe		6H), 6,65 (m, 1H), 5,90 (dd,
kohol)			0,7H, J=16 Hz, J=8Hz), 5,50
			(t, 0,3H, J=9 Hz), 3,90 (m,
			3H), 3,60 (m, 3H), 2,75-2,50
			(m, 3H), 2,30 (m, 2H), 1,70-
			1,00 (m, 6H)
			70% (E), 30% (Z)
5			H-NMR (400MHz, CDCl ₃):
(aus IVI)	ОМе		7,90-6,70 (m, 7H), 6,50 (d,
			J=16 Hz, 0,7H), 6,40 (d,
		25,6	J=9Hz, 0,3H), 6,10 (dd, J=16
	ÓMe OMe	1 1	Hz, J=8Hz, 0,7H), 5,40 (t,
			J=9 Hz, 0,3H), 3,90 (m, 3H),
			3,70 (m, 6H), 3,60 (m, 3H),
	Оме		2,75-2,50 (m,3H), 2,30 (m,
			2H), 1,70-1,10 (m, 6H)
			70% (E), 30% (Z)
6			H-NMR (400MHz, CDCl ₃):
	MeO OMe		7,80-6,70 (m, 7H), 6,50 (m,
(aus IVm)	OMe Same	- 1	(H), 5,95 (dd, J=16 Hz,
			=8Hz, 0,7H), 5,40 (t, J=9
	ÓМе		Hz, 0,3H), 3,90 (s, 3H), 3,80
			s, 3H), 3,60 (m, 6H), 2,75-
		2	2,50 (m,3H), 2,30 (t, 2H),
		1	,70-1,10 (m, 6H)
·			

Bsp.	Formel		Spektroskopische Daten
		beute (%)	
			90% (E), 10% (Z)
			H-NMR (300MHz, CDCl ₃):
7			7,95 (m, 2H), 7,30-6,70 (m,
(aus Ive	o o		6H), 6,55 (d, J=16 Hz, 0,9
mit NaH	OEt	31,6	H), 6,47 (d, J=9Hz, 0,1 H),
als Base)			6,00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz,
	OEt		0,9H), 5,40 (t, J=9 Hz,
			0,1H), 4,85 (q, J=6 Hz, 2H),
			4,10 (q, J=6 Hz, 2H), 3,90
	CH₃		(m, 2H), 2,75 (m, 2H), 2,55
	·	·	(m,1H), 2,30 (m, 2H), 1,80-
			1,20 (m, 22H), 0,90 (m, 3H)
			959/ (E) 159/ (Z)
	_		85% (E), 15% (Z)
			H-NMR (300 MHz, CDCl ₃):
8	OEt		7,95 (m, 2H), 7,70-6,90 (m,
(aus IVf			15H), 6,60 (d, J=16 Hz,
mit NaH			0,8H), 6,55 (d, J=9Hz,
als Base)	ö		0,2H), 6,00 (dd, J=16 Hz,
als Dase)		ľ	J=8Hz, 0,8H), 5,40 (t, J=9
		- 1	Hz, 0,2H), 5,10 (s, 1,6H),
			5,00 (m, 0,4H), 4,80 (q, J=6
			Hz, 2H), 4,10 (q, J=6 Hz, 2H), 2,80 (m, 2H), 2,55
		ŀ	m,1H), 2,30 (m, 2H), 1,70-
			,25 (m, 12H)



Bsp.	Formel	A119-	Spektroskopische Daten
BSp.		beute	1 "
		(%)	
			85% (E), 15% (Z)
			H-NMR (300 MHz, CDCl ₃)
			7,95 (m, 2H), 7,40-7,10 (m
9			11H), 6,70 (d, J=16 Hz
(aus IVo)	COOEt	5,3	0,8H), 6,50 (d, J=9Hz
			0,2H), 5,85 (dd, J=16 Hz
	COOEt		J=8Hz, 0,8H), 5,30 (t, J=9
	Š		Hz, $0.2H$), 4.35 (q, $J = 6$ Hz,
			2H), 4,10 (q, J = 6 Hz, 2H),
			2,90-2,50 (m, 7H), 2,30 (t,
			2H), 1,70-1,25 (m, 18H)
			70% (E), 30% (Z)
			H-NMR (300 MHz, CDCl ₃):
		ľ	7,95 (m, 2H), 7,40-7,00 (m,
			11H), 6,70 (d, J=16 Hz,
10	COOEt	. (0,7H), 6,50 (d, J=9Hz,
(aus IV p)	Ś	19,0	0,3H), 5,90 (dd, J=16 Hz,
	COOEt	þ	J=8Hz, 0,7H), 5,45 (t, J=9
		Œ	Hz, $0.3H$), 4.35 (q, $J = 6$ Hz,
		þ	2 H), 4,10 (q, J = 6 Hz, 2H),
		4	1,00 (s, 0,6H), 3,80 (m,
		1	,4H), 2,90-2,50 (m, 3H),
		2	2,30 (m, 2H), 1,70-1,25 (m,
		1	2H)

Bsp.	Formel	Ave	Spolstrookspieghe Detar
بردس	i offici	beute	Spektroskopische Daten
		(%)	
		(,0)	70% (E), 30% (Z)
			H-NMR (300 MHz, CDCl ₃)
			7,90 (m, 2H), 7,30- 6,70 (m,
			6H), 6,55 (d, J=16 Hz,
11			0,7H), 6,40 (d, J=9Hz,
(aus IV h)	OEt	43,6	0,3H), 6,00 (dd, J=16 Hz,
			J=8Hz, 0,7H), 5,35 (t, J=9
			Hz, 0,3 H), 4,35 (q , $J = 6$ Hz ,
	OEt		2H), $4,10$ (q, $J = 6$ Hz, $2H$),
	сн₃		3,90 (m, 2H), 2,75 (m, 2H),
			2,55 (m,1H), 2,30 (m, 2H),
			1,80-1,20 (m, 24H), 0,90 (m,
		ļ	3H)
12		19,0	MS: 514 (M+H) ⁺
(aus IV q)	COOEt		
	NH \		
	COOEt		



Bsp.	Formel	A119-	Spektroskopische Daten
DSp.		beute	
		ľ	
13 (aus IV i)	CH ₃ OEt	66,2	70% (E), 30% (Z) H-NMR (300 MHz, CDCl ₃) 7,90 (m, 2H), 7,30- 6,70 (m 6H), 6,50 (d, J=16 Hz, 0,7H), 6,45 (d, J=9Hz, 0,3H), 6,00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 0,7H), 5,40 (t, J=9Hz, 0,3H), 4,35 (q, J = 6 Hz, 2H), 4,10 (q, J = 6 Hz, 2H), 3,95 (m, 2H), 2,80 (m, 2H), 2,55 (m,1H), 2,25 (m, 2H),
14 (aus 4- Butoxy- benzyl- alkohol)	H ₃ C·O	34,9	1,80-1,20 (m, 20H), 0,90 (m, 3H) H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): 7,90 (m, 2H), 7,30- 6,70 (m, 5H), 6,10 (d, J=16 Hz, 1H), 5,80 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 3,90 (m, 5H), 3,60 (s, 3H), 2,75-2,50 (m, 3H), 2,30 m, 2H), 1,80-1,20 (m, 10H), 1,90 (t, J=6 Hz, 3H)



Bsp.	Formel	IA	Caralata da la Caralata de Car
DSp.	r Office		Spektroskopische Daten
		beute	
15		(%)	
13			MS: 543 (M+H) ⁺
(aus N			
((2-Hy-	HN_O		
droxy-	HN		
methyl)-		15,2	
phenyl)-	H ₃ C O		
N'-		.	
phenyl-	0,0		
harnstoff)	H₃C´		
			50% (E), 50% (Z)
		1	H-NMR (400 MHz, CDCl ₃):
			7,90 (m, 4H), 7,40-6,60 (m,
16	5	8	3H), 6,40 (m, 1H), 6,00 (d,
(aus IV a)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	þ	=12 Hz, 0,5H), 5,40 (t,
	o / n	þ	=10Hz, 0,5 Hz), 4,30 (m,
		4	H), 4,10 (q, J=6 Hz, 2H),
	EtO	2	2,70 (m, 5H), 2,20 (m, 2H),
	Ö	20,1 2	,10-1,20 (m, 18H)
	EtO O		·






Ren	Formal	-	la
Bsp.	Formel	f.	Spektroskopische Daten
		beute (%)	
17 (aus		(70)	60% (E), 40% (Z)
,			
IV b)			H-NMR (400 MHz, CDCl ₃)
			8,00-7,70 (m, 3H), 7,40-6,70
1	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		(m, 9H), 6,40 (m, 1H), 6,05
	CH ₃		
			(dd, J=16 Hz, J=8Hz, 0,6H),
			5,30 (m, 2,4H), 4,30 (m,
	\		2H), 4,10 (q, J=6 Hz, 2H),
	ĊH₃		
		i i	2,80-2,50 (m, 3H), 2,20 (m,
			2H), 1,60-1,20 (m, 12H)
18 (aus	<u>й</u> 0	9,0	572 (M+H)
IV c)			
) OE		
		.	
	∂Et		



19: 6-(4-Carboxybenzyl)-8-(2-methoxyphenyl)oct-7-ensäure



5 16,0 mg (0,04 mmol) des Diesters aus Beispiel 1 werden in 1 Methanol gelöst und bei 0°C mit 0,5 ml 45%iger Natronlauge versetzt. Bei Raumtemperatur werden 0,2

ml Dichlormethan hinzugegeben. Die Lösung wird 16 Stunden bei Raumtemperatur gerührt, mit etwas Wasser versetzt und mit Ethylether extrahiert. Die wässrige Phase wird mit 10%iger Schwefelsäure auf pH 2-3 gestellt und zweimal mit Essigsäureethylester extrahiert, mit Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingedampft.

Ausbeute: 7,0 mg (47,0 % d.Th.) als eine Mischung: 70,0% Trans / 30,0% Cis.

¹H-NMR (400 MHz, CD₃COCD₃): 7,95 (m, 2H), 7,80-7,10 (m, 6H), 6,60 (d, J=16 Hz, 0,3H), 6,40 (d, J=9Hz, 0,7H), 6,25 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 0,7H), 5,50 (t, J=9 Hz, 0,3H), 3,10-2,50 (m, 3H), 2,30 (m,5H), 1,80-1,20 (m, 6H).

Analog wurden dargestellt:

Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
20		42.4	70% (E), 30% (Z)
(aus 2)	9		¹ H-NMR (200MHz, CDCl ₃):
	F ₃ C OH		7.95 (m, 2H), 7.55-7.00 (m,
			6H), 6.45 (d, J=9 Hz, 0.3H),
	ОН .		6.30 (d, J=16 Hz, 0.7H), 6.05
	l l		(dd, J=16 Hz, J=8Hz, 0.7H),
			5.50 (t, J=9Hz, 0.3H), 2.75
			(m, 2H), 2.50 (m, 1H), 2.30
			(m, 2H), 1.70-1.10 (m, 6H)





Don	Formal	14	0 1. 1
Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
21		52,0	70% (E), 30% (Z)
(aus 3)			¹ H-NMR (400 MHz,
			CDCOCD ₃): 7.95 (m, 2H),
			7.55-7.00 (m, 11H), 6.20 (d,
	OH		J=9 Hz, 0.3H), 6.00 (d, J=16
			Hz, 0.7H), 5.95 (dd, J=16 Hz,
	[] OH		J=8Hz, 0.7H), 5.40 (t, J=9Hz,
			0.3H), 2.90-2.60 (m, 2H), 2.40
	O		(m, 1H), 2.30 (m, 2H), 1.70-
			1.20 (m, 6H)
22		53,3	70% (E), 30% (Z)
(aus 4)		1	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
	9	7	7.95 (m, 2H), 7.55-7.10 (m,
	OH I	ϵ	5H), 6.65 (m, 1H), 5.90 (dd,
	CF ₃	J	=16 Hz, J=8Hz, 0.7H), 5.55
	OH	(t, J=9 Hz, 0.3H), 2.75-2.50
		(i	m, 3H), 2.30 (m, 2H), 1.70-
ļ	0	1	.10 (m, 6H)
ł			
		1	



Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	_
		(%)	
23		53,4	90% (E), 10% (Z)
(aus 5)			H-NMR (400 MHz, CDCl ₃)
			7.90-6.70 (m, 7H), 6.50 (d
			J=16 Hz, 0.7H), 6.40 (d
			J=9Hz, 0.3H), 6.10 (dd, J=16
		•	Hz, J=8Hz, 0.7H), 5.40 (t, J=9
			Hz, 0.3H), 3.70 (m, 6H), 2.75-
			2.50 (m,3H), 2.30 (m, 2H),
	!		1.70-1.10 (m, 6H)
24		91,2	H-NMR (400 MHz, CDCl ₃):
(aus 6)	-		10.60 (bs, 2H), 7.80-6.70 (m,
			7H), 6.40 (d, J=16 Hz, 1H),
	H ₃ C O OH		5.90 (dd, J=16 Hz, J=8Hz,
	H ₃ C O		H), 3.70 (s, 3H), 3.40 (s, 3H),
			2.75-2.50 (m,3H), 2.30 (t,
	о н		2H), 1.70-1.10 (m, 6H)



Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
25			0004 (75) 1004 (77)
25		roh	90% (E), 10% (Z)
(aus 7)			1 H-NMR (400 MHz, $CD_{2}Cl_{2}$):
			7.95 (m, 2H), 7.30 (m, 3H),
	ı ı		7.10 (m, 1H), 6.80 (m, 2H),
	ОН		6.55 (d, J=16 Hz, 0.9H), 6.47
			(d, J=9Hz, 0.1H), 6.00 (dd,
	ОН		J=16 Hz, J=8Hz, 0.9H), 5.40
			(t, J=9 Hz, 0.1H), 3.90 (m,
			2H), 2.75 (m, 2H), 2.55
	CH₃		(m,1H), 2.30 (m, 2H), 1.80-
			1.20 (m, 16H), 0.90 (t, J=6
			Hz, 3H)
26		62,6	85% (E), 15% (Z)
(aus 8)		[]	H-NMR (400 MHz, CD ₂ Cl ₂):
	9		7.95 (m, 2H), 7.70 (m, 4H),
	ОН	-	7.50-7.10 (m, 9H), 6.90 (m,
			2H), 6.60 (d, J=16 Hz, 0.8H),
	OH	6	5.55 (d, J=9Hz, 0.2H), 6.00
			dd, J=16 Hz, J=8Hz, 0.8H),
			5.45 (t, J=9 Hz, 0.2H), 5.10 (s,
		1	.6H), 5.00 (m, 0.4H), 2.80
			m, 2H), 2.55 (m,1H), 2.30
		(m, 2H), 1.70-1.25 (m, 6H)





Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	-
		(%)	
27		roh	85% (E), 15% (Z)
(aus 9)			H-NMR (400 MHz, CD ₃ CO-
			CD ₃): 7.95 (m, 2H), 7.40-7.10
	Соон		(m, 11H), 6.70 (d, J=16 Hz,
	s Y		0.8H), 6.50 (d, J=9Hz, 0.2H),
	Соон		6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz,
	~		0.8H), 5.50 (t, J=9 Hz, 0.2H),
			2.90-2.50 (m, 7H), 2.30 (t,
			2H), 1.70-1.25 (m, 12H)
28		68,6	70% (E), 30% (Z)
(aus			H-NMR (400 MHz, CD ₃ CO-
10)			CD ₃): 10.70 (bs, 2H), 7.95 (m,
	СООН	ł	2H), 7.40-7.00 (m, 11H), 6.70
	s \	ĺ	(d, J=16 Hz, 0.7H), 6.40 (d,
	СООН	ŀ	J=9Hz, 0.3H), 6.00 (dd, J=16
		þ	Hz, J=8Hz, 0.7H), 5.50 (t, J=9
		þ	Hz, 0.3H), 4.10 (s, 0.6H), 3.90
		((s, 1.4H), 3.00-2.50 (m, 3H),
		2	2.30 (m, 2H), 1.70-1.25 (m,
		e	5H)



Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
29		53,6	70% (E), 30% (Z)
(aus			H-NMR (400 MHz, CD ₂ Cl ₂):
11)			10.60 (bs, 2H), 7.90 (m, 2H),
			7.30- 6.70 (m, 6H), 6.55 (d,
	OH		J=16 Hz, 0.7H), 6.40 (d,
			J=9Hz, 0.3H), 6.10 (dd, J=16
			Hz, J=8Hz, 0.7H), 5.40 (t, J=9
	ОН		Hz, 0.3H), 3.90 (m, 2H), 2.75
	CH ₃	·	(m, 2H), 2.55 (m,1H), 2.30
			(m, 2H), 1.80-1.20 (m, 18H),
			0.90 (t, J=6 Hz, 3H)
30		57,7	H-NMR (400 MHz,
(aus		ŀ	CD_3COCD_3): 10.70 (bs, 2H),
12)		ŀ	7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m,
	соон		10H), 6.40 (m, 2H), 5.80 (dd,
	NH Y	ļ	J=16 Hz, J=8Hz, 0.7H), 4.30
	Соон		s, 0.6H), 3.00-2.50 (m, 3H),
			2.30 (m, 2H), 1.70-1.25 (m,
		e	SH)



Bsp.	Formel	Ana	Spoletrockeniache Deter
Бэр.	r or mer	1	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
31		49,0	70% (E), 30% (Z)
(aus			H-NMR (400 MHz, CD ₂ Cl ₂):
13)			10.60 (bs, 2H), 7.90 (m, 2H),
			7.30- 6.70 (m, 6H), 6.50 (d,
			J=16 Hz, 0.7H), 6.45 (d,
			J=9Hz, 0.3H), 6.10 (dd, J=16
	OH OH		Hz, J=8Hz, 0.7H), 5.40 (t, J=9
			Hz, 0.3H), 3.90 (m, 2H), 2.80
	CH ₃		(m, 2H), 2.55 (m,1H), 2.25
	OH OH		(m, 2H), 1.80-1.20 (m, 14H),
			0.90 (t, J=6 Hz, 3H)
32		70,6	70% (E), 30% (Z)
(aus			H-NMR (400 MHz,
14)			CD ₃ COCD ₃): 7.90 (m, 2H),
	H ₃ C O	-	7.30- 6.70 (m, 6H), 6.35 (d,
			J=9Hz, 0.3H), 6.15 (d, J=16
	ОН	 	Hz, 0.7H), 5.90 (dd, J=16 Hz,
		þ	(=8Hz, 0.7H), 5.30 (t, J=9 Hz,
	ОН		0.3H), 3.95 (m, 2H), 2.80 (m,
		! !	2H), 2.55 (m,1H), 2.25 (m,
			H), 1.80-1.20 (m, 10H), 0.90
			m, 3H)
L			






Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
33 (aus 15)	HN O HN O HO O	22,3	MS: 487 (M+H) ⁺
34		roh	50% (E), 50% (Z)
(aus		l 1	516.5 (M+H)
16)	OH OH		H-NMR (400 MHz, CD ₃ COCD ₃): 10.0 (bs, 2H), 3.20 (m, 2H), 7.95 (m, 2H), 7.40-7.10 (m, 8H), 6.40 (m, 4H), 6.30 (d, J=12 Hz, 0.5H), 5.70 (t, J=10Hz, 0.5H), 4.50 m, 2H), 2.90-2.50 (m, 5H), 2.30-1.20 (m, 14H)



D	ho.		
Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
35	·		60% (E), 40% (Z)
(aus			H-NMR (400 MHz
17)			CD ₃ COCD ₃): 10.7 (bs, 2H),
	o o		8.00-7.70 (m, 3H), 7.40-7.10
	N OH		(m, 8H), 6.70 (m, 1H), 6.40
l I			(m, 1H), 6.20 (dd, J=16 Hz,
			J=8Hz, 0.6H), 5.50 (t, J=9 Hz,
	О Н		0.4H), 5.35 (s, 1.2H), 5.30
			(dd, 0.8H), 2.90-2.50 (m, 3H),
			2.20 (m, 2H), 1.60-1.20 (m,
			5H)
36	N O	61,0	516.5 (M+H)
(aus	ОН		H-NMR (400 MHz,
18)			CD ₃ COCD ₃): 10.0 (bs, 2H),
		8	3.10-7.10 (m, 13H), 6.70 (m,
	ÓH	1	H), 4.150 (m, 2H), 2.90-1.20
			m, 19H)

37: 6-(4-Carboxybenzyl)-8-(2-phenyloxyphenyl)-7-octensäure



5 294,5 mg (0,56 mmol) 2-Benzylbenzyltriphenylphosphoniumbromid (hergestellt aus Bsp. IVn) werden bei 0°C unter Argon in 20 ml THF suspendiert und mit 0,42 ml

Buthyllithium (0,72 mmol, 1,6M Lösung in Hexan) versetzt. Die tieforange Lösung wird 30 min. bei 0°C gerührt. Eine Lösung von 125 mg (0,37 mmol) 6-Formyl-7-(4-ethoxycarbonylphenyl)heptansäureethylester (vgl. EP-A-0 341 551) in 15 ml THF wird bei dieser Temperatur tropfenweise hinzugegeben. Die Mischung wird 30 min. bei 0°C gerührt. Es wird bei 0°C mit Wasser versetzt, auf Raumtemperatur erwärmt und mit Essigsäureethylester extrahiert. Die organische Phase wird mit Natriumchloridlösung gewaschen, mit Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Das Rohprodukt wird in 5 ml Methanol gelöst und bei 0°C mit 1,5 ml 45%iger Natronlauge versetzt. Bei Raumtemperatur werden 0,2 ml Dichlormethan hinzugegeben. Die Lösung wird 16 Stunden bei Raumtemperatur gerührt, mit etwas Wasser versetzt und mit Ethylether extrahiert. Die wässrige Phase wird mit 10%iger Schwefelsäure auf pH 2-3 gestellt und zweimal mit Essigsäureethylester extrahiert, mit Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingedampft.

Ausbeute: 175 mg (roh) als eine Mischung: 70,0% Trans / 30,0% Cis.

¹H-NMR (400 MHz, CD₂Cl₂): 9,70 (bs, 2H), 7,95 (m, 2H), 7,70-7,00 (m, 9H), 6,80 (m, 2H), 6,40 (m, 1H), 6,00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 0,7H), 5,45 (t, J=9 Hz, 0,3H), 3,90 (m, 2H), 2,75 (m, 2H), 2,50-2,20 (m, 3H), 1,80-1,20 (m, 6H)



10

5

Analog wurden hergestellt:

Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
38		52,4	77% (E), 23% (Z)
(aus IV			¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃)
k)			10.70 (bs, 2H), 7.95 (m, 2H)
			7.55-7.10 (m, 6H), 6.60 (d
	ОН		0.8H, J=16 Hz), 6.50 (d,
			0.2H, J=9Hz), 6.10 (m,
	ОН		1.8H), 5.50 (t, 0.2H, J=9
	CH ₂		Hz), 5.40 (m, 1H), 5.20 (m,
			1H), 4.53 (m, 1.6H), 4.47
			(m, 0.4H), 2.75 (m, 2H),
		(2.60 (m,1H), 2.30 (m, 2H),
			1.70-1.10 (m, 6H)
39	9		LC/MS
(aus	ОН	100	Rf=4.7 min, 424 (M+)
IVd)			
	ОН		•
	CH3		
	3		
L			

Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
40 (aus IV g)	н,с		75% (E), 25% (Z) ¹ H-NMR (400 MHz, CD ₂ Cl ₂): 7.95 (m, 2H), 7.75-7.10 (m, 4H), 6.80 (m, 2H), 6.55 (d, J=16 Hz, 0.8H), 6.47 (d, J=9Hz, 0.2H), 6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 0.8H), 5.40 (t, J=9 Hz, 0.2H), 3.90 (m, 2H), 2.75 (m, 2H), 2.55 (m,1H), 2.30 (m, 2H), 1.80-1.20 (m, 22H), 0.00 (m, 2H)
41 (aus 1,3-Bis- (chlor- methyl)- benzol)	СІДОН	27,4	1.20 (m, 32H), 0.90 (m, 3H) 70% (E), 30% (Z) H-NMR (400 MHz, CD ₃ COCD ₃): 7.95 (m, 2H), 7.75-7.00 (m, 6H), 6.40 (d, J=9Hz, 0.3H), 6.25 (d, J=16 Hz, 0.7H), 6.10 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 0.7H), 5.45 (t, J=9 Hz, 0.3H), 4.35 (m, 2H), 2.75-2.50 (m, 3H), 2.30 (m, 2H), 1.80-1.20 (m, 6H)



Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
42		30,8	65% (E), 35% (Z)
(aus			H-NMR (400 MHz,
4-Tri-			CD ₃ COCD ₃): 7.95 (m, 2H),
fluor-	CYOKE		7.75-6.90 (m, 6H), 6.40 (d,
meth-	Ė į		J=9Hz, 0.3H), 6.20 (d, J=16
oxyben-	HO		Hz, 0.7H), 6.00 (dd, J=16
zylal-	Ö		Hz, J=8Hz, 0.7H), 5.40 (t,
kohol)	но^о		J=9 Hz, 0.3H), 2.75-2.50 (m,
			3H), 2.30 (m, 2H), 1.80-1.20
			(m, 6H)
43		61,6	70% (E), 30% (Z)
(aus			H-NMR (400 MHz,
3-Phen-			CD ₂ Cl ₂): 7.95 (m, 2H), 7.75-
оху-			6.90 (m, 11H), 6.40 (d,
benzyl-	HO		J=9Hz, 0.3H), 6.20 (d, J=16
alkohol)			Hz, 0.7H), 6.00 (dd, J=16
	HO^O		Hz, J=8Hz, 0.7H), 5.40 (t,
			J=9 Hz, 0.3H), 2.75-2.50 (m,
			3H), 2.30 (m, 2H), 1.80-1.20
			(m, 6H)

LC/MS-Bedingungen: Säule: Symmetry C18 2,1x50 mm; Eluent: Acetonitril/Wasser; Gradient: 10% Acetonitril bis 90% Acetonitril; Fluss: 0,5 ml/min; Detektor: UV 210 nm.

5

10

20

44: 6-(4-Ethoxycarbonylbenzyl)-8-(2-hydroxyphenyl)-7(E)-octensäureethylester

645,2 mg (1,44 mmol) 2-Hydroxybenzyltriphenylphosphoniumbromid werden bei 0°C unter Argon in 25 ml THF suspendiert und mit 2,2 ml Buthyllithium (3,53 mmol, 1,6M Lösung in Hexan) versetzt. Die tieforange Lösung wird 30 min. bei 0°C gerührt. Eine Lösung von 437 mg (1,31 mmol) 6-Formyl-7-(4-ethoxycarbonylphenyl)heptansäureethylester (vgl. EP-A-0 341 551) in 2 ml THF wird bei dieser Temperatur tropfenweise hinzugegeben. Die Mischung wird 30 min. bei 0°C gerührt. Es wird bei 0°C mit Wasser und Dichlormethan versetzt, auf Raumtemperatur erwärmt und mit Salzsäure auf pH 2 eingestellt. Die Mischung wird über Extrelut filtriert und im Vakuum eingedampft. Das rohe Material wird chromatographiert.

Ausbeute 184 mg (33,2% d. Th.)

¹H-NMR (200 MHz, CDCl₃): 7,95 (d, 2H, J=10 Hz), 7,25 (d, 2H), 7,10 (m, 2H), 6,80 (m, 2H), 6,40 (d, 1H, J=16 Hz), 5,85 (dd, 1H, J=16 Hz, J=9Hz), 5,10 (s, 1H), 4,35 (q, J=6Hz, 2H), 4,10 (m, 2H), 2,75 (m, 2H), 2,50 (m, 1H), 2,30 (m, 2H), 1,80-1,10 (m, 12H).

45: 6-(4-Carboxybenzyl)-8-(2-hydroxyphenyl)-7(E)-octensäure

Der Diester aus Bsp. 44 wird in der 50-fachen Menge Methanol gelöst und bei 0°C mit der 12-fachen Menge Natronlauge tropfenweise versetzt. Man lässt auf Raumtemperatur kommen und gibt soviel Methylenchlorid (ca. 0,2 ml) zu, dass die Lösung klar wird. Nach fünf Stunden wird mit etwas Wasser versetzt, mit Ether überschichtet, abgetrennt, die waessrige Phase mit 10%iger Schwefelsäure auf pH 2-3 gestellt, zweimal mit Essigester extrahiert, getrocknet und einrotiert.

¹H-NMR (200 MHz, CDCl₃): 7,90 (d, 2H), 7,75-7,30 (m,4H) 6,80 (m, 2H), 6,55 (d, 1H, J=16 Hz), 6,10 (dd, 1H, J=16 Hz, J=9Hz), 4,70 (s, 1H), 2,75 (m, 2H), 2,50 (m, 1H), 2,30 (m, 1H), 1,80-1,10 (m, 6H).

46: 6-(4-Ethoxycarbonylbenzyl)-8-(2-hydroxyphenyl)octansäureethylester

15

5

10

510,2 mg (1,44 mmol) 6-(4-Ethoxycarbonylbenzyl-8-(2-hydroxyphenyl)-7(E)-octensäureethylester aus Bsp. 44 und 250 mg Palladium/A-Kohle 10%ig werden in 20 ml Essigsäureethylester gegeben und bei Raumtemperatur unter Normaldruck mit Wasserstoff hydriert. Nach fünf Stunden wird die Mischung über Celite und im Vakuum eingedampft.

20

25

Ausbeute 507,9 mg (99,1% d. Th.)

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): 7,95 (d, 2H, J=10 Hz), 7,20 (d, 2H), 7,00 (m, 2H), 6,80 (m, 2H), 4,90 (s, 1H), 4,35 (q, J=6Hz, 2H), 4,10 (m, 2H), 2,65 (m, 4H), 2,30 (m, 2H), 1,80-1,10 (m, 15H)

47: 6-(4-Ethoxycarbonylbenzyl)-8-(2-((2-phenyl)-benzyloxy)phenyl)-7(E)-octensäureethylester

5

97 mg (0,23 mmol) des Phenols aus Beispiel 44, 67,9 mg (0,27 mmol) 2-Phenylbenzylbromid und 47,5 mg (0,34 mmol) Kaliumcarbonat werden in 5 ml Acetonitril zusammengegeben und unter Rückfluss erhitzt. Die Mischung wird abgekühlt, filtriert, im Vakuum eingedampft und chromatographiert.

10

Ausbeute: 79 mg (58,4% d. Th.)

¹H-NMR (400 MHz, CD₂Cl₂): 7,90 (d, 2H), 7,50-6,70 (m, 15H), 6,55 (d, J=16 Hz, 1H), 6,00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4,90 (s, 2H), 4,35 (q, J=6 Hz, 2H), 4,05 (q, J=6 Hz, 2H), 2,75 (m, 2H), 2,50 (m, 1H), 2,30 (m, 2H), 1,70-1,20 (m, 12H).

15



Analog wurden die folgenden Verbindungen synthetisiert:

Bsp.	Formel	Ausbeu	1-Spektroskopische Daten
		te (%)	
48		42,8	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃)
(aus 4-		72,0	
	OEt OEt		7.90 (d, 2H), 7.50-6.80 (m
Cyclo-	OEt		10H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H)
hexyl-			6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H)
benzyl-			5.00 (s, 2H), 4.35 (q, $J = 6$ Hz
chlorid			2H), 4.10 (q, $J = 6$ Hz, $2H$)
und 44)			2.80-2.40 (m, 4H), 2.25 (m
		i	2H), 1.85-1.30 (m, 22H)
49		18,4	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃)
(aus 4-			7.90 (m, 2H), 7.50-6.90 (m,
Chlor-	OEt		12H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H),
methyl2-			6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
phen-	s_(525 (s, 2H), 4.35 (q, J = 6 Hz,
ylthiazol	OEt		2 H), 4.05 (q, J = 6 Hz, 2H),
und 44)			2.80-2.40 (m, 3H), 2.25 (m,
			2H), 1.85-1.30 (m, 12H)
50			"H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 3-	CH ∠CH₃		7.90 (m, 2H), 7.50-6.90 (m,
Chlor-	لرن میل		10H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H),
methyl5-	△		
(4-meth-			6.05 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
			4.60 (s, 2H), 4.35 (q, $J = 6$ Hz,
oxy)-	LOUNTO		2H), 4.10 (q, $J = 6$ Hz, $2H$),
phenyl-	CH ₃		3.90 (s, 3H), 2.80-2.40 (m, 3H),
oxadiazol			2.25 (m, 2H), 1.85-1.30 (m,
und 44)			12H)



Bsp.	Formel	Assalsass	C-14-1-1-1-D-4
Psp.	h ollliei		-Spektroskopische Daten
		te (%)	
51 .		27,6	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃)
(aus 4-	ÇH₃ CH₃		7.90 (m, 2H), 7.50-6.70 (m,
Brom-	10, 0×0		9H), 6.45 (d, J=16 Hz, 1H),
methyl3-			5.90 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
(2,6-di-			4.65 (s, 2H), 4.35 (q, $J = 6$ Hz,
chlor-	$\bigvee_{i=1}^{n}$		2H), 4.10 (q, $J = 6$ Hz, $2H$),
phenyl-5-	H ₃ C O		2.80-2.50 (m, 3H), 2.40 (s, 3H),
methyl-	CI		2.25 (m, 2H), 1.85-1.30 (m,
isooxazol	CI		12H)
und 44)			
52		20,3	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 3-	CH₃ CH₃		7.90 (m, 2H), 7.50-6.80 (m,
Chlor-	رم مهم		9H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H),
methyll-			6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
(2,6-di-			5.05 (s, 2H), 4.35 (q, J = 6 Hz,
chlor-	CH _{3 CI}		2H), 4.10 (q, J = 6 Hz, 2H),
phenyl-5-	LO. LINGS		2.80 (m, 2H), 2.50 (m, 1H),
methyl-			2.40 (s, 3H), 2.25 (m, 2H),
1H-			1.85-1.30 (m, 12H)
pyrazol			
und 44)			



Dan	F1	14 1	lo
Bsp.	Formel	Ausber	u-Spektroskopische Daten
	1	te (%)	
53		60,5	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 1,5	ÇH ₃		7.90 (d, 2H), 7.50-6.80 (m,
Dibrom-	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		6H), 6.50 (d, J=16 Hz, 1H),
pentan			6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
und 44)			4.35 (q, J = 6 Hz, 2H), 4.10 (q,
	Br		J = 6 Hz, 2H), 3.90 (m, 2H),
	[],0, [3.40 (m, 2H), 2.80-2.40 (m,
			3H), 2.25 (m, 2H), 1.85-1.30
	_		(m, 18H)
54	ÇH ₃ CH ₃	25,0	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 2-	9 %		7.90-7.70 (m, 4H), 7.40-7.10
Brom-			(m, 7H), 6.90 (m, 2H), 6.60 (d,
methyl-	Ų		J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd, J=16
benzo-	ş-()		Hz, J=8Hz, 1H), 5.30 (s, 2H),
thiophen			4.35 (q, J = 6 Hz, 2H), 4.10 (q,
und 44)			J = 6 Hz, 2H), 2.80-2.40 (m,
			3H), 2.25 (m, 2H), 1.85-1.30
			(m, 12H)
55		63,7	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 2-(5-			7.90 (m, 2H), 7.40-6.70 (m,
Brom-			7H), 6.50 (d, J=16 Hz, 1H),
pentyl)-	\		6.25 (m, 1H), 6.00 (m, 2H),
furan und	ە \		4.35 (q, J = 6 Hz, 2H), 4.10 (q,
44)	H ₃ C_0		J = 6 Hz, 2H), 3.95 (m, 2H),
			3.40 (m, 2H), 2.80-2.40 (m,
	م ^ل ه		3H), 2.25 (m, 2H), 1.85-1.30
	H³C_		(m, 18H)



Bsp. Formel	Ausbeu-	Spektroskopische Daten
	te (%)	
	` ′	HIND (400 NUL CDCI)
56	1	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃):
(aus 1-		7.90-7.70 (m, 4H), 7.40-6.90
Brom-		(m, 11H), 6.50 (d, J=16 Hz,
methyl-		1H), 5.90 (dd, J=16 Hz, J=8Hz,
naphtha-		1H), 5.50 (s, 2H), 4.35 (q, J = 6
lin und H ₃ C O		Hz, 2H), 4.10 (q, J = 6 Hz, 2H),
44)		2.60 (m, 2H), 2.50 (m, 1H),
H,c J		2.20 (m, 2H), 1.85-1.30 (m,
		12H)
57	39,2	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 4-(4-CH ₃ CH ₃		8.00-6.80 (m, 13H), 6.60 (d,
(Bromme-		J=16 Hz, 1H), 5.90 (dd, J=16
thyl)phen		Hz, J=8Hz, 1H), 5.10 (s, 2H),
yl- (2-tri-		4.35 (q, J = 6 Hz, 2H), 4.10 (q,
fluor-		J = 6 Hz, 2H), 2.60 (m, 2H),
methyl-		2.50 (m, 1H), 2.20 (m, 2H),
thiazol-	1	1.85-1.30 (m, 12H)
und 44)		



Bsp.	Formel	Anaban	Carolatus aleasiacha Daton
ръър.	romei		-Spektroskopische Daten
		te (%)	
58		15,8	H-NMR (400 MHz, CDCl ₃):
(aus 2-(5-	s l		7.90 (d, 2H), 7.40-6.80 (m, 9H),
Brom-	\		6.50 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd,
pentyl)-	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o		J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 (m,
thiophen	H ₃ C_O		2H), 4.10 (m, 2H), 3.90 (m,
und 44)	3.01		2H), 2.90 (m, 2H), 2.80 (m,
	م ا		2H), 2.50 (m, 1H), 2.30 (m,
	H₃C d		2H), 2.00-1.40 (m, 18H)
59		86,0	H-NMR (400 MHz, CDCl ₃):
(aus 4-	ÇH₃ CH₃		7.90 (d, 2H), 7.50 (d, 4H), 7.40-
Phenyl-	النُّ مِهُ ا		7.10 (m, 11H), 6.90 (m, 2H),
ethenyl-			6.60 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd,
benzyl-			J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 5.00 (s,
chlorid			2H), 4.35 (q, $J = 6$ Hz, $2H$),
und 44)			4.10 (q, J = 6 Hz, 2H), 2.80 (m,
			2H), 2.50 (m, 1H), 2.30 (t, 2H),
			1.50-1.20 (m, 12H)
60		65,3	H-NMR (300 MHz, CDCl ₃):
(aus 4-	ÇH₃ ⟨ ^{CH} ₃		7.90 (d, 2H), 7.65 (d, 1H), 7.55
Acet-	رهٔ ۱۰۵		(d, 1H), 7.50-7.30 (m, 5H), 7.15
amido-			(m, 1H), 7.00 (d, 1H), 6.85 (t,
benzyl-			1H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H),
chlorid	\ H \ \		6.10 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
und 44)			5.00 (s, 2H), 4.60 (d, 1H), 4.35
			(q, J = 6 Hz, 2H), 4.10 (q, J = 6)
	~		Hz, 2H), 2.90-2.50 (m, 3H),
			2.20 (m, 5H), 1.60-1.20 (m,
			12H)

Bsp.	Formel	Anabara	Cnolstradionicale Dates
posp.	h olitici		-Spektroskopische Daten
		te (%)	
61		97,3	H-NMR (400 MHz, CDCl ₃)
(aus 2-(4-	CH₃ CH₃		8.25 (d, 2H), 7.90 (d, 2H), 7.65
(Chlorme-			6.90 (m, 11H), 6.60 (d, J=16
thyl)phen			Hz, 1H), 6.05 (dd, J=16 Hz,
yl)5-	О-√->-сн₃		J=8Hz, 1H), 5.10 (s, 2H), 4.35
methyl-			(q, J = 6 Hz, 2H), 4.10 (q, J = 6)
1,3-benz-			Hz, 2H), 2.90 (m, 2H), 2.50 (m,
oxazol			4H), 2.25 (t, 2H), 1.60-1.20 (m,
und 44)			12H)
	·		
62		85,4	H-NMR (400 MHz, CDCl ₃):
(aus Es-	CH. CH₃		7.90 (d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H),
sigsäure-	لَيْ مَهُ ا		6.85 (m, 2H), 6.60 (d, J=16 Hz,
(6-bromr-			1H), 6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz,
hexyl)-			1H), 4.35 (q, J = 6 Hz, 2H),
ester und	J		4.10 (m, 4H), 3.40 (m, 2H),
44)		i	2.80 (m, 2H), 2.50 (m, 1H),
			2.25 (m, 2H), 2.10 (s, 3H),
			1.80-1.20 (m, 20H)




Bsp.	Formel	Anghan	Caralter also in L. D. A.
Бър.	l'Officer	1	-Spektroskopische Daten
		te (%)	
63		roh	H-NMR (300 MHz, CDCl ₃):
(aus N-	ÇH₃ CH₃		7.90 (d, 2H), 7.40-6.70 (m, 6H),
(3-Brom-			6.60 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd,
propyl-			J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 (q,
mercap-	V		J=6 Hz, 2H), 4.00 (m, 4H), 3.50
tocar-			(m, 2H), 3.40 (m, 4H), 2.90-
bonyl)-	O~~S_N~		2.50 (m, 3H), 2.25 (m, 2H),
pyrrolidin	. 0		2.00-1.30 (m, 18H)
und 44)			
64		roh	H-NMR (400 MHz, CDCl ₃):
(aus 4-			7.90 (d, 2H), 7.40-7.00 (m, 9H),
Brom-	ÇH ₃		6.90 (m, 2H), 6.60 (d, J=16 Hz,
butyl-	9 %		1H), 6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz,
benzyl-			1H), 4.50 (s, 2H), 4.35 (q, J = 6
ether und	V		Hz, 2H), 4.10 (q, J = 6 Hz, 2H),
44)			4.00 (m, 2H), 3.50 (t, 2H), 2.90-
			2.50 (m, 3H), 2.25 (t, 2H), 1.90-
			1.30 (m, 16H)
65		roh	H-NMR (300 MHz, CDCl ₃):
(aus 5-	ÇH₃ ⟨CH₃		8.10 (d, 2H), 7.90 (d, 2H), 7.60-
Chlor-	(° 0×0		7.30 (m, 5H), 7.20-6.70 (m,
methyl3-		ŀ	4H), 6.60 (d, J=16 Hz, 1H),
phenyl-			6.10 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
1,2,4-			5.30 (s, 2H), 4.35 (q, J = 6 Hz,
oxadiazol	N-{	ļ	2H), 4.10 (q, $J = 6$ Hz, $2H$),
und 44)	0 0 N	þ	2.80 (m, 2H), 2.50 (m, 1H),
		þ	2.25 (m, 2H), 1.70-1.20 (m,
		1	12H)

Bsp.	Formel	Aushen	-Spektroskopische Daten
- P			- Spektroskopische Daten
		te (%)	
66		81,3	H-NMR (300 MHz, CDCl ₃):
(aus N-	ÇH₃ CH₃		7.90 (d, 2H), 7.40-6.70 (m, 6H),
(2-Chlor-	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		6.60 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd,
ethyl)-			J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 (q, J
morpho-			= 6 Hz, 2H), 4.10 (m, 4H), 3.70
lin und			(m, 4H), 2.80 (m, 4H), 2.50 (m,
44)			5H), 2.25 (t, 2H), 1.70-1.20 (m,
			12H)
67		73,1	H-NMR (300 MHz, CDCl ₃):
(aus 5-(3-	ÇH, CH3		8.10 (s, 2H), 7.90 (d, 2H), 7.40-
Brom-	رم مهن		6.70 (m, 6H), 6.50 (d, J=16 Hz,
propyl)-			1H), 5.90 (dd, J=16 Hz, J=8Hz,
2-amino-	V		1H), 4.95 (bs, 2H), 4.35 (q, J =
pyrimidin	_N NH₂		6 Hz, 2H), 4.10 (m, 2H), 3.90
und 44)	~~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		(m, 2H), 2.80-2.50 (m, 5H),
			2.25 (t, 2H), 2.00 (m, 2H), 1.70-
			1.20 (m, 12H)
68		roh	H-NMR (300 MHz, CDCl ₃):
(aus 4-			8.60 (bs, 1H), 7.90-6.80 (m,
Chlor-	φ ο _γ ο		17H), 6.50 (d, J=16 Hz, 1H),
methyl-		ļ	5.90 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
N-		ļ	4.95 (s, 2H), 4.35 (q, J = 6 Hz,
phenyl-		ſ	2H), 4.10 (m, 2H), 2.90-2.50
benzamid	H H		(m, 3H), 2.25 (t, 2H), 1.70-1.20
und 44)			m, 12H)
L		1	

Bsp.	Formel	Ausbeu-	Spektroskopische Daten
		te (%)	
69	0	52,0	H-NMR (400 MHz, CDCl ₃)
(aus 4-	OF OF		7.90 (d, 2H), 7.50-7.10 (m,
Cyclo-			8H), 6.85 (m, 2H), 5.00 (s, 2H),
hexyl-	OEt		4.35 (q, J = 6 Hz, 2H), 4.10 (q,
benzyl-			J = 6 Hz, 2H), 2.80-2.40 (m,
chlorid		:	5H), 2.25 (m, 2H), 1.85-1.30
und 46)			(m, 25H)
70		25,8	H-NMR (400 MHz, CDCl ₃):
(aus 4-	OEt		7.90 (d, 2H), 7.40-7.00 (m,
Phenyl-			13H), 6.90 (m, 2H), 5.00 (s,
ethyl-	OEt		2H), 4.35 (q, J = 6 Hz, 2H),
benzyl-	Ö		4.10 (q, J = 6 Hz, 2H), 2.90 (m,
chlorid			6H), 2.60 (m, 2H), 2.20 (t, 2H),
und 46)			1.60-0.80 (m, 15H)

71: 6-(4-Carboxybenzyl-8-(2-(2-phenylbenzyloxy)phenyl)-7(E)-octensäure



5

70 mg (0,12 mmol) des Diethylesters aus Bsp. 47 werden in 5 ml Methanol gelöst und mit 0,5ml 45%iger Natronlauge versetzt. Die Reaktion ist exotherm. Man lässt auf Raumtemperatur kommen und gibt 0,3 ml Dichlormethan hinzu. Nach 20 Stun-

den bei Raumtemperatur wird die Reaktionslösung einmal mit Ether gewaschen, mit 10%iger Schwefelsäure sauer gestellt, zweimal mit Essigester extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Extrelut filtriert und eingeengt.

Ausbeute: 15 mg (20,0% d. Th.)

5 LC/MS: Rf: 5,1 min, 535 (M+1)

Analog werden die folgenden Substanzen synthetisiert:

Bsp.	Formel	Ausbeute	Spektroskopische Daten
		(% d.Th.)	
72 (aus 48)	OH OH		H-NMR (400 MHz, CD ₃ COCD ₃): 10.70 (bs, 2H), 7.90 (d, 2H), 7.50-6.80 (m, 10H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H), 6.10 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 5.00 (s, 2H), 2.80-2.40 (m, 4H), 2.25 (m, 2H), 1.85-1.30 (m, 16H)
73 (aus 49)	S OH	13,1	LC/MS: 542 (M+1), R _f 4.9 min

Bsp.	Formel	Ausbeute	Spektroskopische Daten
		(% d.Th.)	
74	,CH ₃	9,7	LC/MS: 557 (M+1), R _f 4.7 min
(aus 50)			
	0		
	N J		
			,
	HO /		
	0		
	но		
75			
75	CI	14,0	LC/MS: 608 (M+1), Rf 4.8 min
(aus 51)	N		
	H ₃ ¢ O		
İ .	HO TO		
	0		İ
	но∕о		
76	Cl	27,9 I	_C/MS: 607 (M+1), Rf 5.2 min
	ci—(27,5	20/14/3. 007 (W1+1), Rd 3.2 mm
(aus 52)	N		
	H ₃ C		
			İ
		1	
	HO	1	İ
	*	į	i
	но Со		

Bsp.	Formel	Avahouto	Smalttmarken inche Daten
юsр.	rottilei		Spektroskopische Daten
		(% d.Th.)	
77	Br	20,9	LC/MS: 517 (M+1), Rf 4.9 min
(aus 53)			
	HO. []	}	
	но~о		
78		37,6	LC/MS: 515 (M+1), Rf 4.9 min
(aus 54)			
	s		
	но		
	но^о		
79		23,7	LC/MS: 505 (M+1), Rf 5.0 min
(aus 55)	СООН		
	Соон		
80	0	42,9	LC/MS: 509 (M+1), Rf 4.9 min
(aus 56)	ОН		
	ОН		·
81		40,1	H-NMR (400 MHz,
(aus 57)			CD ₃ COCD ₃): 10.70 (bs, 2H),
		1	8.10 (m, 2H), 7.90 (d, 2H),
	HO, OH		
			7.60-6.80 (m, 9H), 6.60 (d,
	N OH	þ	J=16 Hz, 1H), 6.10 (dd, J=16
		þ	Hz, J=8Hz, 1H), 5.15 (s, 2H),
	[-]		2.80-2.40 (m, 3H), 2.25 (m,
	·	1	2H), 1.75-1.30 (m, 6H)

Bsp.	Formel	Ausbeute	Spektroskopische Daten
		(% d.Th.)	
82		roh	H-NMR (400 MHz,
(aus 58)			CD ₃ COCD ₃): 10.60 (bs, 2H),
			7.90 (d, 2H), 7.40-6.80 (m,
	Соон		9H), 6.50 (d, J=16 Hz, 1H),
	Соон		6.10 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
			3.90 (m, 2H), 2.90-2.40 (m,
			5H), 2.30 (m, 2H), 2.10-1.40
			(m, 12H)
83		69,3	H-NMR (400 MHz,
(aus 59)	·		CD ₃ COCD ₃): 7.90 (m, 2H),
			7.60 (m, 4H), 7.50-7.20 (m,
			10H), 7.10 (t, 1H), 7.00 (d, 1H),
	ОН		6.90 (t, 1H), 6.60 (d, J=16 Hz,
			1H), 6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz,
		İ	1H), 5.00 (s, 2H), 2.80-2.40 (m,
	OH		3H), 2.10 (m, 2H), 1.50-1.30
			(m, 6H)
	~		, ,
	_		



Bsp.	Formel	Ausbeute	Spektroskopische Daten
		(% d.Th.)	
84		97,7	H-NMR (400 MHz,
(aus 60)			CD ₃ COCD ₃): 10.70 (bs, 2H),
			7.90 (d, 2H), 7.65 (d, 1H), 7.55
			(d, 1H), 7.50-7.30 (m, 5H), 7.15
			(m, 1H), 7.00 (d, 1H), 6.85 (t,
			1H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H),
			6.10 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
	H³C N OH		5.00 (s, 2H), 4.60 (d, 1H), 2.90-
	O		2.50 (m, 3H), 2.20 (m, 5H),
			1.60-1.20 (m, 6H)
85		roh	H-NMR (400 MHz,
(aus 61)			CD ₃ COCD ₃): 8.25 (d, 2H), 7.90
			(d, 2H), 7.65-6.90 (m, 11H),
	ОН		6.60 (d, J=16 Hz, 1H), 6.10 (dd,
		İ	J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 5.20 (s,
	OH OH		2H), 2.90-2.50 (m, 3H), 2.45 (s,
	N > 0		3H), 2.25 (t, 2H), 1.60-1.20 (m,
		ļ	6H) ·
	H ₃ Ć		
86		,	H-NMR (400 MHz,
(aus 62)			CD ₃ COCD ₃): 7.90 (d, 2H), 7.40
			(m, 3H), 7.10 (m, 1H), 6.85 (m,
			2H), 6.60 (d, J=16 Hz, 1H),
			6.10 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
	но	ľ	3.90 (m, 2H), 3.60 (m, 2H),
			2.90-2.50 (m, 3H), 2.25 (m,
		f	2H), 1.80-1.20 (m, 14H)

Formel	Ausbeute	Spektroskopische Daten
	(% d.Th.)	
	roh	H-NMR (400 MHz,
		CD ₃ COCD ₃): 7.90 (d, 2H), 7.40
_ о "		(m, 2H), 7.15-6.70 (m, 4H),
		6.60 (d, J=16 Hz, 1H), 6.10 (dd,
		J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.00 (m,
OH .		2H), 3.30 (m, 6H), 2.90-2.50
		(m, 3H), 2.25 (m, 2H), 2.00-
		1.30 (m, 12H)
*	roh	¹ H-NMR (400 MHz,
		CD_3COCD_3): 7.90 (d, 2H),
		7.40-7.20 (m, 8H), 7.10 (m,
		1H), 6.85 (m, 2H), 6.50 (d,
ОН		J=16 Hz, 1H), 6.10 (dd, J=16
		Hz, J=8Hz, 1H), 4.50 (s, 2H),
OH		4.00 (m, 2H), 3.50 (t, 2H), 2.90-
		2.50 (m, 3H), 2.25 (t, 2H), 1.90-
		1.30 (m, 10H)
	roh	H-NMR (400 MHz,
		CD_3COCD_3): 10.80 (bs, 2H),
		8.10 (d, 2H), 7.90 (d, 2H), 7.60-
OH OH		7.30 (m, 5H), 7.20-6.70 (m,
o N	ŀ	4H), 6.60 (d, J=16 Hz, 1H),
N=(6.20 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H),
Он	; -	5.50 (s, 2H), 2.90-2.50 (m, 3H),
		2.25 (m, 2H), 1.70-1.30 (m, 6H)
		(% d.Th.) roh roh roh roh







Bsp.	Formel	Ausbeute	Spektroskopische Daten
		(% d.Th.)	
90 (aus 66)	OH OH	69,0	LC-MS: 482 (M+1), R _f 3.1 min
91 (aus 67)	OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH O		LC-MS: 504 (M+1), R _f 3.74
92		21,9	¹ H-NMR (400 MHz,
(aus 68)	OH OH		CDCOCD ₃): 10.90 (bs, 2H), 9.50 (bs, 1H), 7.90-6.80 (m, 17H), 6.60 (d, J=16 Hz, 1H), 6.10 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 5.15 (s, 2H), 2.90-2.50 (m, 3H), 2.25 (t, 2H), 1.70-1.20 (m, 6H)
93* (aus 69)	ОН		H-NMR (400 MHz, CDCOCD ₃): 10.60 (bs, 2H), 7.90 (d, 2H), 7.40 (d, 2H), 7.25 (m, 4H), 7.10 (d, 2H), 7.00 (d, 1H), 6.80 (t, 1H), 5.00 (s, 2H), 2.80-2.50 (m, 5H), 2.25 (t, 2H), 1.85-1.30 (m, 19H)

Bsp.	Ausbeute (% d.Th.)	Spektroskopische Daten
94 (aus 70)	 82,6	H-NMR (400 MHz, CDCOCD ₃): 7.90 (d, 2H), 7.20-7.00 (m, 13H), 6.90 (m, 1H), 6.70 (m, 1H), 4.90 (s, 2H), 2.90 (m, 6H), 2.60 (m, 2H), 2.20 (t, 2H), 1.60-0.80 (m, 9H)

* hergestellt als reines (-)-Enantiomer aus enantiomerenreinem Bsp. 44 über Bsp. 46 und 69. Die Enantiomerentrennung der Verbindung aus Bsp. 44 erfolgte über Chromatographie an einer chiralen stationären Polyamid-Kieselgelphase basierend auf dem Monomer N-Methacryloyl-L-isoleucin-3-pentylamid, das nach radikalischer Polymerisation kovalent gebunden an einem modifizierten Kieselgel vorliegt. Phasen solcher Art sind in der EP-A-0 379 917 beschrieben.

LC/MS-Bedingungen: Säule: Symmetry C18 2,1x50 mm; Eluent: Acetonitril/Wasser; Gradient: 10% Acetonitril bis 90% Acetonitril; Fluss: 0,5 ml/min; Detektor: UV 210 nm.





5

10

31,6 mg (0.07 mmol) 6-(4-Carboxybenzyl)-8-(2-heptoxyphenyl)-7-octensäure aus Bsp. 25 und 20 mg Palladium/A-Kohle (10%ig) werden in 5 ml Essigsäureethylester gegeben und bei Raumtemperatur unter Normaldruck mit Wasserstoff hydriert. Nach zwei Stunden wird die Mischung über Celite filtriert und im Vakuum eingedampft.

Ausbeute: 15,6 mg (80,7 d. Th.)

¹H-NMR (400 MHz, CD₂Cl₂): 7,90 (d, 2H), 7,60-7,00 (m, 4H), 6,80 (d, 2H), 3,90 (t, 2H), 2,80-2,50 (m, 4H), 2,30 (m, 2H), 1,70-1,25 (m, 19H), 0,90 (t, 3H)

Analog wurde hergestellt:



5

Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
96	9	63,5	H-NMR (400 MHz, CD ₂ Cl ₂):
(aus 26)	ОН		7.95 (m, 2H), 7.70-6.70 (m,
			15H), 5.30 (s, 2H), 2.80-2.50
	ОН		(m, 4H), 2.30 (m, 2H), 1.70-
			1.25 (m, 9H)

97: 6-(4-Ethoxycarbonylbenzyl)-8-(2-(5-N-morpholinopentyloxy)phenyl)-7-(E)-octensäureethylester

50 mg (0,09 mmol) des Bromides aus Bsp. 53, 15,2 mg (0,17 mmol) Morpholin, 13,2 mg (0,1 mmol) Kaliumcarbonat und eine katalytische Menge Kaliumiodid werden in 5 ml Acetonitril über Nacht unter Rückfluss erhitzt. 0,5 ml Wasser werden zugegeben, die Lösung wird in Dichlormethan aufgenommen, über Extrelut filtriert und im Vakuum eingedampft.

10 Ausbeute: 50,0 mg (98,9% d. Th.)

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): 7,90 (d, 2H), 7,40-7,10 (m, 4H), 6,80 (m, 2H), 6,55 (d, J=16 Hz, 1H), 6,00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4,35 (q, J = 6 Hz, 2H), 4,10 (q, J = 6 Hz, 2H), 3,90 (m, 2H), 3,70 (m, 4H), 2,80 (m, 2H), 2,50 (m, 7H), 2,25 (t, 2H), 1,70-1,20 (m, 18H).

Analog wurden dargestellt:

Bsp.	Formel	Anc	Spektroskopische Deter
μοsp.	r Olliel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
98	·	roh	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): 7.90
(aus	CH ₃ O _V O _V CH ₃		(d, 2H), 7.40-6.70 (m, 11H), 6.55 (d
Anilin)			J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd, J=16 Hz,
			J=8Hz, 1H), 4.35 (q, $J=6$ Hz, 2H),
			4.10 (q, J = 6 Hz, 2H), 4.00 (m, 2H),
			3.70 (bs, 1H), 3.15 (t, 2H), 2.80 (m,
			2H), 2.50 (m, 1H), 2.25 (t, 2H),
			1.70-1.20 (m, 18H)
99		81,2	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): 7.90
(aus 4-	CH, ON O CH,		(d, 2H), 7.40-6.70 (m, 6H), 6.55 (d,
Amino-			J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd, J=16 Hz,
carbon-			J=8Hz, 1H), 5.50 (2bs, 2H), 4.35 (q,
yl)-pi-			J = 6 Hz, 2H), 4.10 (q, $J = 6$ Hz,
peridin			2H), 4.00 (m, 2H), 3.15 (m, 6H),
			2.80 (m, 2H), 2.50 (m, 1H), 2.25-
	~ ~		1.20 (m, 23H)
100		95,6	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): 7.90
(aus	CH3		(d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.80 (m,
Bis-	o CH₃		2H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00
(meth-	OT CH ₃		(dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 (q, J
oxy-	· \		= 6 Hz, 2H), 4.10 (q, J = 6 Hz, 2H),
ethyl)-			3.90 (m, 2H), 3.50 (m, 4H), 3.30 (s,
amin)	CH ₃		6H), 2.80-2.50 (m, 9H), 2.30 (m,
			2H), 1.90-1.20 (m, 18H)
	H ₃ C-0		, 1.20 (, 1011)
	П ₃ С -		

Ausbeute (%) 101 (aus Dimethylamin) 102 (aus Ni-CH ₃ (Ausbeute) CH ₃ (CH ₃	(q, J 2H),
(%) 101 (aus Dimethylamin) CH ₃ (C	(q, J 2H),
101 (aus Dimethylamin) CH ₃ (aus Dimethylamin) P(H ₃ (aus Dimethylamin) (aus Dimethylamin) P(H ₃ (aus Dimethylamin) (aus Dimethylamin) P(H ₃ (aus Dimethylamin) (b) (cH ₃ (c	(q, J 2H),
(aus Dimethylamin) (aus Dimethylamin) (aus Dimethylamin) (b) CH ₃ (c	(q, J 2H),
(d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.8 2H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H), (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 = 6 Hz, 2H), 4.10 (q, J = 6 Hz, 3.90 (m, 2H), 2.80 (m, 8H), 2.5 5H), 2.30 (m, 2H), 1.90-1.20 18H) 102 CH ₃ OOCH ₃ roh H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): (d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.80 2H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H), (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35	6.00 (q, J 2H),) (m,
amin) (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 = 6 Hz, 2H), 4.10 (q, J = 6 Hz, 3.90 (m, 2H), 2.80 (m, 8H), 2.5 5H), 2.30 (m, 2H), 1.90-1.20 18H) 102 (aus N- Acetyl- Acetyl- (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 = 6 Hz, 2H), 4.10 (q, J = 6 Hz, 3.90 (m, 2H), 1.90-1.20 (aus, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35	(q, J 2H),) (m,
CH ₃ N. CH ₃ roh H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): (aus N-Acetyl- (d, J=6 Hz, 2H), 4.10 (q, J=6 Hz, 3.90 (m, 2H), 2.80 (m, 8H), 2.5 (m, 2H), 1.90-1.20 (m, 2H), 1.90-1.20 (m, 4H), 6.86 (d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.86 (d, J=16 Hz, 1H), (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35	2H), (m,
3.90 (m, 2H), 2.80 (m, 8H), 2.55 (h), 2.30 (m, 2H), 1.90-1.20 18H) 102 (aus N-Acetyl- Acetyl- 3.90 (m, 2H), 2.80 (m, 8H), 2.55 (h), 2.30 (m, 2H), 1.90-1.20 (m, 2H) (m,
3.90 (m, 2H), 2.80 (m, 8H), 2.55 (h), 2.30 (m, 2H), 1.90-1.20 18H) 102 (aus N-Acetyl- Acetyl- 3.90 (m, 2H), 2.80 (m, 8H), 2.55 (h), 2.30 (m, 2H), 1.90-1.20 (m, 2H) (m,
102 CH ₃ roh 'H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): (aus N-Acetyl- (dd, J=16 Hz, 1H), 4.35	(m,
102 CH ₃ roh 'H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): (aus N-Acetyl- (dd, J=16 Hz, 1H), 4.35	İ
(aus N-Acetyl- Acetyl- (aus O CH ₃ (d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.86 (dd, J=16 Hz, 1H), (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35	
(aus N-Acetyl- (d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.86 (d, 2H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H), (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35	7.90
N- Acetyl- 2H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H), (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35	(m,
	6.00
miner- 0 = 6 Hz 2H) 4 10 (a I = 6 Hz	(q, J
[P.Po.] [] [[[0 112, 211), 4.10 (q, 3 - 0 112,	2H),
azin) 4.00 (m, 2H), 3.50 (m, 4H), 2.90	
8H), 2.50 (m, 4H), 2.20 (m,	2H),
1.90-1.20 (m, 18H)	
103 CH ₃ ch ₃ roh LC-MS: 669 (M+1), Rf 4.01 mi	
(aus	
N-	
Benzyl-	
pipera-	İ
zin)	
Ŭ N ✓ N ✓	



Bsp.	Formel	Aus-	Spaktroakoniaska Datan
Bsp.		beute	Spektroskopische Daten
		(%)	
104 (aus Pyrrol- idin)	CH ₃ O ₂ O ₂ CH ₃	100	¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): 7.90 (d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.80 (m, 2H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 (q, J=6 Hz, 2H), 4.10 (q, J=6 Hz, 2H), 3.90 (m, 2H), 2.70 (m, 8H), 2.50 (m, 5H), 2.30 (m, 2H), 1.90-1.20 (m, 22H)
105 (aus N- Phenyl- piper- azin)	CH ₃ O ₂ O ₂ CH ₃	roh	LC-MS: 655 (M+1), Rf 4.07 min
106 (aus N- Methyl- piper- azin)	CH ₃ O O CH ₃		¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): 7.90 (d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.80 (m, 2H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 (q, J=6 Hz, 2H), 4.10 (q, J=6 Hz, 2H), 3.90 (m, 2H), 3.10 (m, 4H), 2.50 (m, 14H), 1.90-1.20 (m, 18H)

Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
107		96,5	¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): 7.90
(aus Pi-	CH³ O [◆] O CH³		(d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.80 (m,
peridin)	Ĭ		2H), 6.55 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00
]			(dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.35 (q, J
		ľ	= 6 Hz, 2H), 4.10 (q, J = 6 Hz, 2H),
			3.90 (m, 2H), 2.80 (m, 2H), 2.50 (m,
			7H), 2.20 (t, 2H), 1.90-1.20 (m,
			24H)
108		94,6	^I H-NMR (400 MHz, d ⁶ -DMSO):
(aus	H ₃ C		7.80 (d, 2H), 7.40-6.80 (m, 6H),
Pyrrol			6.65 (m, 2H), 6.30 (d, J=16 Hz, 1H),
mit			6.00 (m, 3H), 4.35 (q, J = 6 Hz, 2H),
кон		İ	4.10 (q, J = 6 Hz, 2H), 3.90 (m, 4H),
als Ba-	1130	i	2.80 (m, 2H), 2.50 (m, 1H), 2.20 (t,
se)			2H), 1.90-1.20 (m, 18H)



LC/MS-Bedingungen: Säule: Symmetry C18 2,1x50 mm; Eluent: Acetonitril/Wasser; Gradient: 10% Acetonitril bis 90% Acetonitril; Fluss: 0,5 ml/min; Detektor: UV 210 nm.

5

10

109: 6-(4-Carboxybenzyl)-8-(2-(5-N-morpholinopentyloxy)phenyl)-7-(E)-octensäure

50 mg (0,09 mmol) des Diethylesters aus Bsp. 97 werden in 5 ml Methanol gelöst und mit 0,5ml 45%iger Natronlauge versetzt. Die Reaktion ist exotherm. Man lässt auf Raumtemperatur kommen und gibt 0,3 ml Dichlormethan hinzu. Nach 20 Stunden bei Raumtemperatur wird die Reaktionslösung einmal mit Ether gewaschen, mit 10%iger Schwefelsäure auf pH=4 gestellt, zweimal mit Essigester extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingengt.

Ausbeute: 39,1 mg (86,6 % d. Th.)

¹H-NMR (400 MHz, D₂O): 7,90 (d, 2H), 7,40-7,10 (m, 6H), 6,40 (d, J=16 Hz, 1H), 6,20 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 3,90 (m, 2H), 3,70 (m, 4H), 2,90 (m, 1H), 2,80 (m, 1H), 2,50 (m, 5H), 2,30 (m, 2H), 2,25 (t, 2H), 1,70-1,20 (m, 12H)

Analog wurden dargestellt:

Den	E 1	A	0 1, 1 1 5
BSp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	·
		(%)	
110		53,8	H-NMR (400 MHz, d ⁶ -DMSO):
(aus	oh ohoh		12.30 (bs, 2H), 7.90 (d, 2H), 7.30-
98)			6.80 (m, 9H), 6.55 (m, 2H), 6.40 (d,
		}	J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd, J=16 Hz,
			J=8Hz, 1H), 3.90 (m, 2H), 3.70 (bs,
			1H), 3.00 (t, 2H), 2.70 (m, 2H), 2.50
			(m, 1H), 2.15 (t, 2H), 1.70-1.20 (m,
			(12H)
	~		
111	OH O OH	33,3	H-NMR (400 MHz, d ⁶ -DMSO):
(aus	o' \ 🔘		12.50 (bs, 2H), 7.90 (d, 2H), 7.40-
99)	\bigvee		6.60 (m, 6H), 6.45 (d, J=16 Hz, 1H),
			6.00 (dd, J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 4.00
	J. J. H		(m, 2H), 2.80-1.20 (m, 23H)
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
112		68,3	H-NMR (400 MHz, d ⁶ -DMSO): 7.80
(aus	oh o≯oh		(d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.80 (m,
100)			2H), 6.35 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd,
			J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 3.90 (m, 2H),
			3.40 (m, 4H), 3.20 (s, 6H), 2.90-2.40
	CH³		
			(m, 9H), 2.20 (m, 2H), 1.80-1.20 (m,
			12H)
	H³C-Q		
	3-		

Ron	Formel	IA.u.	Consistencia de Data
Dsp.	rollinei	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
113	он отон		H-NMR (200 MHz, d ⁶ -DMSO): 7.80
(aus			(d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.80 (m,
101)			2H), 6.45 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd,
			J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 3.90 (m, 2H),
ŀ			2.80-1.20 (m, 25H)
	CH₃		
	✓N.CH³		
114	OH O OH	25,8	¹ H-NMR (200 MHz, d ⁶ -DMSO): 7.80
(aus			(d, 2H), 7.40-6.50 (m, 6H), 6.45 (d,
102)			J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd, J=16 Hz,
			J=8Hz, 1H), 3.90 (m, 2H), 3.50-1.20
			(m, 30H)
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		LC-MS: 565 (M+1), Rf 3.20 min
115	^{OH} O ^A OH	13,7	LC-MS: 613 (M+1), Rf 3.33 min
1 1	~~ _	,,,,	20 Mis. 013 (W1 1), Rt 3.33 Min
103)	\ \\		·
103)			
]o, 0	i	
	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
	VN√		
116	oh o≯oh	70,2	LC-MS: 508 (M+1), Rf 3.27 min
(aus			H-NMR (400 MHz, d ⁶ -DMSO): 7.70
104)		ļ	(d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.80 (m,
			2H), 6.30 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd,
	┌ ०┐		J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 3.90 (m, 2H),
			3.40-1.20 (m, 27H)
	✓n✓		

D		1.	
Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
117		33,8	LC-MS: 599 (M+1), Rf 4.07 min
(aus	OH OYOH		¹ H-NMR (400 MHz, d ⁶ -DMSO): 7.70
105)			(d, 2H), 7.40-6.70 (m, 11H), 6.30 (d,
		}	J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd, J=16 Hz,
			J=8Hz, 1H), 3.90 (m, 2H), 3.50-1.20
		l	(m, 27H)
118		79,8	LC-MS: 522 (M+1), Rf 3.25 min
(aus	OH O≻OH		¹ H-NMR (200 MHz, d ⁶ -DMSO): 7.80
107)			(d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.80 (m,
			2H), 6.40 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd,
			J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 3.90 (m, 2H),
			3.00 (m, 2H), 2.80 (m, 2H), 2.50-1.20
			(m, 25H)
	VN✓		·
119	oh o≯oh	60,8	H-NMR (400 MHz, d ⁶ -DMSO): 7.90
(aus			(d, 2H), 7.40-7.10 (m, 4H), 6.80 (m,
106)	Ŭ		2H), 6.40 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (dd,
			J=16 Hz, J=8Hz, 1H), 3.80 (m, 2H),
			3.10-1.20 (m, 30H)
	N, CH ₃		





5

10

Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
120	OH O OH	roh	¹ H-NMR (400 MHz, d ⁶ -DMSO): 7.80
(aus			(d, 2H), 7.40-6.80 (m, 6H), 6.65 (m,
108)			2H), 6.30 (d, J=16 Hz, 1H), 6.00 (m,
			3H), 3.90 (m, 4H), 2.90-1.20 (m,
			17H)

LC/MS-Bedingungen: Säule: Symmetry C18 2,1x50 mm; Eluent: Acetonitril/Wasser; Gradient: 10% Acetonitril bis 90% Acetonitril; Fluss: 0,5 ml/min; Detektor: UV 210 nm.

121: 7-{[2-(3-Fluorphenyl)-1,3-benzothiazol-4-yl]methoxy}-6-[4-(methoxy-carbonyl)benzyl]heptansäuremethylester

102,8 mg (0,32 mmol) 4-Brommethyl-2-(3-fluorphenyl)-benzothiazol und 300 mg MS3A werden in 5 ml Benzol unter Argon gelöst. Bei Raumtemperatur werden 82 mg (0,27 mmol) 6-Hydroxymethyl-7-(4-methoxycarbonylphenyl)heptansäuremethylester (Synthese vgl. EP-A-0 341 551, S. 31, Bsp. 42) und 92 mg (0,40 mmol) Silberoxid zugegeben. Die Mischung wird sechs Tage bei Raumtemperatur gerührt. Es

wird mit ca. 0,2 ml Wasser versetzt, über Extrelut filtriert, mit Toluol nachgewaschen, im Vakuum eingeengt und chromatographiert.

Ausbeute: 64 mg (43.8% d. Th.)

¹H-NMR (200 MHz, CDCl₃): 8,00-7,10 (m, 11H), 5,10 (s, 2H), 3,90 (s, 3H), 3,70 (s, 3H), 3,50 (m, 2H), 2,70 (m, 2H), 2,30 (m, 2H), 1,80 (m, 1H), 1,70-1,20 (m, 6H)

Analog wurden die folgende Substanzen synthetisiert:

10


Bsp.	Formel	Ausbeu-	Spektroskopische Daten
		te (%)	
122	CH ₃	43,3	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus	o Cn ₃		7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m,
Benzyl-			7H), 4.50 (s, 2H), 3.90 (s, 3H),
bromid)			3.70 (s, 3H), 3.30 (d, 2H),
	CH ₃		2.80 (m, 2H), 2.30 (m, 2H),
			1.90-1.30 (m, 7H)
123	O.CH ₃	roh	¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 3-	0.5113		7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m,
(2-			10H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s,
Fluor-	о. _{СН3}		3H), 3.70 (s, 3H), 3.30 (d,
phen-			2H), 2.80 (m, 2H), 2.30 (m,
oxy)-			2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.00
benzyl-			(m, 6H)
bromid)			

te (%) 124	Bsp.	Formel	Ausbeu	-Spektroskopische Daten
124				T amount
Fluor-1-brom-methyl-naph-thalin) 125 (aus 4-t-Butyl-bromid) 126 (aus 2-Brom-methyl-bi-phenyl) 126 (aus 2-Brom-methyl-bi-phenyl) 127 (aus 2-Diffuor-meth-oxy-		О.СН ₃		H-NMR (200 MHz, CDCl ₃)
brom- methyl- naph- thalin) 125 (aus 4-t- Butyl- benzyl- bromid) 126 (aus 2- Brom- methyl- inaph- thalin) 126 (aus 2- Brom- methyl- bi- phenyl) 127 (aus 2- Diffluor- meth- oxy- Diffluor- meth- oxy- Diffluor- meth- oxy- Diffluor- methyl- box Diffluor- methyl- maph- thalin) 3.30 (d, 2H), 2.70 (m, 2H) 2.30 (m, 2H), 1.90 (m, 1H) 1.70-1.30 (m, 2H) 2.30 (m, 2H), 7.40-6.80 (m 6H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 2.70 (m, 2H), 2.30 (m, 2H) 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m 15H) 57,1 H-NMR (200 MHz, CDCl ₃) 7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) 51,0 H-NMR (200 MHz, CDCl ₃) 7.95 (m, 2H), 7.40-7.00 (m 6H), 6.40 (dt, 1H), 4.50 (s 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)		F		
methyl- naph- thalin) 125 (aus 4-t- Butyl- benzyl- bromid) 126 (aus 2- Brom- methyl- bi- phenyl) 127 (aus 2- Diffluor- meth- oxy- Mark 200 CH ₃ 2.30 (m, 2H), 1.90 (m, 1H 1.70-1.30 (m, 6H) H-NMR (200 MHz, CDCl ₃ 7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m 6H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 2.70 (m, 2H), 2.30 (m, 2H) 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m 15H) 127 (aus 2- Diffluor- meth- oxy- OCH ₃ 15,0 CH ₃ 16,0 CH ₃ 17,0 18,1 18,				
1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 2H), 7.40-6.80 (m, 2H), 2.30 (m, 2H), 2.70 (m, 2H), 2.30 (m, 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m, 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 6H) 1.70-1.30 (m, 2H), 7.40-6.80 (m, 2H), 2.30 (m, 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m, 2H), 2.60 (m, 2H), 2.60 (m, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)	i	CH ₃		
thalin) 125 (aus 4-t-Butyl-bromid) 126 (aus 2-Brom-methyl-bi-phenyl) 127 (aus 2-Diffluor-meth-oxy- 127 (aus 2-Diffluor-meth-oxy- 128 129 120 120 121 120 121 120 120				
125 (aus 4-t-Butyl-benzyl-bromid) 126 (aus 2-Brom-methyl-bi-bi-phenyl) 127 (aus 2-Diffluor-meth-oxy-broxy-broxy-broxy-broxy-broxy-broxy-bromid) 128 (aus 4-t-Butyl-bromid) 129 (aus 4-t-Butyl-bromid) 120 (aus 4-t-Butyl-bromid) 120 (aus 4-t-Butyl-bromid) 120 (aus 4-t-Butyl-bromid) 120 (aus 2-Brom-methyl-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-				1.70-1.30 (m, 6H)
(aus 4-t-Butyl-benzyl-bromid) 126 (aus 2-Brom-methyl-bi-phenyl) 127 (aus 2-Diffluor-meth-oxy- (aus 2-Diffluor-meth-oxy- (aus 4-t-Butyl-benzyl-bromid) 128 (aus 2-Diffluor-meth-oxy- (aus 2-Diffluor-meth-oxy- (aus 2-Diffluor-meth-oxy- (aus 2-Diffluor-meth-oxy- (aus 2-Diffluor-meth-oxy- (aus 3-Diffluor-meth-oxy- (aus 4-t-Butyl-bromid) 7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m, 2H), 2.30 (m, 2H), 1.70-1.30 (m, 6H) 129 (aus 2-Diffluor-meth-oxy- (aus 3-Diffluor-meth-oxy- (aus 4-t-Butyl-bromid) 7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m, 2H), 1.70-1.30 (m, 6H) 127 (aus 2-Diffluor-meth-oxy- (aus 3-Diffluor-meth-oxy- (aus 4-t-Butyl-bromid) 7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m, 2H), 1.70-1.30 (m, 6H) 127 (aus 2-Diffluor-meth-oxy- (aus 3-Diffluor-meth-oxy- (b) CH ₃ 7.95 (m, 2H), 7.40-7.00 (m, 2H), 1.70-1.30 (m, 6H) (c) CH ₃ (aus 3-Diffluor-meth-oxy- (c) CH ₃ (aus 3-Diffluor-meth-oxy- (c) CH ₃ (aus 4-Diffluor-meth-oxy- (c) CH ₃ (aus 4-Difflu			20.1	III ND (D. (200 MII - CDCI)
Butylbenzylbromid) H ₃ C CH ₃ OCH ₃			38,1	
benzyl-bromid) H ₃ C CH ₃ O CH ₃ 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 2.70 (m, 2H), 2.30 (m, 2H) 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m) 15H) 126 (aus 2-Brom-methyl-bi-phenyl) CH ₃ O CH ₃ TH-NMR (200 MHz, CDCl ₃) 7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m) 11H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s) 3H), 3.70 (s, 3H), 3.20 (m) 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m) 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) 127 (aus 2-Difluor-meth-oxy- Difluor-meth-oxy- CH ₃ CH ₃ 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 2.70 (m, 2H), 2.30 (m) 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m) 2H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 2.70 (m, 2H), 2.30 (m) 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m) 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m) 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.40 (m, 2H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s	1			
bromid) H ₃ C CH ₃ 2.70 (m, 2H), 2.30 (m, 2H) 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m 15H) 126 (aus 2- Brom- methyl- bi- phenyl) CH ₃ CH ₃ 2.70 (m, 2H), 2.30 (m, 2H) 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m 15H) H-NMR (200 MHz, CDCl ₃) 7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m 11H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s 3H), 3.70 (s, 3H), 3.20 (m 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) 127 (aus 2- Difluor- meth- oxy- CH ₃ CH ₃ 2.70 (m, 2H), 2.30 (m, 2H) 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m 11H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 7.40-7.00 (m 6H), 6.40 (dt, 1H), 4.50 (s 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)				
1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 15H) 126 (aus 2-Brommethylbi-bi-phenyl) 127 (aus 2-Difluormeth-oxy-meth-oxy-				
15H) 126 (aus 2-Brom-methyl-bi-phenyl) 15H) 15H) 57,1	bromia)			
126 (aus 2-Brom-methyl-bi-phenyl) 127 (aus 2-Difluor-meth-oxy- CH ₃ 57,1 H-NMR (200 MHz, CDCl ₃) 7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m) 11H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s) 3H), 3.70 (s, 3H), 3.20 (m) 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m) 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) 7.95 (m, 2H), 7.40-7.00 (m) 6H), 6.40 (dt, 1H), 4.50 (s) 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)		Сп _з		
(aus 2-Brommethyl-bi-phenyl) 127 (aus 2-Difluor-meth-oxy- (aus 2-Difluor-meth-oxy- (aus 2-CH ₃ (but 14), 7.40-6.80 (m. 21), 3.90 (s. 31), 3.70 (s. 31),	105			
Brom- methyl- bi- phenyl) CH ₃ 11H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s) 3H), 3.70 (s, 3H), 3.20 (m) 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m) 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) 127 (aus 2- Difluor- meth- oxy- CH ₃ 11H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.70 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)				
methylbi- phenyl) CH ₃ 3H), 3.70 (s, 3H), 3.20 (m) 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m) 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) 127 (aus 2- Difluor- meth- oxy- CH ₃ 3H), 3.70 (s, 3H), 3.20 (m) 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m) 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) 7.95 (m, 2H), 7.40-7.00 (m) 6H), 6.40 (dt, 1H), 4.50 (s) 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)	`			
bi- phenyl) CH ₃ 2H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) 127 (aus 2- Difluor- meth- oxy- CH ₃ 12H), 2.60 (m, 2H), 2.30 (m 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) 1.795 (m, 2H), 7.40-7.00 (m 6H), 6.40 (dt, 1H), 4.50 (s 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)		O.CH ₃		
phenyl) CH ₃ 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) 127 (aus 2-Difluor-methoxy- CH ₃ CH ₃ 2H), 1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m, 6H) (m, 6H) 7.95 (m, 2H), 7.40-7.00 (m, 6H), 6.40 (dt, 1H), 4.50 (s, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)	_			
(m, 6H) 127 (aus 2-Difluor-methoxy- (aus 2-CH ₃ (m, 6H) 14-NMR (200 MHz, CDCl ₃) 7.95 (m, 2H), 7.40-7.00 (m) 6H), 6.40 (dt, 1H), 4.50 (s) 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)		Q		
127 (aus 2-Difluor-methoxy- (aus 2-CH ₃ (aus 2-CH ₃ (aus 2-CH ₃ (aus 2-CH ₃ (aus 2-CH ₃ (aus 2-CH ₃ (b) (aus 2-CH ₃ (c) (au	phenyl)	CH ₃		
(aus 2-Difluor-methoxy- (aus 2-Difluor-methoxy- (aus 2-Difluor-methoxy- (aus 2-Difluor-O.CH ₃ (b) 7.95 (m, 2H), 7.40-7.00 (m) (aus 2-Difluor-O.CH ₃ (b) 7.95 (m, 2H), 7.40-7.00 (m) (b) 6.40 (dt, 1H), 4.50 (s) (c) 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) (d) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)				(m, 6H)
Difluor- meth- oxy- Difluor- O.CH ₃ 6H), 6.40 (dt, 1H), 4.50 (s 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)	127		51,0	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
meth- oxy- OCH ₃ 2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H) 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)	(aus 2-			7.95 (m, 2H), 7.40-7.00 (m,
oxy- CH ₃ 3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H)	Difluor-		ļ	6H), 6.40 (dt, 1H), 4.50 (s,
	meth-	F ^I F		2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H),
henzyl- 20 (m 2H) 190 (m 1H)	оху-	o CH,		3.30 (d, 2H), 2.60 (m, 2H),
2.30 (m, 211), 1.50 (m, 111)	benzyl-		ļ	2.30 (m, 2H), 1.90 (m, 1H),
bromid) 1.70-1.30 (m, 6H)	bromid)		-	1.70-1.30 (m, 6H)



Bsp.	Formel	Ausbeu-	Spektroskopische Daten
		te (%)	
128		63,9	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 2-			7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m,
Chlor-6-	H₃C.		5H), 4.60 (s, 2H), 4.00 (m,
meth-	H ₃ C		2H), 3.90 (s, 3H), 3.70 (s, 3H),
оху-			3.30 (m, 2H), 2.60 (m, 2H),
benzyl-	H ₃ C-O		2.30 (m, 2H), 1.90 (m, 1H),
bromid)	Ö ĊI		1.70-1.30 (m, 9H)
129		roh	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 3-	H₃C C		7.95 (m, 2H), 7.40-6.80 (m,
Fluor-			6H), 4.40 (s, 2H), 3.90 (s, 3H),
benzyl-			3.70 (s, 3H), 3.30 (d, 2H),
bromid)	H ₃ C.O		2.60 (m, 2H), 2.30 (m, 2H),
	Ö		1.90 (m, 1H), 1.70-1.30 (m,
			6H)

130: 6-(4-Carboxybenzyl)-7-{[2-(3-fluorphenyl)-1,3-benzothiazol-4-yl]methoxy}-heptansäure



Der Diester aus Bsp. 121 wird in 5 ml Methanol gelöst und mit 0,8 ml 45%iger Natronlauge versetzt. Bei Raumtemperatur werden 0,3 ml Dichlormethan hinzugegeben.



Nach 20 Stunden bei Raumtemperatur wird die Reaktionslösung einmal mit Ether gewaschen, mit 10%iger Schwefelsäure sauer gestellt, zweimal mit Essigester extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Extrelut filtriert und das Lösungsmittel im Vakuum eingedampft.

5 Ausbeute: 39,5 mg (38,5% d. Th.)

LC/MS: 522 (M+1), Rt=4.98 min

Analog werden die folgende Substanzen synthetisiert:

			·
Bsp.	Formel	Ausbeute	Spektroskopische Daten
		(%)	
131	Ŷ II	56,9	¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃): 9.90
(aus		-	(bs, 2H), 7.95 (m, 2H), 7.40-6.80
122)			(m, 7H), 4.50 (s, 2H), 3.20 (d, 2H),
			2.80 (m, 2H), 2.30 (m, 2H), 1.90-
	о́н		1.30 (m, 7H)
132		24,8	481 (M+1), Rt=4.53 min
(aus	OH		
123)			
	ОН		
133		43,7	439 (M+1), Rt=4.51 min
(aus			
124)		: i	
	бн		
134		27,9	427 (M+1), Rt=4.77 min
(aus	H ₃ C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		
125)	H ₃ C CH ₃		
123)	ОН		•

Dan	Formal	IA14-	[C-14-1-1-1-1-D-4
psp.	Formel	Ausbeute	Spektroskopische Daten
1	į	(%)	
125		J	
135		25,1	447 (M+1), Rt=4.71 min
(aus			
1			
126)	II A O A A OH		
1			
-			
ł	Óн		
136	Ŷ	21,1	437 (M+1), Rt=4.32 min
(aus	CHOO OH		
ı			
127)			
	ÓН		
137	ОН	24,5	449 (M+1), Rt=4.57 min
	O H ₃ C		
(aus			
128)			
	HO \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
	ÖĊI		
138		50,9	280 (M+1) D = 4.28 min
	E U I	50,9	389 (M+1), Rt=4.28 min
(aus	OH		
129)			
127)			
	ÓH		

LC/MS-Bedingungen: Säule: Symmetry C18 2,1x50 mm; Eluent: Acetonitril/Wasser; Gradient: 10% Acetonitril bis 90% Acetonitril; Fluss: 0,5 ml/min; Detektor: UV 210 nm.

139: 6-(4-Carboxybenzyl)-7-(4-methoxyphenoxy)heptansäure

16,8 mg (0,14 mmol) 4-Methoxyphenol werden unter Argon in Dimethylformamid gelöst und bei Raumtemperatur mit 7,5 mg (0,19 mmol) Natriumhydrid (60%ig ölige Suspension) versetzt. Nach 30 Minuten Rühren bei dieser Temperatur wird eine Lösung von 41,6 mg (0,10 mmol) 7-Brom-6-(4-ethoxycarbonylbenzyl)heptansäureethylester (herstellbar aus 6-Hydroxymethyl-7-(4-methoxycarbonylphenyl)heptansäuremethylester (Synthese vgl. EP-A-0 341 551, S. 31, Bsp. 42) durch Umsetzung mit Bromierungsmitteln wie PBr₃) in DMF zugegeben. Das Reaktionsgemisch wird auf 60°C erhitzt. Nach 18 Stunden werden erneut 20 mg Natriumhydrid zugegeben und auf 100°C erhitzt. Nach 20 Stunden wird die Mischung abgekühlt, mit Wasser versetzt und mit Essigester gewaschen. Die wässrige Phase wird mit 1N Salzsäure auf pH 2 gestellt und zweimal mit Essigester extrahiert. Die organische Phase wird

Ausbeute: 24 mg (59,6% d. Th.)

¹H-NMR (200 MHz, CDCl₃): 7,90 (m, 4H), 7,30 (m, 4H), 3,70 (s, 3H), 3,40 (m, 2H), 2,60 (m, 2H), 2,30 (m, 2H), 1,70-1,30 (m, 7H).

mit Magnesiumsulfat getrocknet und in Vakuum eingedampft.

15

10



Analog wurden folgende Verbindungen hergestellt:

Bsp.	Formel	Aushen	-Spektroskopische Daten
-F.		1	opekuoskopische Daten
		te (%)	
140	9	86,3	H-NMR (200 MHz
(aus 3-	F ₃ C O OH		CDCl ₃): 12.50 (bs, 2H).
Trifluor-			7.90-7.00 (m, 8H), 3.70
methyl-			(d, 2H), 2.80 (m, 2H),
phenol)	о н		2.30 (m, 2H), 1.70-1.30
			(m, 7H)
141	0	89,3	H-NMR (200 MHz,
(aus 2-	ОН		CDCl ₃): 11.10 (bs, 2H),
Benzyl-			7.90-6.70 (m, 13H), 5.10
oxy-			(s, 2H), 3.00 (m, 2H),
phenol)	Он		2.80-1.30 (m, 13H)
142		55,2	¹ H-NMR (200 MHz,
(aus 5-			CDCl ₃): 7.90-6.70 (m,
Phenyl-			13H), 4.10 (m, 2H), 3.80
pentyl-	ОН		(d, 2H), 5.10 (s, 2H),
оху-			2.80-1.30 (m, 19H)
phenol)		·	
	OH		

143: 7-Anilino-6-(4-methoxycarbonylbenzyl)heptansäuremethylester

30,0 mg (0,33 mmol) Anilin werden in Dichlormethan gelöst, 0,02 ml Essigsäure und eine Lösung aus 90,6 mg (0,30 mmol) 6-Formyl-7-(4-methoxycarbonylphenyl)-heptansäureethylester (Synthese vgl. EP-A-0 341 551, S. 32, Bsp. 44) in Dichlormethan wird zugeben. Nach 30 Minuten bei Raumtemperatur wird die Lösung auf 0°C abgekühlt und 87,7 mg (0,41 mmol) Natriumtriacetoxyborhydrid zugegeben. Die Reaktionmischung wird 18 Stunden bei Raumtemperatur gerührt, 0,2 ml Wasser werden zugegeben und über Extrelut filtriert. Die Substanz wurde zur Reinigung an 10 g Kieselgel 60 (Korngröße 0,040-0,063mm) mit Cyclohexan/ Essigester 3:1 bis

Ausbeute: 52 mg (45,9 % d. Th.)

1:1 als Eluenten chromatographiert.

¹H-NMR (200 MHz, CDCl₃): 7,95 (m, 2H), 7,20 (m, 4H), 6,70 (m, 2H), 6,50 (d, 1H), 3,90 (s, 3H), 3,70 (s, 3H), 3,60 (bs, 1H), 3,00 (m, 2H), 2,70 (d, 2H), 2,30 (m, 2H), 2,00 (m, 1H), 1,70-1,30 (m, 6H).



Analog wurden die folgenden Verbindungen erhalten:

Bsp.	Formel	Aus-	Spektroskopische Daten
		beute	
		(%)	
144	O II	17,4	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus	O CH3		7.95 (m, 2H), 7.30 (m, 7H),
Benzyl-	O CH		4.35 (q, J=6Hz, 2H), 4.10 (q,
amin)		(J=6Hz, 2H), 3.70 (s, 2H), 2.70
			(m, 4H), 2,50 (m, 2H), 2.30 (t,
			2H), 1.80 (m, 1H), 1.70-1.20
	·		(m, 12H)
145		93,4	¹ H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 2-	Д		7.95 (m, 2H), 7.20 (m, 7H),
(5-			6.70 (m, 2H), 6.50 (m, 2H),
Phenyl-			4.35 (q, J=6Hz, 2H), 4.20 (bs,
pentyl-	CH ₃		1H), 4.10 (q, J=6Hz, 2H), 3.90
oxy)-		K	(t, 2H), 3.10 (m, 2H), 2.70 (m,
anilin)		ŀ	4H), 2.30 (m, 2H), 2.00 (m,
			1H), 1.90-1.40 (m, 18H)
146	4	17,7	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃):
(aus 2-		ŀ	7.95 (m, 2H), 7.50-7.20 (m,
Benzyl-	DOCH3	-	7H), 6.80-6.50 (m, 4H), 5.00 (s,
оху-			2H), 4.35 (q, J=6Hz, 2H), 4.10
anilin)		(q, J=6Hz, 2H), 3.30 (bs, 1H),
		3	3.10 (m, 2H), 2.70 (m, 2H),
	CH₃	þ	2.30 (m, 2H), 2.00 (m, 1H),
]1	.60-1.40 (m, 12H)


147
(aus 2-Butyl-anilin)

H₃C

CH₃

S8,5 H-NMR (200 MHz, CDCl₃):
7.95 (m, 2H), 7.30 (m, 2H),
6.90 (m, 2H), 6.50 (m, 2H),
4.35 (q, J=6Hz, 2H), 4.10 (q,
J=6Hz, 2H), 3.70 (bs, 1H), 3.10
(m, 2H), 2.70 (m, 2H), 2.50 (m,
2H), 2.30 (m, 2H), 2.00 (m,
1H), 1.60-1.30 (m, 16H), 0.90
(t, 3H)

148: 7-Anilino-6-(4-carboxybenzyl)heptansäure



Die Substanz wird analog Beispiel 130 durch Verseifung des Esters aus Bsp. 143 hergestellt.

Ausbeute: 30,5 mg (74,8 d. Th.)

10 LC/MS: 356 (M+1), R 3,9 min

Analog wurden die folgenden Verbindungen erhalten:

Bsp.	Formel	Ausbeu	Spektroskopische Daten
		te (%)	
149	Ŷ I	17,4	H-NMR (400 MHz, d ⁶ -
(aus	N OH		DMSO): 7.95 (m, 2H), 7.20 (m,
144)			7H), 3.60 (bs, 1H), 3.20 (m,
	ОН		4H), 2.70-1.20 (m, 15H)
150	Ŷ Ŷ	59,9	H-NMR (200 MHz,
(aus	ОН		CDCOCD ₃): 10.80 (bs, 2H),
145)			7.95 (m, 2H), 7.30 (m, 2H),
	OH		7.10 (m, 5H), 6.70 (m, 2H),
	υ λ	1	6.50 (m, 2H), 3.90 (t, 2H), 3.10
			(m, 2H), 2.80 (m, 3H), 2.60 (m,
			2H), 2.30 (m, 2H), 2.00 (m,
			1H), 1.90-1.40 (m, 12H)
151		83,3	¹ H-NMR (200 MHz,
(aus			CDCOCD ₃): 10.60 (bs, 2H),
146)	N OH		7.95 (m, 2H), 7.50-7.20 (m,
	O H O OH		7H), 6.80 (m, 2H), 6.50 (m,
			2H), 5.10 (s, 2H), 3.10 (m, 2H),
	Он		2.80 (m, 3H), 2.30 (m, 2H),
			2.00 (m, 1H), 1.60-1.40 (m, 6H)

10

Bsp.	Formel	Ausbeu-	-Spektroskopische Daten
		te (%)	
152		71,4	H-NMR (200 MHz
(aus	N NON OH		CDCOCD ₃): 10.60 (bs, 2H)
147)	H C		7.95 (m, 2H), 7.30 (m, 2H)
	H ₃ C		6.90 (m, 2H), 6.50 (m, 2H)
	. Он		3.10 (m, 2H), 2.80 (m, 3H)
			2.50 (m, 2H), 2.30 (m, 2H)
			2.00 (m, 1H), 1.60-1.30 (m
			10H), 0.90 (t, 3H)

153: Methyl 4-((E/Z)-2-{2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)(methyl)amino]ethyl}-4-{2-[(5phenylpentyl)oxy]phenyl}-3-butenyl)benzoat

0,532 g (0,89 mmol) Triphenyl{2-[(5-phenylpentyl)oxy]benzyl}phosphoniumbromid (herstellbar analog Bsp. IId bis IVd mit 5-Phenylpentylbromid statt Butylbromid) werden in 10 ml THF suspendiert und bei -20°C mit 0,671 ml einer 1,6 M n-Butyllithiumlösung in n-Hexan versetzt. Man rührt 30 Minuten bei -20°C, woraufhin 0.300 g (0.89 mmol) Methyl 4-{4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)(methyl)amino]-2-formylbutyl}benzoat aus Bsp.XI, gelöst in 3 ml THF, zugesetzt werden. Man rührt 1 Stunde bei -20°C nach, setzt 20 ml Wasser zu und extrahiert mehrfach mit Ethylacetat. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen,

über Magnesiumsulfat getrocknet, und das Solvens wird unter vermindertem Druck abdestilliert.

Ausbeute: 192,1 mg (37,1 % der Theorie) E/Z Gemisch (85:15)

¹H-NMR (300 MHz, d⁶-DMSO): δ = 1,15 (t), 1,2-1,7 (m), 2,20 (s), 2,55 (t), 2,70 (m), 2,85 (m) 3,20 (s), 3,80 (s), 3,90 (m), 4,05 (q), 5,75 (s), 6,05 (dd), 6,35 (d), 6,90 (dd)7,1-7,4 (m), 7,85 (d).

154: 4-((E/Z)-2-{2-[(Carboxymethyl)(methyl)amino]ethyl}-4-{2-[(5-phenylpentyl)-oxy]phenyl}-3- butenyl)benzoesäure

5

15

20

130 mg (0.230 mmol) Methyl-4-((E/Z)-2-{2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)(methyl)-amino]ethyl}-4-{2-[(5-phenylpentyl)oxy]phenyl}-3-butenyl)benzoat aus Bsp. 153 werden in 5 ml Methanol bei 0°C mit 1,2 ml 45 %-iger Natronlauge versetzt. Nach Erwärmen auf 22°C wird soviel Methylenchlorid zugesetzt, dass eine klare Lösung entsteht, und 18 Stunden nachgerührt. Die alkalische Lösung wird mit Wasser verdünnt und mit Methylenchlorid extrahiert. Hieraufhin wird die wässrige Pase zweimal mit 2N HCl auf pH 2-3 gestellt und mehrfach mit Methylenchlorid extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert.

Ausbeute: 55,9 mg (45,1% der Theorie) E/Z Gemisch (85:15)

5

10

15

¹H-NMR (300 MHz, d⁶-DMSO): δ = 1,05(d), 1,40 (m), 1,65 (m), 2,55 (m), 2,80 (m), 3,0 (m), 3,20 (s), 3,85 (m), 3,50 (s), 3,90 (m), 6,03 (dd), 6,45 (d), 6,90 (dd), 7,1-7,4 (m), 7,85 (d).

155: 4-((E/Z)-2-{2-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]ethyl}-4-{2-[(5-phenylpentyl)-oxy]phenyl}-3-butenyl)benzoat

41,078 mg (1,03 mmol) Natriumhydrid (80%ig) werden in 5 ml THF vorgelegt und mit 104,32 mg (0.93 mmol) Mercaptoessigsäuremethylester versetzt. Nach 10 Minuten werden 500,0 mg (0.930 mmol) Methyl-4-((E/Z)-2-(2-bromoethyl)-4-{2-[(5-phenylpentyl)oxy]phenyl}-3-butenyl)benzoat aus Bsp. IX, gelöst in 2 ml THF, zugesetzt und 18 Stunden bei 22 °C nachgerührt. Das Reaktionsgemisch wird vorsichtig mit 20 ml Wasser versetzt und mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert. Die Reinigung erfolgt an Kieselgel (0,04-0,063 nm) mit Methylenchlorid als Laufmittel.

Ausbeute: 300,10 mg (57,3 % der Theorie) E/Z-Gemisch (85:15)

¹H-NMR (300 MHz, d⁶-DMSO): δ = 1,40 (m), 1,65 (m), 7,26 (t), 2,70 (m), 2,85 (m), 3,55 (s), 3,80 (s), 3,9 (m), 6,0 (dd), 6,45 (dd), 6,90 (dd), 7,1-7,4 (m), 7,85 (d).

156: Methyl4-((E/Z)-2-{2-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]ethyl}-4-{2-[(5-phenyl-pentyl)oxy]phenyl}-3-butenyl)benzoat

5

200,0 mg (0,34 mmol) Methyl-4-((E/Z)-2-(2-iodoethyl)-4-{2-[(5-phenylpentyl)-oxy]phenyl}-3-butenyl)benzoat aus Bsp. X, 43,107 mg (0,34 mmol) Glycinmethylesterhydrochlorid, 4,195 mg (0,03 mmol) 4-Dimethylaminopyridin und 0,50 ml Triethylamin werden in 2,0 ml Ethanol 48 Stunden unter Rückfluss erhitzt. Die Reaktionsmischung wird mit Wasser versetzt und mit Methylenchlorid extrahiert. Die organische Phase wird mit gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert. Der Rückstand wird an Kieselgel (0,04-0,063 nm) mit Methylenchlorid/Methanol 100:2 chromatographiert.

15

10

Ausbeute: 48,00 mg (25.7 % der Theorie) E/Z-Gemisch (85:15).

¹H-NMR (300 MHz, d⁶-DMSO): δ = 1,10 (t), 1,40 (m), 1,65 (m), 2,60 (m), 2,70 (m), 2,85 (m), 3,80 (s), 3,90 (m), 4,05 (q), 6,05 (dd), 6,35 (d), 6,85 (dd), 7,1-7,4 (m), 7,85 (d).

5

10

15

157: 4-((E/Z)-2-{2-[(Carboxymethyl)amino]ethyl}-4-{2-[(5-phenylpentyl)oxy]-phenyl}-3-butenyl)benzoesäure

40,40 mg (0,070 mmol) Methyl-4-((E/Z)-2-{2-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-ethyl}-4-{2-[(5-phenylpentyl)oxy]phenyl}-3-butenyl)benzoat aus Bsp. 156 werden in 1,50 ml Methylenchlorid gelöst, mit 23,30 mg (0,16 mmol) Kaliumtrimethylsilanolat versetzt und 18 Stunden bei 22 °C nachgerührt. Die Lösung wird mit Wasser versetzt, mit 2N HCl auf pH 2 gestellt und mit Methylenchlorid/Methanol 2:1 extrahiert. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel im Vakuum entfernt.

Ausbeute: 34,60 mg (86,3 % der Theorie) E/Z-Gemisch (85:15). ¹H-NMR (300 MHz, d⁶-DMSO): δ = 1,10 (t), 1,40 (m), 1,65 (m), 2,60 (m), 2,70 (m), 2,85 (m), 3,90 (m), 6,05 (dd), 6,35 (d), 6,85 (dd), 7,1-7,4 (m), 7,85 (d).

Analog der Beispiele 153 bis 157 wurden die folgenden Substanzen erhalten:

Bsp.	Formel	¹ H-NMR (d ⁶ -DMSO, 200 MHz)
161		1.10 (t), 1.40 (m), 1.65 (m), 2.60 (m),
(aus IX	О ро-сн,	2.70 (m), 2.85 (m), 3.80 (s), 3.90 (m),
und N-		4.05 (q), 4.45 (s) 6.05 (dd), 6.35 (d),
Benzyl-	he he	6.85 (dd), 7.1-7.4 (m), 7.85 (d).
glycin-		
ethyl-		
ester)		
162	ОСН3ОСН3	1.12 (t), 1.3-1.8 (m), 2.60 - 2.90 (m),
(aus IX		2.85 (m), 3.80 (s), 4.00 (m), 4.05 (q),
und 2-		6.00 (dd), 6.35 (d), 6.85 (dd), 7.1-7.4
Ethoxy-		(m), 7.85 (d).
carbonyl-		
piperidin)		
163	Он Л	1.40 (m), 1.65 (m), 2.6-2.8 (m), 3.75
(aus 161)		(s), 3.9 (m), 6.00 (dd), 6.35 (d), 6.85
	но	(dd), 7.1-7.3 (m), 7.83 (d)
164	OH O	1.40 (m), 1.65 (m), 2.6-2.8 (m), 3.53
(aus 155)		(s), 3.9 (m), 6.00 (dd), 6.35 (d), 6.85
	но	(dd), 7.1-7.3 (m), 7.83 (d), 12.5 (br.s)
165	сн,	1.12 (t), 1.3-1.8 (m), 2.60 - 2.90 (m),
(aus IX	O-CH ₃	2.85 (m), 3.80 (s), 4.00 (m), 4.05 (q),
und 3-		6.00 (dd), 6.35 (d), 6.85 (dd), 7.1-7.4
Ethoxy-		(m), 7.85 (d).
carbonyl-		
piperidin)		
L		


Bsp.	Formel	¹ H-NMR (d ⁶ -DMSO, 200 MHz)
166	H,C O-CH,	1.4 (m), 1.5-2.0 (m), 2.4 (m), 2.60 -
(aus IX		2.90 (m), 3.70 (s), 3.85 (s), 4.00 (m),
und 4-		4.30 (m), 6.00 (dd), 6.35 (d), 6.85
Meth-		(dd), 7.1-7.4 (m), 7.6-7.9 (m).
oxycar-		
bonyl-		
imidazol)		
167	O OH OH	1.3-1.8 (m), 2.60 - 2.90 (m), 4.00 (m),
(aus 162)		6.00 (dd), 6.35 (d), 6.85 (dd), 7.1-7.4
		(m), 7.86 (m).
168	HO OH OH	1.3-1.8 (m), 2.60 - 2.90 (m), 3.9-4.0
(aus IX		(m), 6.00 (dd), 6.35 (d), 6.85 (dd),
und L-(-)-		7.1-7.4 (m), 7.85 (d), 12.5 (br.s).
prolin-		
methyl-		
ester, an-		
schlies-		
send Hy-		
drolyse		
analog		
Bspl. 154		
169	o=OH	1.3-1.8 (m), 2.0-2.5 (m), 2.60 - 2.90
(aus 165)		(m), 3.9-4.0 (m), 6.00 (dd), 6.35 (d),
		6.85 (dd), 7.1-7.4 (m), 7.85 (d), 12.5
		(br.s).





Bsp.	Formel	¹ H-NMR (d ⁶ -DMSO, 200 MHz)
170	он Дон	1.4 (m), 1.5-2.0 (m), 2.4 (m), 2.60 -
(aus 166)		2.90 (m), 3.70 (s), 3.85 (s), 4.00 (m),
		4.30 (m), 6.00 (dd), 6.35 (d), 6.85
		(dd), 7.1-7.4 (m), 7.6-7.9 (m).

Bsp. 171: 6-(4-Methoxycarbonylphenoxy)-8(2-(4-cyclohexylbenzyloxy)phenyl)-octansäuremethylester



Die Synthese dieser Verbindung erfolgte analog Bsp. 47 aus der Verbindung aus Bsp. XII und 4-Cyclohexylbenzylchlorid.

Ausbeute: 81,1%

¹H NMR (200 MHz, CDCl₃): $\delta = 1.14 - 2.08$ (m, 20H), 2.39 - 2.97 (m, 3H), 3.63 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 4.29 (quint, J = 5.8 Hz, 1H), 5.00 (s, 2H), 6.68 - 6.97 (m, 4H), 7.03 - 7.37 (m, 6H), 7.89 (d, J = 8.7 Hz, 2H).




Analog wurde hergestellt:

Bsp.	Struktur	Aus-	H-NMR (200 MHz, CDCl ₃)
		beute	
		(%)	
172	Ŷ	73.2	$\delta = 1.11 - 1.77$ (m, 5H), 1.85 –
(aus XII und		}	2.09 (m, 2H), 2.26 (t, $J = 7.2$
4-(4-Tri-			Hz, 2H), 2.61 – 2.91 (m, 2H),
fluormethyl-			3.62 (s, 3H), 3.85 (s, 3H), 4.30
phenoxy)-	F. DO		(quint, $J = 5.7$ Hz, 5.02 (s, $2H$),
benzyl-	FF		6.76 (d, <i>J</i> = 8.9 Hz, 2H), 6.91 (d,
chlorid			J = 7.8 Hz, 2H), 6.98 – 7.29 (m,
			6H), 7.40 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H),
			7.58 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 7.88
			(d, J = 8.9 Hz, 2H).

Bsp. 173: 6-(4-Carboxyphenoxy)-8(2-(4-cyclohexylbenzyloxy)phenyl)-octansäure

5



Die Synthese dieser Verbindung erfolgte analog Bsp. 19 aus der Verbindung aus Bsp. 171.

10 Ausbeute: 68,5%

¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): $\delta = 1.18 - 2.08$ (m, 20H), 2.31 (t, J = 7.3 Hz, 2H)2.44 - 2.57 (m, 1H). 2.64 - 2.76 (m, 1H), 2.76 - 2.88 (m, 1H), 4.33 (quint, J = 5.8 Hz, 1H),

4.99 (s, 2H), 6.79 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.82 - 6.94 (m, 2H), 7.05 - 7.34 (m, 6H), 7.94 (d, J = 8.8 Hz, 2H).

Analog wurde hergestellt:

Bsp.	Struktur	Aus-	H NMR (200 MHz, CDCl ₃)
		beute	
		(%)	
174	ОН	75,5	H NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ
(aus 172)	F F F	•	= 1.17 – 2.10 (m, 10H), 2.31 (t,
			J = 7.1 Hz, 2H), $2.68 - 2.89$ (m,
			2H), 4.33 (quint, $J = 5.6$ Hz,
			1H), 5.00 (d, $J = 11.8$ Hz, 1H),
			5.04 (d, $J = 11.8$ Hz, 1H), 6.78
			(d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.86 - 6.94
			(m, 2H), 6.99 – 7.21 (m, 6H),
			7.39 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 7.56
			(d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 7.92 (d, $J =$
			8.8 Hz, 2H).



Patentansprüche

5

10

15

20

25

- Verwendung von Verbindungen, welche auch in der Lage sind, die lösliche Guanylatcyclase unabhängig von der im Enzym befindlichen Häm-Gruppe zu stimulieren, zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Angina pectoris, Ischämien und Herzinsuffizienz.
- Verwendung von Verbindungen, welche auch in der Lage sind, die lösliche Guanylateyelase unabhängig von der im Enzym befindlichen Häm-Gruppe zu stimulieren, zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von thromboembolischen Erkrankungen, Arteriosklerose, Hypertonie und venösen Erkrankungen.
- 3. Verbindungen der allgemeinen Formel (I)

worin

- B Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet,
- r 0 oder 1 bedeutet,

V fehlt, O, NR⁴, NR⁴CONR⁴, NR⁴CO, NR⁴SO₂, COO, CONR⁴ oder S(O)_o bedeutet,

Q

worin

R⁴

5

unabhängig von einem weiteren gegebenenfalls vorhandenen Rest R⁴ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder Arylalkyl mit 7 bis 18 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Alkyl, Alkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

10

o 0, 1 oder 2 bedeutet,

15

fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkindiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine oder mehrere Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CO, OCO, S-CO-, CONR⁵ oder NR⁵SO₂ enthalten können, und ein oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein können, wobei gegebenenfalls zwei beliebige Atome der vorstehenden Kette unter Bildung eines drei- bis achtgliedrigen Rings miteinander verbunden sein können, oder CONR⁵ bedeutet,

20

worin

25

R⁵ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, das durch Halogen oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

30

p 0, 1 oder 2 bedeutet,

Y Wasserstoff, NR⁶R⁷, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, die auch über N gebunden sein können,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Halogen, Hydroxy, COR⁸, CN, SR⁸, NO₂, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹², NR⁹CONR⁹R¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

worin

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

R⁸ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

5

15

20

R9 Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet.

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradket-

tiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweig-

tes Alkenyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis

10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus

mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen

aus der Reihe S, N und/oder O, Arylalkyl mit 8 bis 18

Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffa-

5

10

15



worin

R10, R11, R13 und R14

25

 R^{15} geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet.

30

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, CN, NO2, Alkyl, Alkoxy, Halo-

tomen oder einen Rest der Formel SO₂R¹⁵ bedeuten, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO2, NH2, NHCOR9, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Koh-

oder zwei Substituenten aus R10 und R11 oder R13 und R14 miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Rings verbunden sein können, der O oder N enthalten kann.

lenstoffatomen substituiert sein kann.

genalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

5

 R^{12}

N gebunden sein können,

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können:

10

15

20



25

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, NR⁹, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem oder verzweigtem Alkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Sulfonylalkyl, geradkettigem oder verzweitem Thioalkyl mit jeweils bis 8 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 6

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Aryl mit

6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen

aus der Reihe S, N und/oder O substituiert sein können, die auch über

Kohlenstoffatomen, Halogen, SR8, CN, NO2, NR17R18, CONR17R18oder NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können,

worin

5

 R^{16}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO2, NH2, NHCOR9, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

15

20

 R^{20}

worin

geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

25

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO2, NH2, NHCOR9, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

und

5

10

15

20



25

deutet,

R²¹ und R²²

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffato-

R¹⁹

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

R³ Wasserstoff, Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, OH, CN, NO₂ oder NR²¹R²² be-

.

worin

men, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuten,

W geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 6 Kohlenstoffatomen, die eine Gruppe aus O, S(O)_q, NR²³, CO oder CONR²³ enthalten können, oder O oder S bedeutet,

worin

q 0, 1 oder 2 bedeutet,

R²³ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

U geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

A fehlt, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet,

welche gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, Halogenalkoxy oder Alkoxycarbonyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, CN, NO₂ oder NR²⁴R²⁵ substituiert sein können,

worin

5

10

15



25

 R^{24} und R^{25}

jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Carbonylalkyl oder Sulfonylalkyl bedeuten,

R² CN, Tetrazolyl, COOR²⁶ oder CONR²⁷R²⁸ bedeutet,

worin

 R^{26}

Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet;

 R^{27} und R^{28}

jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO_2R^{29} bedeuten,

oder R²⁷ und R²⁸ zusammen ein fünf- oder sechsgliedrigen Ring bilden, der N oder O enthalten kann,

worin

R²⁹ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

5

15

20

25

5

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, CN, NO₂, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

10

X geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 12 Kohlenstoffatomen bedeutet, das eine Gruppe aus O, S(O)_r, NR³⁰, CO oder CONR³¹, oder einen drei- bis achtgliedrigen gesättigten oder ungesättigten Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O)_r, NR³² und/oder O sowie gegebenenfalls einem oder mehreren Substituenten enthalten kann,

15

worin

20

r 0, 1 oder 2 bedeutet,

9

R³⁰ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder geradkettiges oder verzweigtes Arylalkyl mit 7 bis 15 Kohlenstoffatomen bedeutet,

25

R³¹ Wasserstoff, Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, CN, NO₂ oder NR³³R³⁴ bedeutet,

30

worin

5

 R^{33} und R^{34}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuten,

10

R³² Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

 R^{I}

CN, Tetrazolyl, COOR³⁵ oder CONR³⁶R³⁷ bedeutet,

worin

15

 R^{35}

Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet;

20

)

 R^{36} und R^{37}

jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO_2R^{38} bedeuten,

25

worin

30

R³⁸ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet, mit der Maßgabe, dass Y nicht Phenyl oder ausschließlich mit einem oder

zwei Resten aus der Gruppe, bestehend aus geradkettigem oder verzweigtem

Alkyl oder geradkettigem oder verzweigtem Alkoxy mit jeweils bis zu 12

Kohlenstoffatomen, Halogen, CF₃, OCF₃ oder CN, substituiertes Phenyl sein

kann, wenn gleichzeitig B Phenyl ist, V fehlt oder O bedeutet, Q geradkettiges Alkylen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet und gegebenenfalls

über ein Sauerstoffatom mit Y verknüpft ist, W eine Alkylengruppe oder eine

Alkendiylgruppe mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist, U eine Alkylen-

gruppe mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ ist, A Phenyl ist und X geradkettiges Alkylen mit 1 bis 11 Kohlenstoffatomen ist und gegebe-

nenfalls direkt über O, S, SO oder SO₂ an das die Gruppen W und U tragende

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, CN, NO₂, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

5

10

15

20

sowie deren Stereoisomere und Salze.

Kohlenstoffatom gebunden ist;

4. Verbindungen nach Anspruch 3,

worin

25

B Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

und die anderen Substituenten wie in Anspruch 3 definiert sind.

5. Verbindungen nach Anspruch 3,

worin

B einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet,

und die anderen Substituenten wie in Anspruch 3 definiert sind.

6. Verbindungen nach Anspruch 4,

worin

r 0 oder 1 bedeutet,

V fehlt, O, NR⁴, NR⁴CONR⁴, NR⁴CO, NR⁴SO₂, COO, CONR⁴ oder

S(O)_o bedeutet,

worin

R⁴

unabhängig von einem weiteren gegebenenfalls vorhandenen Rest R⁴ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder Arylalkyl mit 7 bis 18 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Alkyl, Alkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

o 0, 1 oder 2 bedeutet,

25

10

15

20

Q fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkindiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine oder mehrere Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CO, OCO, S-CO-, CONR⁵ oder NR⁵SO₂ enthalten können, und ein oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein können, wobei gegebenenfalls zwei beliebige Atome der vorstehenden Kette unter Bildung eines drei- bis achtgliedrigen Rings miteinander verbunden sein können, oder CONR⁵ bedeutet,

worin

R⁵ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, das durch Halogen oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

p 0, 1 oder 2 bedeutet,

Wasserstoff, NR⁶R⁷, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, die auch über N gebunden sein können,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder ve

5

15

20

Y

25

lenstoffatomen, Halogen, Hydroxy, COR8, CN, SR8, NO2, NR10R11, NR⁹COR¹², NR⁹CONR⁹R¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

worin

5

10

15

20

25

30

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

R⁸ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

R9 Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

R¹⁰, R¹¹, R¹³ und R¹⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O, Arylalkyl mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO, R15 bedeuten,

> wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO2, NH2, NHCOR9, Alkyl, Al

koxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

oder zwei Substituenten aus R¹⁰ und R¹¹ oder R¹³ und R¹⁴ miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Rings verbunden sein können, der O oder N enthalten kann,

worin

 R^{12}

R¹⁵ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, CN, NO₂, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten He-

5

 \bigcirc 10

15



25

terocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O substituiert sein können, die auch über N gebunden sein können,

5

10

15

20



25

30

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, NR⁹, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem oder verzweigtem Alkendiyl, geradkettigem oder verzweigtem Alkoxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Sulfonylalkyl, geradkettigem oder verzweigtem Thioalkyl mit jeweils bis 8 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy, Carbonylalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Halogen, SR8, CN, NO2, NR17R18, CONR17R18oder NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können,

 R^{16}

worin

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH2, NHCOR9, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

worin

5

R²⁰ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu
4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10
Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

15

und

20

 R^{19}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

25

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aro-

 \mathbb{R}^3

matischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

5

Wasserstoff, OH, Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

W geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine Gruppe aus O oder NR²³ enthalten können,

worin

15

R²³ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

20

U geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

A fehlt, Phenyl oder einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet,

25

welche gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein können,

X

R² COOR²⁶ oder CN bedeutet,

worin

5

R²⁶ Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen bedeutet;

10

geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine Gruppe aus O, S(O), NR³⁰, oder einen drei- bis sechsgliedrigen gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls einen oder mehrere geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen aufweisenden Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O), NR³² und/oder O enthalten können,

15 ·

worin

20

0, 1 oder 2 bedeutet,

9

R³⁰ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder Arylalkyl mit 7 bis 12 Kohlenstoffatomen bedeutet,

25

R³² Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

30

R¹ CN oder COOR³⁵ bedeutet,

worin

R³⁵ Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeutet;

5

mit der Maßgabe, dass Y nicht Phenyl oder ausschließlich mit einem oder zwei Resten aus der Gruppe, bestehend aus geradkettigem oder verzweigtem Alkyl oder geradkettigem oder verzweigtem Alkoxy mit jeweils bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Halogen, CF₃, OCF₃ oder CN, substituiertes Phenyl sein kann, wenn gleichzeitig B Phenyl ist, V fehlt oder O bedeutet, Q geradkettiges Alkylen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet und gegebenenfalls über ein Sauerstoffatom mit Y verknüpft ist, W eine Alkylengruppe oder eine Alkendiylgruppe mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist, U eine Alkylengruppe mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ ist, A Phenyl ist und X geradkettiges Alkylen mit 1 bis 11 Kohlenstoffatomen ist und gegebenenfalls direkt über O, S, SO oder SO₂ an das die Gruppen W und U tragende Kohlenstoffatom gebunden ist;

15

10

7. Verbindungen nach Anspruch 4,

20

worin

8

- B Phenyl oder Naphthyl bedeutet
- r 0 oder 1 bedeutet,

25

V fehlt oder O, NR⁴ oder S(O)_n bedeutet

worin

30

 R^4

Wasserstoff bedeutet,

n 0 bedeutet,

Q fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkindiyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkindiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine oder mehrere Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CONR⁵, S-CO- oder OCO enthalten können, und ein- oder zweifach durch Halogen oder Hydroxy substituiert sein kann, oder CONR⁵ bedeutet,

worin


R⁵ Wasserstoff bedeutet,

p 0 oder 1 bedeutet,

Y Wasserstoff, NR⁶R⁷, Phenyl, Napthyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe

10

5



bedeutet,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, NO₂, COR⁸, SR⁸, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

worin

5

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

5

R⁸ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

R⁹ Wasserstoff, oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

15

R¹⁰, R¹¹, R¹³ und R¹⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeuten,

20

wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n- Propyl, i-Propyl, n- Butyl, s- Butyl, i- Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann,

25

oder zwei Substituenten aus R¹⁰ und R¹¹ oder R¹³ und R¹⁴ miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Ring verbunden sein können, der durch O oder N unterbrochen sein kann,

R¹²


Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeutet,

30

wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl,

i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann;

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Phenyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe



substituiert sein können,

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem oder verzweigtem Alkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Sulfonylalkyl, geradkettigem oder verzweigtem Thioalkyl mit jeweils bis 4 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 4

5



Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, NR¹⁷R¹⁸ oder NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können,

worin

5

 R^{16}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Phenyl, wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann, oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten,

15

20

worin

R²⁰ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu
 4 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

25

und

R19

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und

bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein können;

10

5

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

15

R³ Wasserstoff, OH, F, Cl, Br, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

20

W CH₂CH₂, CH=CH, CH₂O, OCH₂, CH₂OCH₂, CH₂NH, NHCH₂ oder CH₂NHCH₂ bedeutet,

U

geradkettiges Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

25

A fehlt oder Phenyl, Pyridyl, Thienyl oder Thiazolyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, CF₃, Methoxy, Ethoxy, F, Cl, Br substituiert sein kann,

X

R² COOR²⁶ oder CN bedeutet,

worin

5

R²⁶ Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet;

10

geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, das eine Gruppe aus O, S(O)_r, NR³⁰, oder einen drei- bis sechsgliedrigen gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls einen oder mehrere geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen aufweisenden Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O)_r, NR³² und/oder O enthalten kann,

15

worin

r

0, 1 oder 2 bedeutet,

20

R³⁰ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6
 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder Benzyl bedeutet,

25

R³² Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

R¹ CN oder COOR³⁵ bedeutet,

worin

R³⁵ Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeutet;

mit der Maßgabe, dass Y nicht Phenyl oder ausschließlich mit einem oder zwei Resten aus der Gruppe, bestehend aus geradkettigem oder verzweigtem Alkyl oder geradkettigem oder verzweigtem Alkoxy mit jeweils bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Halogen, CF₃, OCF₃ oder CN, substituiertes Phenyl sein kann, wenn gleichzeitig V fehlt oder O bedeutet, Q geradkettiges Alkylen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet und gegebenenfalls über ein Sauerstoffatom mit Y verknüpft ist, W eine Alkylengruppe oder eine Alkendiylgruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist, U eine Alkylengruppe mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ ist, A Phenyl ist und X geradkettiges Alkylen mit 1 bis 11 Kohlenstoffatomen ist und gegebenenfalls direkt über O, S, SO oder SO₂ an das die Gruppen W und U tragende Kohlenstoffatom gebunden ist;

8. Verbindungen nach Anspruch 4,

worin

B Phènyl oder Naphthyl bedeutet

r 0 oder 1 bedeutet,

V fehlt oder O, NR⁴ oder S(O)_n bedeutet

worin

R⁴ Wasserstoff bedeutet,

n \ 0 bedeutet,

10

5

15

20

25

Q fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkindiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine oder mehrere Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CONR⁵, S-CO- oder OCO enthalten können, und ein- oder zweifach durch Halogen oder Hydroxy substituiert sein kann, oder CONR⁵ bedeutet,

worin

10


5

R⁵ Wasserstoff bedeutet,

p 0 oder 1 bedeutet,

15

Y Wasserstoff, NR⁶R⁷, Phenyl, Napthyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe



bedeutet,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, NO₂, COR⁸, SR⁸, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

worin

5

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

5

R⁸ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

R⁹ Wasserstoff, oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

15

R¹⁰, R¹¹, R¹³ und R¹⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeuten,

20

wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n- Propyl, i-Propyl, n- Butyl, s- Butyl, i- Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann,

25

oder zwei Substituenten aus R¹⁰ und R¹¹ oder R¹³ und R¹⁴ miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Ring verbunden sein können, der durch O oder N unterbrochen sein kann,

 R^{12}


Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeutet,

30

wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl,

i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann;

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Phenyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe



substituiert sein können,

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem oder verzweigtem Alkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Sulfonylalkyl, geradkettigem oder verzweigtem Thioalkyl mit jeweils bis 4 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 4

10

5

Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, NR¹⁷R¹⁸ oder NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können,

worin

5

 R^{16}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Phenyl, wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann, oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten,

15

20

worin

R²⁰ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu
4 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

25

und

 R^{19}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und

bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein können;

10

5

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

15

R³ Wasserstoff, OH, F, Cl, Br, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

20

W CH₂CH₂, CH=CH, CH₂O, OCH₂, CH₂OCH₂, CH₂NH, NHCH₂ oder CH₂NHCH₂ bedeutet,

U

geradkettiges Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

25

A fehlt oder Phenyl, Pyridyl, Thienyl oder Thiazolyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, CF₃, Methoxy, Ethoxy, F, Cl, Br substituiert sein kann,

X

R² COOH bedeutet,

geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, das eine Gruppe aus O, S(O), NR³⁰, oder einen drei- bis sechsgliedrigen gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls einen oder mehrere geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen aufweisenden Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O), NR³² und/oder O enthalten kann,

worin

r 0, 1 oder 2 bedeutet,

R³⁰ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6
 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder Benzyl bedeutet,

R³² Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

R¹ COOH bedeutet,

mit der Maßgabe, dass Y nicht Phenyl oder ausschließlich mit einem oder zwei Resten aus der Gruppe, bestehend aus geradkettigem oder verzweigtem Alkyl oder geradkettigem oder verzweigtem Alkoxy mit jeweils bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Halogen, CF₃, OCF₃ oder CN, substituiertes Phenyl sein kann, wenn gleichzeitig V fehlt oder O bedeutet, Q geradkettiges Alkylen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet und gegebenenfalls über ein Sauerstoffatom mit Y verknüpft ist, W eine Alkylengruppe oder eine Alkendiylgruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist, U eine Alkylengruppe mit bis zu 4 Koh-

10

5

15

20

30

lenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ ist, A Phenyl ist und X geradkettiges Alkylen mit 1 bis 11 Kohlenstoffatomen ist und gegebenenfalls direkt über O, S, SO oder SO₂ an das die Gruppen W und U tragende Kohlenstoffatom gebunden ist;

5

- 9. Verbindungen nach Anspruch 5,
 - r 0 oder 1 bedeutet,

10

V fehlt, O, NR⁴, NR⁴CONR⁴, NR⁴CO, NR⁴SO₂, COO, CONR⁴ oder S(O)_o bedeutet,

worin

15

R⁴ unabhängig von einem weiteren gegebenenfalls vorhandenen Rest R⁴ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder Arylalkyl mit 7 bis 18 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Alkyl, Alkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

20

0, 1 oder 2 bedeutet,

25

queigles Alkendiyl oder geradkettiges oder verzweigles Alkindiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine oder mehrere Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CO, OCO, S-CO-, CONR⁵ oder NR⁵SO₂ enthalten können, und ein oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein können,

Y

wobei gegebenenfalls zwei beliebige Atome der vorstehenden Kette unter Bildung eines drei- bis achtgliedrigen Rings miteinander verbunden sein können, oder CONR⁵ bedeutet, worin

5

R⁵ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, das durch Halogen oder Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

10

p 0, 1 oder 2 bedeutet,

15

Wasserstoff, NR⁶R⁷, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, die auch über N gebunden sein können,

20

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Halogen, Hydroxy, COR⁸, CN, SR⁸, NO₂, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹², NR⁹CONR⁹R¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

25

worin

30

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Al-

R8

koxy, geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

5

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

R⁹ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

15

R¹⁰, R¹¹, R¹³ und R¹⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O, Arylalkyl mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R¹⁵ bedeuten,

20

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

25

oder zwei Substituenten aus R¹⁰ und R¹¹ oder R¹³ und R¹⁴ miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Rings verbunden sein können, der O oder N enthalten kann,

worin

 R^{12}

R¹⁵ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, CN, NO₂, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O substituiert sein können, die auch über N gebunden sein können,

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, NR⁹, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem oder verzweigtem Alkyl-

5

10

15

20

25

oxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Sulfonylalkyl, geradkettigem oder verzweigtem Thioalkyl mit jeweils bis 8 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy, Carbonylalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Halogen, SR⁸, CN, NO₂, NR¹⁷R¹⁸, CONR¹⁷R¹⁸oder NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können,

10

5

worin

 R^{16}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

15

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten, wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann,

25

20

worin

 R^{20}

geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet,

wobei der Arylrest seinerseits ein- oder mehrfach durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂,
NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder
Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen
substituiert sein kann,

und

 R^{19}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch Halogen, Hydroxy, CN, NO₂, NH₂, NHCOR⁹, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl oder Halogenalkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen substituiert sein können;

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

R³ Wasserstoff, Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

5

15

20

25

W geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine Gruppe aus O oder NR²³ enthalten können,

worin

R²³ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

U geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

A fehlt, Phenyl oder einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bedeutet,

welche gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Halogen, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein können,

R² COOR²⁶ oder CN bedeutet,

worin

R²⁶ Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen bedeutet;

10

5

15

20

X geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine Gruppe aus O, S(O), NR³⁰, oder einen drei- bis sechsgliedrigen gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls einen oder mehrere geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen aufweisenden Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O), NR32 und/oder O enthalten können,

worin

10

5

0, 1 oder 2 bedeutet, r

15

 R^{30} Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder Arylalkyl mit 7 bis 12 Kohlenstoffatomen bedeutet,

 R^{32}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

20

CN oder COOR35 bedeutet, R^1

worin

25

7


 R^{35} Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeutet.

10. Verbindungen nach Anspruch 5,

30

worin

B einen Heterocyclus aus der Reihe



5

bedeutet

- r 0 oder 1 bedeutet,
- V fehlt oder O, NR4 oder S(O)_n bedeutet

10

worin

 R^4

Wasserstoff bedeutet,

15

n

0 bedeutet,

Q fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine oder mehrere Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CONR⁵, S-CO-oder OCO enthalten können, und ein- oder zweifach durch Halogen oder Hydroxy substituiert sein kann, oder CONR⁵ bedeutet,

worin


R⁵ Wasserstoff bedeutet,

p 0 oder 1 bedeutet,

Y Wasserstoff, NR⁶R⁷, Phenyl, Napthyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe

10

5



bedeutet,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, NO₂, COR⁸, SR⁸, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

worin

10

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

5

R⁸ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

R⁹ Wasserstoff, oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

15

R¹⁰, R¹¹, R¹³ und R¹⁴ unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeuten,

20

wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n- Propyl, i-Propyl, n- Butyl, s- Butyl, i- Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann,

25

oder zwei Substituenten aus R¹⁰ und R¹¹ oder R¹³ und R¹⁴ miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Ring verbunden sein können, der durch O oder N unterbrochen sein kann,

R¹²


Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeutet,

30

wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl,

i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann;

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Phenyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe



substituiert sein können,

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem oder verzweigtem Alkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Sulfonylalkyl, geradkettigem oder verzweigtem Thioalkyl mit jeweils bis 4 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 4

5



Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, NR¹⁷R¹⁸ oder NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können,

worin

5

 R^{16}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Phenyl, wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann, oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten,

15

20

worin

R²⁰ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu
 4 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

25

und

R19

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und

bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein können;

10

5

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

15

R³ Wasserstoff, F, Cl, Br, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

20

W CH₂CH₂, CH=CH, CH₂O, OCH₂, CH₂OCH₂, CH₂NH, NHCH₂ oder CH₂NHCH₂ bedeutet,

U

geradkettiges Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

25

A fehlt oder Phenyl, Pyridyl, Thienyl oder Thiazolyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, CF₃, Methoxy, Ethoxy, F, Cl, Br substituiert sein kann,

R² COOR²⁶ oder CN bedeutet,

worin

 R^{26}

Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl

mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet;

5

10

X geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, das eine Gruppe aus O, S(O)_r, NR³⁰, oder einen drei- bis sechsgliedrigen gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls einen oder mehrere geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen aufweisenden Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O)_r, NR³² und/oder O enthalten kann,

worin

r 0, 1 oder 2 bedeutet,

20

15

R³⁰ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6
 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder Benzyl bedeutet,

R³² Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

R¹ CN oder COOR³⁵ bedeutet,

worin

30


R³⁵ Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeutet.

11. Verbindungen nach Anspruch 5,

worin

5

B einen Heterocyclus aus der Reihe



bedeutet

r 0 oder 1 bedeutet,

V fehlt oder O, NR⁴ oder S(O)_n bedeutet

worin

 R^4

Wasserstoff bedeutet,

n 0 bedeutet,

Q fehlt, geradkettiges oder verzweigtes Alkylen, geradkettiges oder verzweigtes Alkendiyl mit jeweils bis zu 15 Kohlenstoffatomen bedeutet, die eine oder mehrere Gruppen aus O, S(O)_p, NR⁵, CONR⁵, S-CO-oder OCO enthalten können, und ein- oder zweifach durch Halogen oder Hydroxy substituiert sein kann, oder CONR⁵ bedeutet,

worin

R⁵ Wasserstoff bedeutet,


p 0 oder 1 bedeutet,

Y Wasserstoff, NR⁶R⁷, Phenyl, Napthyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe

10

5

20



bedeutet,

wobei die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkinyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, NO₂, COR⁸, SR⁸, NR¹⁰R¹¹, NR⁹COR¹² oder CONR¹³R¹⁴ substituiert sein können,

worin

5

R⁶ und R⁷ jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyloxyalkyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

5

 R^8 Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

15

20

25

R9 Wasserstoff, oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit

bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

 R^{10} , R^{11} , R^{13} und R^{14} unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeuten,

wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hy-

droxy, Methyl, Ethyl, n- Propyl, i-Propyl, n- Butyl, s- Butyl, i- Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann,

oder zwei Substituenten aus R10 und R11 oder R13 und R14 miteinander unter Bildung eines fünf- oder sechsgliedrigen Ring verbunden sein können, der durch O oder N unterbrochen sein kann,


 R^{12} Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder Phenyl bedeutet,

30

wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl,

i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann;

und/oder die cyclischen Reste jeweils ein- bis dreifach durch Phenyl oder einen Heterocyclus aus der Gruppe



substituiert sein können,

welche direkt oder über eine Gruppe aus O, S, SO, SO₂, CONR⁹, SO₂NR⁹, geradkettigem oder verzweigtem Alkylen, geradkettigem oder verzweigtem Alkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Oxyalkyloxy, geradkettigem oder verzweigtem Sulfonylalkyl, geradkettigem oder verzweigtem Thioalkyl mit jeweils bis 4 Kohlenstoffatomen gebunden und ein- bis dreifach durch geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit jeweils bis zu 4

5



10

Kohlenstoffatomen, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, NR¹⁷R¹⁸ oder NR¹⁶COR¹⁹ substituiert sein können,

worin

5

 R^{16}

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet,

10

 R^{17} , R^{18}

unabhängig voneinander Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Phenyl, wobei der Phenylrest ein- bis dreifach durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO₂, CF₃, OCF₃ oder CN substituiert sein kann, oder einen Rest der Formel SO₂R²⁰ bedeuten,

15

20

worin

 R^{20}

geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

25

und

R¹⁹

Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, geradkettiges oder verzweigtes Alkenyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, Aryl mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und

bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O oder Cycloalkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen bedeutet, welche gegebenenfalls weiterhin durch F, Cl Br, Hydroxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Acetylamino, NO2, CF3, OCF3 oder CN substituiert sein können;

10

5

und/oder die cyclischen Reste mit einem aromatischen oder gesättigten Carbocyclus mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einem aromatischen oder gesättigten Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O anneliert sein können,

15

 \mathbb{R}^3 Wasserstoff, F, Cl, Br, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkyl, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy oder geradkettiges oder verzweigtes Halogenalkoxy mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,

20

W CH₂CH₂, CH=CH, CH₂O, OCH₂, CH₂OCH₂, CH₂NH, NHCH₂ oder CH₂NHCH₂ bedeutet,

U geradkettiges Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, O, S, SO oder SO₂ bedeutet,

25

Α fehlt oder Phenyl, Pyridyl, Thienyl oder Thiazolyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- bis dreifach durch Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, CF₃, Methoxy, Ethoxy, F, Cl, Br substituiert sein kann,

R² COOH bedeutet,

X geradkettiges oder verzweigtes Alkylen mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, das eine Gruppe aus O, S(O)_r, NR³⁰, oder einen drei- bis sechsgliedrigen gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls einen oder mehrere geradkettige oder verzweigte Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen aufweisenden Carbocyclus mit gegebenenfalls einem oder zwei Heteroatomen aus der Reihe S(O)_r, NR³² und/oder O enthalten kann,

worin

o, 1 oder 2 bedeutet,

R³⁰ Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder Benzyl bedeutet,

R³² Wasserstoff, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

R¹ COOH bedeutet.

12. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I)

10

15

20

25



umfassend

[A] die Umsetzung von Aldehyden der allgemeinen Formel (II)

5

worin


10

 R^1 , R^2 , A, U und X

die vorstehend angegebene Bedeutung haben, mit der Maßgabe, dass R¹ und R² nicht für freie Carbonsäuregruppen stehen dürfen,

mit Phosphorverbindungen der allgemeinen Formel (III)

15



worin

20

 R^3 , B, V, Q, Y und r

die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

m

eine ganze Zahl von 1 bis 5 bedeutet, und

25

L

für einen Rest der Formel

$$Z^{-}$$
 $+$
 $-P(R^{39})_3$
 $-P - R^{40}$
 $-P - OR^{40}$

steht, worin

5

R³⁹ und R⁴⁰ unabhängig voneinander geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeuten, und



Z ein Halogenidanion oder Tosylatanion bedeutet,

in inerten Lösungsmitteln in Gegenwart einer Base,


und gegebenenfalls die anschließende teilweise oder vollständige Hydrolyse der Reste R¹ und R² zu freien Carbonsäuregruppen;

15

oder



[B] Verbindungen der Formel (IV),



20

worin

Va

für O oder S steht

5

10

15

. 20

25

R¹, R², R³, U, W,A, X die vorstehend angegebene Bedeutung haben

mit Verbindungen der Formel (V)

umsetzt,


worin

Q, Y die gleichen Bedeutungen wie vorstehend definiert haben,

E entweder eine Abgangsgruppe bedeutet, die in Gegenwart einer Base substituiert wird, oder eine gegebenenfalls aktivierte Hydroxyfunktion ist;

oder

[C] Verbindungen der Formel (VI),



worin


R³, V, Q, Y, W, U, A, B die gleichen Bedeutungen wie vorstehend definiert haben,

R_b und R_b jeweils unabhängig für CN oder COOAlk stehen, wobei
Alk für einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest
mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen steht,

mit wässrigen Lösungen starker Säuren oder starker Basen in die entsprechenden freien Carbonsäuren überführt.

oder

[D] Verbindungen der Formel (VII)



worin

R¹, R², R³, V, Q, X, W, U, A, B die gleichen Bedeutungen wie vorstehend definiert haben,

L' für Br, I oder die Gruppe CF₃SO₂-O steht,

mit Verbindungen der Formel (VIII)

10

5

15

M-Z'

(VIII)

worin

M

5

für einen Aryl oder Heteroarylrest, einen geradkettigen oder verzweigten Alkyl-, Alkenyl- oder Alkinylrest oder Cycloalkylrest oder für einen Arylalkyl-, einen Arylalkenyl- oder einen Arylalkinylrest steht,

10

Z'

für die Gruppierungen -B(OH)₂, -CH≡CH, -CH=CH₂ oder -Sn(nBu)₃ steht


15

in Gegenwart einer Palladiumverbindung, gegebenenfalls zusätzlich in Gegenwart eines Reduktionsmittels und weiterer Zusatzstoffe und in Gegenwart einer Base umsetzt;

oder

[E] Verbindungen der Formel (VII)

20



worin

R¹, R², R³, V, Q, X, W, U, A, B die gleichen Bedeutungen wie vorstehend definiert haben,

L' für Br, I oder die Gruppe CF₃SO₂-O steht,

5

mit Verbindungen der Formel (IX)

NHR^aR^b

(IX)

unabhängig voneinander für Wasserstoff oder einen ge-

10

worin

R^a und R^b

WOIII

radkettigen oder verzweigten Alkylrest mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen stehen oder zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bilden

können,

20


15

in Gegenwart einer Palladiumverbindung, gegebenenfalls zusätzlich in Gegenwart eines Reduktionsmittels und weiterer Zusatzstoffe und in Gegenwart einer Base umsetzt;

oder

25

[F] Verbindungen der Formel (IV),



worin

Va

für O oder S steht

5

10

R¹, R², R³, U, W,A, X die vorstehend angegebene Bedeutung haben

mit Verbindungen der Formel (X)

E C (X)

umsetzt,

15

worin

Q'

die gleichen Bedeutung wie Q hat,

20

E und E' jeweils unabhängig voneinander entweder eine Abgangsgruppe bedeutet, die in Gegenwart einer Base substituiert wird, oder eine gegebenenfalls aktivierte Hydroxyfunktion ist;

und die so erhaltenen Verbindungen der Formel (XI)

5

10

15

20

25

worin

R¹, R², R³, A, Q, U, V, W, X und E' die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

mit Aminen der Formel (XII)

NHR^aR^b (XII)

umsetzt;

worin

R^a und R^b unabhängig voneinander für Wasserstoff oder einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen stehen oder zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen einen aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen und bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe S, N und/oder O bilden können,

oder

[G]

Verbindungen der Formel (XIII)

HO
$$X-R^1$$
 (XIII)

worin

5 R¹, R², A, U, X

die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

mit Verbindungen der Formel (XIV)

$$R^3$$
 B
 $(CH_2)_{\overline{m}}$
 E''
 (XIV)

worin

R³, V, Q, Y, r und B

ì

die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

m

eine ganze Zahl von 1 bis 5 bedeutet, und

E"

entweder eine Abgangsgruppe bedeutet, die in Gegenwart einer Base substituiert wird, oder eine

gegebenenfalls aktivierte Hydroxyfunktion ist;

umsetzt;

oder

25

10

15

[H] Verbindungen der Formel (XV)

$$E''' \longrightarrow X \longrightarrow R^1$$

$$(XV)$$

worin

5

10

15

20

R¹, R², A, U, X die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

E"" entweder eine Abgangsgruppe bedeutet, die in Gegenwart einer Base substituiert wird, oder eine gegebenenfalls aktivierte Hydroxyfunktion ist;

mit Verbindungen der Formel (XVI)

$$R^3$$
 B
 $(CH_2)_m$
 OH
 (XVI)

worin

R³, V, Q, Y, r und B die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

m eine ganze Zahl von 1 bis 5 bedeutet,

umsetzt;

25 oder

5

10

15

20

25,


[I] Verbindungen der Formel (XVII)

$$H \xrightarrow{O} X - R^1$$
 U
 $A - R^2$
(XVII)

worin

 R^1, R^2, A, U, X die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

mit Verbindungen der Formel (XVIII)



worin

R³, V, Q, Y, r und B die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

m eine ganze Zahl von 0 bis 5 bedeutet,

zunächst zu einer Schiffschen Base umsetzt und diese dann mit gängigen Reduktionsmitteln reduziert oder direkt unter den Bedingungen einer reduktiven Alkylierung in Gegenwart eines Reduktionsmittels umsetzt;

oder

5

10

15

20

[J] Verbindungen der Formel (XIX)


 H_2N $X-R^1$

worin

R¹, R², A, U, X die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

(XIX)

mit Verbindungen der Formel (XX)



worin

m


R³, V, Q, Y, r und B die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

eine ganze Zahl von 0 bis 5 bedeutet,

zunächst zu einer Schiffschen Base umsetzt und diese dann mit gängigen Reduktionsmitteln reduziert oder direkt unter den Bedingungen einer reduktiven Alkylierung in Gegenwart eines Reduktionsmittels umsetzt,

5 oder

[K] Aldehyde der Formel (XXI)



worin

10

15

20


R³, V, Q, Y, r und B die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

mit Phosphorverbindungen der Formel (XXII)

worin

X und R¹ die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

zu Verbindungen der Formel (XXIII)




worin

5 R^3 , V, Q, Y, r, B, X und R^1

die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

umgesetzt und anschließend durch aufeinanderfolgende Reduktion der Alkengruppe und der Carbonylgruppe und anschließende Substitution der durch Reduktion der Carbonylgruppe erzeugten Hydroxygruppe mit Alkoholen oder Thiolen sowie gegebenenfalls anschließende Oxidation zu den entsprechenden Sulfoxid- oder Sulfonverbindungen in Verbindungen der Formel (XXIV) überführt,



worin

R³, V, Q, Y, r, B, X, U,R² und R¹ die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben,

U

für O oder S steht.

15

10

5

10

15

- 13. Arzneimittel enthaltend mindestens eine Verbindung der allgemeinen Formel (I) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche.
- 14. Verwendung von Verbindungen der Formel (I) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
- 15. Verwendung von Verbindungen der allgemeinen Formel (I) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Angina pectoris, Ischämien und Herzinsuffizienz.
- 16. Verwendung von Verbindungen der allgemeinen Formel (I) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Hypertonie, thromboembolischen Erkrankungen, Arteriosklerose und venösen Erkrankungen.

Ī

Neuartige Stimulatoren der löslichen Guanylatcyclase

Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Verbindungen der Formel (I)

sowie deren Salze und Stereoisomere, zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.